A-C [abaris]
Museum Heinemanum
Vol. 2
1859-60

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss

der

ORNITHOLOGISCHEN SAMMLUNG

des Oberamtmannes

Ferdinand Heine

auf Gut St. Burchard vor Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen Arten systematisch bearbeitet

von

Dr. Jean Cabanis,

erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und

Ferdinand Heine,

Stud. philos.

II. Theil,

die

Schreivögel

enthaltend.

Halberstadt, 1859-1860.

In Commission bei R. Frantz.

Library

Museum

ORNITHOLOGICUM

HEINEANUM.

Pars II.

CLAMATORES.

MUSEUM HEINEANUM.

Verzeichniss

der

ornithologischen Sammlung

des

Oberamtmann

Ferdinand Heine

auf

Gut St. Burchard

vor

Halberstadt.

Mit kritischen Anmerkungen und Beschreibung der neuen Arten systematisch bearbeitet

von

Dr. Jean Cabanis,

erstem Custos der Königlichen zoologischen Sammlung zu Berlin

und

Ferdinand Heine,

Stud. philos.

II. Theil,

die

Schreivögel

enthaltend.

Halberstadt, 1859-1860.

In Commission bei R. Frantz.

Vorwort.

Die Veröffentlichung der Fortsetzung dieses Verzeichnisses ist aus mehrfachen Gründen längere Zeit verschoben worden, als bei der Herausgabe des ersten Theiles vorausgesetzt und zu erwarten war. Inzwischen aber hat der Besitzer in dem Wunsche, seine Sammlung immer mehr zu einem der Vollständigkeit sich möglichst nähernden Abschlusse zu bringen, mit rastlosem Eifer keine Gelegenheit zur Vermehrung der wissenschaftlichen Schätze derselben vorüber gehen lassen, und dürfte daher wohl in der nunmehrigen Reichhaltigkeit des jetzt zur Veröffentlichung gelangenden Abschnittes die beste Rechtfertigung des bisher so lange verzögerten Druckes zu finden sein. Denn gerade das Material zu den ***Clamatores*** ist mit ganz besonderer Umsicht und Vorliebe gesammelt worden, so dass das nachstehende Verzeichniss derselben wohl überhaupt von nur wenigen der grössten ornithologischen Sammlungen übertroffen werden möchte.

Zugleich wird der vorliegende zweite Theil in Verbindung mit dem die ***Oscines*** enthaltenden ersten als practische Ausführung der in der Sammlung befolgten systematischen Anordnung dienen, und das von mir adoptirte System ausführlicher, als früher anderweitig geschehen ist, erläutern.

Uebrigens sind die bereits im Vorworte zum ersten Theile hinlänglich angedeuteten auf Linné's und Illiger's Gesetzgebung basirenden Grundsätze in Bezug auf Nomenclatur u. s. w. gegen die wechselnde Mode der Neuzeit streng beibehalten und nach wie vor genau beobachtet worden.

Zur Erläuterung des gegenwärtigen zweiten Theiles dieses Verzeichnisses bleibt mir daher nur noch die angenehme Pflicht, dem ältesten Sohne meines hochverehrten Freundes, des Herrn Ober-Amtmann ***F. Heine*** für die fleissige Mitwirkung an diesem Cataloge meinen wärmsten Dank abzustatten. Herr Studiosus ***Ferd. Heine***, welcher die Liebe und den rastlosen Eifer für naturhistorische Zwecke gleichsam vom Vater überkommen hat, ist mir mit andauerndem Fleisse und ernstem wissenschaftlichen Streben bei Zusammenstellung der so umfangreichen Synonymie, sowie überhaupt in jeder Beziehung bei der Bearbeitung des Cataloges in erspriesslicher Weise zur Hand gegangen. Während nun bisher die Erfüllung meines amtlichen Berufes, sowie der Umstand, dass ich nicht am Orte der Sammlung wohne, die Förderung dieses Verzeichnisses auf meine Musse- oder Ferien-Zeit beschränkten, ist durch die nunmehr gewonnene Mitarbeiterschaft meines genannten jungen Freundes die beschleunigte Vollendung des Ganzen in nähere Aussicht gestellt, und wird der dritte, die ***Strisores*** und den ***Index*** der sodann vollendeten ehemaligen ***Passeres*** Lin. enthaltende Theil im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Berlin, im December 1859.

J. Cabanis.

ORDO II. CLAMATORES. SCHREIVÖGEL.

Fam. HYPOCNEMIDIDÆ. Scheinstiefler.

Subfam. EUCICHLINÆ. Pitta's.

Gen. EUCICHLA Rchb. 1850. — Prachtpitta.

Pitta (!?) Bp. 1850 (nec Vieill. 1816).

1. 1. E. Boschi Nob.

Pitta affinis Raffl. (nec Horsf.) Lin. Trans. XIII. p. 301. — *Pitta elegans* Less. (nec Temm.) Voy. Bon. Ois. t. 3. — *Pitta Boschii* Müll. & Schl. Verh. N. G. Ned. Ind. Av. p. 16. t. 1. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

2. 2. E. cyanura Nob.

Turdus cyanurus Gm. S. N. p. 828. 99. — *Pitta cyanura* Vieill. Gal. Ois. II. p. 246. t. 153. — *Myiothera affinis* Horsf. Lin. Trans. XIII. p. 154. —

Java — 2 ♂ ad., 1 ♀ jun. — 3 St.

Gen. COLOBURIS *) Nob. — Pitta.

Pitta (!?) Vieill. 1816. *Myiothera* Cuv. 1817 (nec Jll. 1811). *Brachyurus* Thunb. 1821 (nec Fisch. 1814). *Citta* Wagl. 1827 (nec Boie 1826). *Brachyurus*, *Melanopitta* (!), *Iridipitta* (!) & *Erythropitta* (!) pt. Bp. 1854.

3. 1. C. strepitans Nob.

Pitta strepitans Temm. Pl. col. 333. — *Pitta versicolor* Sws. Zool. Journ. I. p. 468. — *Brachyurus strepitans* Bp. Consp. I. p. 254. —

Ost-Australien — ♂ — 1 St.

---

*) Von κολοβός (kurz, abgestutzt) und οὐρα (Schwanz) = κολουρίς.

4. 2. C. cyanoptera Nob.

Turdus macrourus fasciatus Bodd. Tabl. pl. enl. 257. — *Corvus brachyurus madagascariensis* Gm. S. N. p. 376. 15. var. ♂. — *Myiothera brachyura* Raffl. (nec Lin.) Lin. Trans. XIII. p. 300. — *Pitta cyanoptera* Temm. Pl. col. 218. — *Citta hippocrepis* Wagl. — *Pitta malaccensis* Blyth J. A. S. B. XII. p. 960. — *Brachyurus cyanopterus* Id. l. l. XVI. p. 153. — *Pitta velata* Gray Gen. B. I. p. 213. —

Sumatra — ♂; Malacca — ♀ — 1 St.

5. 3. C. malaccensis Nob.

Turdus malaccensis Scop. Sonn. Voy. II. t. 110. — *Citta superciliaris* Wagl. — *Pitta malaccensis* Gray. Gen. B. I. p. 213. — *Brachyurus malaccensis* Bp. Consp. I. p. 254. —

Malacca — ♂ — 1 St.

6. 4. C. brachyura Nob.

Corvus brachyurus Lin. S. N. no. 15. — *Corvus brachyurus bengalensis* Gm. S. N. p. 376. 15. var. γ. — *Turdus triostegus* Sparrm. Mus. Carls. t. 84. — *Pitta bengalensis* Vieill. Enc. p. 685. — *Citta abdominalis* ♀ *brachyura* Wagl. — *Pitta triostegus* Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 157. — *Pitta brachyura* Gray Ill. Ind. Z. II. t. 35. 2. — *Pitta cyanoptera* J. E. Gray (nec Temm.) Z. Misc. p. 83. — *Pitta abdominalis* Gray Gen. B. I. p. 213. — *Brachyurus bengalensis* Bp. Consp. I. p. 254. —

Bengalen — ♂ — 1 St.

7. 5. C. Vigorsi Nob.

Pitta brachyura Vig. & Horsf. (nec Lin.) Lin. Trans. XV. p. 218. — *Pitta Vigorsi* Gould B. Austr. II. 16. — *Brachyurus Vigorsi* Bp. Consp. I. p. 255. —

Lombok — ♂ — 1 St.

8. 6. C. cucullata Nob.

Pitta cucullata Hartl. R. Z. 1843. p. 65. — *Pitta nigricollis* Blyth J. A. S. B. XII. p. 960. — *Pitta rhodogaster* Hodgs. l. l. p. 961. — *Pitta malaccensis* Schl. (nec Gray). — *Pitta Schlegeli* Bp. — *Brachyurus cucullatus* Id. Consp. I. p. 255. — *Pitta coronata* Peale Un. St. Expl. Exp. p. 89. t. 25. 1. — *Melanopitta cucullata* Bp. Consp. Vol. An. p. 7. —

Malacca — ♂, ♀ — 2 St.

9. 7. C. Muelleri Nob.

Pitta atricapilla Müll. (nec Cuv.) Verh. N. G. Ned. Ind. Av. p. 19. — *Brachyurus Mulleri* Bp. Consp. I. p. 256. — *Melanopitta Mulleri* Id. Consp. Vol. An. p. 7. —

Amboina — ♀ — 1 St.

10. s. C. brevicauda Nob.

Turdus brevicaudus Bodd. Tabl. pl. enl. 89. — *Merula viridis moluccensis* Briss. Av. II. p. 319. 57. t. 32. — *Corvus brachyurus philippensis* Gm. S. N. p. 375. 15. var. β.— *Pitta atricapilla* Cuv. — *Pitta philippensis* Müll. & Schl. Verh. N. G. Ned. Ind. Av. p. 19. — *Citta melanocephala* Wagl. — *Pitta macrorhyncha* J. E. Gray Z. Misc. p. 3. — *Pitta macrorhyncha* ♀ *brevicauda* Gray Gen. B. I. p. 214. — *Brachyurus atricapillus* Bp. Consp. I. p. 256. — *Melanopitta atricapilla* Id. Consp. Vol. An. p. 7. —

Timor — ♂ — 1 St.

11. 9. C. erythrogastra Nob.

Pitta erythrogaster „Cuv." Temm. Pl. col. 212.— *Brachyurus erythrogaster* Bp. Consp. I. p. 255. — *Erythropitta erythrogastra* Id. Consp. Vol. An. p. 7. —

Philippinen — ♂ jun. — 1 St.

Gen. PHOENIOCICHLA *) nov. gen. — Granatpitta.

12. 1. P. granatina Nob.

Pitta granatina Temm. Pl. col. 506. — *Pitta coccinea* Eyt. P. Z. S. 1839. p. 104. — *Brachyurus granatinus* Bp. Consp. I. p. 255. — *Erythropitta granatina* Id. Consp. Vol. An. p. 7.—

Borneo — ♂; Malacca — ♀ — 2 St.

Gen. HYDRORNIS **) Blyth 1843. — Riesenpitta.

Paludicola Hodgs. 1837 (nec Wagl. 1830). *Heleornis* Hodgs. 1844. *Gigantipitta* (!) Bp. 1854.

13. 1. H. caerulea Nob.

Myiothera caerulea Raffl. Lin. Trans. XIII. p. 301. — *Pitta gigas* Temm. Pl. col. 217. — *Pitta caerulea* Vig. App. Mem. Raffl. p. 659. — *Brachyurus caeruleus* Blyth J. A. S. B. XVI. p. 153. — *Gigantipitta caerulea* Bp. Consp. Vol. An. p. 7. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

---

*) Von φοίνιος (roth) und κίχλη (Drossel). Unterscheidet sich durch kürzere, abgerundete Flügel, weicheres Gefieder u. s. w. —

**) Hierher gehören ferner noch:

2. *H. nepalensis.* Blyth. — *Paludicola nepalensis* Hodgs. (als Typus);
3. *H. cyanea.* — *Brachyurus cyaneus* Blyth;
4. *H. maxima.* — *Pitta maxima* Forsten. —

Subfam. MYIOTHERINAE. Ameisenvögel.

Gen. MYIOTRICHAS *) Boie 1831. — Ameisenkönig.

Grallaria (!) Vieill. 1816. *Myioturdus* (!) Boie 1826. *Colobathris & Codonistris* Glog. 1842.

14. 1. M. imperatrix Nob.

Myiothera grallaria Licht. (nec Lath.) Doubl. no. 468. — *Myioturdus rex* Wied Beitr. III. p. 1027. — *Grallaria imperator* „Natt." Lafr. R. Z. 1842. p. 333. 2. — *Colobathris imperator* Cab. Orn. Not. p. 217. — *Grallaria rex* Burm. Th. Bras. III. p. 49. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♀ — 2 St.

15. 2. M. squamigera Nob.

Grallaria squamigera Prév. Voy. Vén. Ois. t. 1. — *Colobathris squamigera* Cab. O. N. p. 217. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. CHAMÆZOSA. Cab. 1847. — Ameisendrossel.

Chamaeza (!) Vig. 1825. *Chemoeza* (!) Less. 1839.

16 1. C. turdina **) nov. sp.

Supra olivaceo-brunnea, pileo rufescente, superciliis albidis, caudae dorso concoloris apicibus obsolete flavescentibus; subtus pallide-ochracea, pectoris abdominisque laterum plumis nigro-marginatis, gutture abdomineque medio albidis vix maculatis, caudae tectricibus inferioribus lactioribus, nigro-fasciatis. — Long. tot. 7″ 8‴, al. 3″ 8‴, caud. 3″, tars. 1″ 6‴, rostr. culm. 7‴. —

Columbien — ♂ — 1 St.

17. 2. C. ruficauda nov. sp.

Similis praecedenti, sed paulo maior, alis brevioribus, cauda longiore; supra rufescente-olivacea, pileo dorso concolore, rectricibus remigibusque secundariis fusco-cinnamomeis;

---

*) Dahin gehören noch:
3. *M. varia.* — *Formicarius varius* Bodd. — *Turdus rex* Gm. (als Typus);
4. *M. brevicauda.* — *Formicarius brevicaudus* Bodd. — *Turdus tinniens* Gm.;
5. *M. macularia.* — *Pitta macularia* Temm. u. a. —

**) Diese und die folgende Art unterscheiden sich auf den ersten Blick von *C. brevicauda* durch etwas geringere Grösse und den Mangel der schwarzen Binde und der weissen Enden des Schwanzes, welche bei *C. turdina* kaum angedeutet, bei *C. ruficauda* gar nicht vorhanden sind. Unten ist die Zeichnung eine ganz andere: bei *C. brevicauda* sind die Federn an Brust und Bauchseiten beiderseits gleichmässig schwarzbraun eingefasst, wodurch sie gleichsam zugespitzt erscheinen, während bei den beiden andern Arten diese Einfassung unregelmässiger ist und nicht bis zu den Spitzen hinabläuft. —

subtus ochracea, pectoris abdominisque laterum plumis utrinque nigro-marginatis, gutture abdomineque medio albis immaculatis. — Long. tot. 8″, al. 3″ 5‴, caud. 3″ 4‴, tars. 1″ 4‴, rostr. culm. 6‴. —

? — ♂ — 1 St.

18. 3. C. brevicauda Cab.

O. N. p. 218. — *Turdus brevicaudus* Vieill. N. D. XX. p. 239. — Id. Enc. p. 645. — *Myiothera campanisona* Licht. Doubl. no. 469. — *Chamaeza meruloides* Vig. Z. Jour. II. p. 395. — *Myioturdus marginatus* Wied Beitr. III. p. 1035. — *Grallaria brevicauda* Lafr. R. Z. 1842. p. 334. 8. — *Grallaria marginata* Gray Gen. B. I. p. 213. — *Chamaeza marginata* Bp. Consp. I. p. 204. — *Chamaezosa marginata* Burm. Th. Br. III. p. 47. —

Brasilien — ♂ adult. & jun. — 2 St.

Gen. MYRMORNIS Herrm. 1783. — Ameisenvogel.

Formicarius (!) Bodd. 1783. *Myrmecophaga* Lacép. 1800—1801. *Myiothera* Illig. 1811. *Myrmothera* Vieill. 1816. *Myiocincla* Sws. 1837.

19. 1. M. analis Nob.

Myiothera analis Orb. & Lafr. Syn. p. 14. 1. — Orb. Voy. p. 191. t. 6 b. 1. — *Formicarius analis* Gray Gen. B. I. p. 211. —

Porto Cabello — ♂ — 1 St.

20. 2. M. cayanensis Nob.

Formicarius cayanensis Bodd. Tabl. pl. enl. 821 & 703. 1. — *Turdus colma* Gm. S. N. p. 827. 95. — *Myiothera colma* Ill. Prodr. p. 218. — *Myrmothera fuscicapilla* Vieill. N. D. XII. p. 112. — Id. Enc. p. 681. — *Myrmothera colma* Id. l. l. p. 682. — *Myrmothera tetema* Id. l. l. p. 683. — *Myiothera ruficeps* Spix Av. Br. I. t. 72. 1. — *Myioturdus tetema* Wied Beitr. III. p. 1038. — *Myiothera tetema* Temm. Tabl. méth. p. 16. —

Brasilien — ♂ — 3 St.

21. 3. M. nigrifons Nob.

Formicarius nigrifrons Gould Ann. N. H. ser. 2. XV. p. 344. —

Cayenne — ♂; Guiana — ♂ — 2 St.

Subfam HYPOCNEMIDINAE. Scheinstiefler.

Gen. CONOPOPHAGA Vieill. 1816. — Ameisenschnäpper.

Myiagrus Boie 1825. *Myioturdus* (!) Wied 1826 (nec Boie 1825). ? *Urotomus* Sws. 1827.

22. 1. C. lineata Cab.

O. N. p. 215. — *Myiagrus lineatus* Wied Beitr. III. p. 1046. — *Conopophaga vulgaris* Mén. Mon. Myioth. p. 534. t. 14. 1. —

Brasilien — 2 ♂, 1 ♀ — 3 St.

23. 2. C. melanops Scl.

Syn. Form. III. p. 13. — *Platyrhynchus melanops* Vieill. N. D. XXVII. p. 14. — Id. Enc. p. 839. — *Myiothera perspicillata* Licht. Doubl. no. 474. — *Conopophaga nigrogenys* Less. Tr. p. 393. — Mén. M. M. p. 536. t. 15. 1 (♂). — *Conopophaga ruficeps* Sws. B. Braz.t. 67—68. — *Conopophaga dorsalis* Mén. M. M. p. 536. t. 14. 2. — Burm. Th. Br. III. p. 53 (♀). — *Conopophaga perspicillata* Cab. O. N. p. 215. — Burm. Th. Br. III. p. 54. (♂). — *Conopophaga dorsalis* & *nigrogenys* Gray Gen. B. I. p. 255. — Maior, rostro latiore, fronte latissime nigra, subtus plumbescente-albida, gula abdomineque late albis. — Long. tot. 4″ 6‴, al. 2″ 9‴, rost. latit. 3½‴. —

Bahia — 3 ♂, 1 ♀ —4 St.

24. 3. C. Maximiliani *) nov. sp.

Myioturdus perspicillatus Wied Beitr. III. p. 1042. — Minor, rostro angustiore, fronte prima tantummodo angustissime nigra, subtus plumbea, gula latius, abdomine angustius albis. — Long. tot. 4″ 1‴, al. 2″ 4‴, rostr. latit. 2½‴. —

Süd-Brasilien — ♂ — 3 St.

Gen. CORYTHOPIS Sundev. 1836. — Ameisenpieper.

25. 1. C. calcarata Gray

List Gen. B. p. 34. — *Myiothera calcarata* Wied Beitr. III. p. 1101. — *Muscicapa Delalandii* Less. Tr. p. 392. — *Formicarius calcaratus* Gray Gen. B. I. p. 211. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. DASYPTILOPS **) Nob. — Manikup.

Manikup (!) Desm. 1805. *Pithys* (!?) Vieill. 1816.

26. 2. D. albifrons Nob.

Pipra albifrons Gm. S. N. p. 1000. 5. — *Pithys leucops* Vieill. Enc. p. 862. — Id. Gal. II. p. 205. t. 129. — *Myiothera albifrons* Licht. Doubl. no. 476. — *Dasycephala albifrons* Gray Gen. B. I. p. 208. — *Pithys albifrons* Cab. O. N. p. 214. —

Cayenne — ♂; Guiana — ♂ — 2 St.

*) Unterscheidet sich von *C. melanops* durch geringere Grösse, schmälern Schnabel, die nur über den Nasenlöchern ganz schmal schwarz gefärbte Stirn und das an Brust und Weichen weit mehr vorherrschende Grau, da nur Kinn, Kehle und Bauchmitte weisslich sind. Sie scheint die vorige, mehr nördlich bei Bahia vorkommende Art im südlichen Brasilien zu vertreten. —

**) Von δασύς (dicht), πτίλον (Feder) und ὤψ (Gesicht). —

Gen. ANOPLOPS *) Nob. — Nacktaug-Manikup.

Gymnopithys (!) „Schiff.“ Bp. 1854.

27. 1. A. rufigula Nob.

Turdus rufigula Bodd. Tabl. pl. enl. 644. 2. — *Turdus pectoralis* Lath. Ind. Orn. I. p. 357. 12. — *Myiothera pectoralis* Temm. Tabl. méth. p. 17. — *Myrmothera pectoralis* Less. Tr. p. 396. — *Pithys pectoralis* Cab. O. N. p. 214. — *Pithys rufigularis* Scl. Syn. Form. III. p. 3. —

Guiana — ♂ — 1 St.

Gen. MYRMOBORUS **) Nob. — Bastard-Manikup.

28. 1. M. leucophrys Nob.

Pithys leucophrys Tsch. Consp. p. 18. 97. — Faun. Per. p. 176. t. 11. 2. — *Dasycephala leucophrys* Gray Gen. B. I. p. 208. — *Myrmonax leucophrys* Cab. O. N. p. 211. — *Hypocnemis leucophrys* Scl. B. Bogot. p. 18. — Id. Syn. Form. II. p. 22. —

Cayenne — ♂ — 1 St.

29. 2. M. obscurus nov. sp.

Avis junior: supra cinerea, cauda nigrescentiore, alis nigris, tectricum alarium rectricumque apicibus anguste albido-marginatis; subtus albescens, gutturis pectorisque imprimis plumis cinerascente-marginatis, abdomine medio albo, hypochondriis crissoque cineraceis; maxilla nigra, mandibula albescente. — Long. tot. 4″ 10‴, al. 2″ 7‴, caud. 1″ 7‴, tars. 9‴, rostr. culm. 7‴. —

Cayenne — ♂ jun. — 1 St. —

Gen. MYRMONAX Cab. 1847. — Ameisenvoigt.

Drymophila Sws. 1824 (nec Temm.). *Myrmeciza* (!?) Gray 1841.

30. 1. M. loricatus Cab.

O. N. p. 210. — *Myiothera loricata* Licht. Doubl. no. 477. — *Drymophila leucopus* Sws. Z. Jour. II. p. 150. — *Formicivora loricata* Mén. M. M. p. 490. t. 4. 1-2. — *Drymophila loricata* Bp. Consp. I. p. 201. — *Myrmeciza loricata* Scl. Syn. Form. II. p. 18. — *Myiothera Yarelii* Leadb. —

Brasilien — 3 ♂, 2 ♀ — 5 St.

*) Von ἄνοπλος (unbewaffnet) und ὤψ (Gesicht). —

**) Von μύρμος (Ameise) und βιβρώσκω (fressen). Typus der Gattung ist der vielfach umhergeworfene *Pithys leucophrys*, und es gehören ferner dahin:

3. *M. myiotherinus.* — *Thamnophilus myiotherinus* ♂ Spix;
4. *M. lugubris.* — *Thamnophilus myiotherinus* ♀ Spix. — *Lanius lugubris* Jll.;
5. *M. angustirostris.* — *Conopophaga angustirostris* Cab. — *Pithys erythrophrys* Scl. —

31. 2. M. cinnamomeus Cab.

O.N.p.210. — *Turdus cinnamomeus* Gm. S.N. p. 825. 85.— *Thamnophilus cinnamomeus* Vieill. Enc. p. 743 (♂). — *Thamnophilus albicollis* Id. l. l. p. 744 (♀). — *Myrmothera cinnamomea* Less. Tr. p. 396. — *Myiothera cinnamomea* Temm. Tabl. méth. p. 16. — *Holocnemis cinnamomeus* Strickl. Ann. N. H. 1844. p. 416. — *Formicivora cinnamomea* Gray Gen. B. I. p. 213. — *Drymophila cinnamomea* Bp. Consp. I. p. 201. — *Myrmeciza cinnamomea* Scl. Syn. Form. II. p. 19. —

Cayenne — ♂ — 1 St.

Gen. PYRIGLENA Cab. 1847. — Feuerauge.

32. 1. P. leucoptera Scl.

Syn. Form. II. p. 16. — *Turdus leucopterus* Vieill. N. D. XX. p. 272. — Id. Enc. p. 666. — *Lanius domicella* Licht. Doubl. no. 502-503. — *Drymophila trifasciata* Sws. Z. Jour. II. p. 152. — *Myiothera domicella* Wied Beitr. III. p.1058. — *Formicivora domicella* Mén. M. M. p. 503. t. 7. 1-2. — *Thamnophilus domicella* Orb. & Lafr. Syn. p.11. 9. — *Myrmeciza melanura* Strickl. Ann. N. H. 1844. p. 417 (♂). — *Pyriglena domicella* Cab. O. N. p. 212. —

Brasilien — 5 ♂, 1 ♀ — 6 St.

33. 2. P. atra Cab.

O.N. p. 212. — *Drymophila atra* Sws. Z. Jour. II. p. 153.— *Formicivora atra* Mén. M.M. p.505. — *Thamnophilus aterrimus* Orb. & Lafr. Syn. p. 11. 10. — Orb. Voy. t. 5. 2— Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. PERCNOSTOLA *) nov. gen. — Hauben-Feuerauge.

34. 1. P. funebris Nob.

? *Turdus rufus* Bodd. Tabl. pl. enl. 644. 1 (♀).— ? *Turdus rufifrons* Gm. S.N. p. 825.86(♀).— ? *Thamnophilus rufifrons* Vieill. Enc. p. 744. — ? *Myiothera rufifrons* Temm. Tabl. méth. p. 17. — *Lanius funebris* Licht. Doubl. no. 503. not. — ? *Formicivora rufa* Gray Gen. B. I. p. 212. — *Pyriglena funebris* Cab. O. N. p. 212. — *Thamnophilus caesius* Scl. P. Z. S. 1855. p. 18. t. 81. — Id. Syn. Form. I. p. 12. —

Surinam — ♀ — 1 St.

35. 2. P. nigrescens **) nov. sp.

Supra nigrescens unicolor, campterio maculaque magna dor-

*) Von *περκνός* (schwärzlich) und *στόλος* (Kleidung). Unterscheidet sich von *Pyriglena* durch stärkern Schnabel und eine mehr an *Thamnophilus* erinnernde Form, wohin sie Sclater, ohne die Beschildung zu berücksichtigen, welche ganz wie bei *Pyriglena* die Laufseiten ungetheilt zeigt, gestellt hat. —

**) Von der vorhergehenden grössern Art durch den weissen Rückenfleck und die weniger verlängerten Haubenfedern verschieden. Das ganze Gefieder ist bei

si celata albis, tectricibus alaribus remigeque prima externo pogonio anguste albo-marginatis; subtus ardesiaca; maxilla mandibulaeque apice nigris, illius basi brunnescente.—Long. tot. 5″ 8‴, al. 2″ 8‴, caud. 2″ 4‴, tars. 11‴, rostr. culm. 7‴. —
Cayenne — ♂ — 1 St.

Fam. ERIODORIDÆ. Wollschlüpfer.

Subfam. ERIODORINÆ. Wollrücken.

Gen. RHAMPHOCÆNUS Vieill. 1818. — Dolchschnäbelchen.
Acontistes Sundev. 1836. *Scolopacinus* Bp. 1837.

36. 1. R. melanurus Vieill.

N. D. XXIX. p. 6. — Id. Enc. p. 363. — Id. Gal. Ois. II. p. 204. t. 128. — *Troglodytes rectirostris* Sws. Z. Ill. t. 140. — *Thryothorus gladiator* Wied Beitr. III. p. 751. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. TERENURA *) nov. gen. — Zartschwänzchen.

37. 1. T. maculata Nob.

Myiothera maculata Wied Beitr. III. p. 1088. — *Leptorhynchus striolatus* Mén. M. M. p. 517. t. 10. 2. — *Formicivora striolata* Gray Gen. B. I. p. 212. — *Ellipura maculata* Cab. O. N. p. 229. — *Rhamphocaenus maculatus* Burm. Th. Br. III. p. 73. — *Formicivora maculata* Scl. Syn. Form. II. p. 12. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. ELLIPURA Cab. 1847. — Dünnschwänzchen.
Taenidiura Rchb. 1850.

38. 1. E. squamata Cab.

O. N. p. 229. — *Myiothera squamata* Licht. Doubl. no. 478. — *Formicivora maculata* Sws. Z. Jour. II. p. 147. — *Formicivora squamata* Gray Gen. B. I. p. 212. —
Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

P. nigrescens dunkler, Haube und Kehle dagegen sind nicht schwarz, wie bei *P. funebris.*

*) Von τέρην (zart) und οὐρα (Schwanz), Mittelglied zwischen *Rhamphocaenus* und *Ellipura*, an ersteren durch die Schnabelbildung, an letztere durch die Schwanzformation erinnernd.

39. 2. E. striata Cab.

O. N. p. 228. — Burm. Th. Br. III. p. 69. — ? *Thamnophilus striatus* Spix Av. Br. II. p. 29. t. 40. 2. — *Formicivora malura* ♀ Mén. M. M. p. 496. — *Formicivora genei* Filippi Cat. Mus. Med. p. 31. — *Formicivora Genaei.* Scl. Syn. Form. II. p. 9. —

Brasilien — ♂ ad. & jun. — 2 St.

40. 3. E. ferruginea Cab.

O. N. p. 228. — *Myiothera ferruginea* Licht. Doubl. no. 476. — *Formicivora ferruginea* Mén. M. M. p. 488. — *Drymophila variegata* Such. Z. Jour. p. 559. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. FORMICIVORA Sws. 1824. — Wollrücken.

Eriodora Glog. 1827.

41. 1. F. grisea „Strickl."

Cab. O. N. p. 225. — *Turdus griseus* Bodd. Tabl. pl. enl. 643. 1. — *Motacilla grisea* Gm. S. N. p. 964. 91. — *Sylvia grisea* Lath. Ind. Orn. II. p. 532. 88. — *Myrmothera leucophrys* Vieill. N. D. XVII. p. 322. — Id. Enc. p. 683. — *Myiothera superciliaris* Licht. Doubl. no. 480-482. — *Thamnophilus griseus* ♂ Spix Av. Br. II. p. 29. t. 41. 1. — *Formicivora nigricollis* Sws. Z. Jour. II. p. 147. — *Myiothera leucophrys* Wied Beitr. III. p. 1075. — *Formicivora Deluzae* Mén. M. M. p. 484. t. 5. 2 (♀). — *Myrmothera grisea* Less. Tr. p. 396. — *Myiothera grisea* Temm. Tabl. méth. p. 17. — *Formicivora leucophrys* Gray Gen. B. I. p. 212. — *Ellipura grisea* Burm. Th. Br. III. p. 67. —

Brasilien — ♂ — 4 St.

42. 2. F. rufatra Orb.

Voy. p. 180. — *Thamnophilus griseus* ♀ Spix Av. Br. II. p. 29. t. 40. 1. — *Myiothera superciliaris* Wied (nec Licht.) Beitr. III. p. 1072. — *Formicivora nigricollis* Mén. (nec Sw.) M. M. p. 482. t. 3. 1-2. — *Thamnophilus rufater* Orb. & Lafr. Syn. p. 12. 12. — *Formicivora superciliaris* Burm. Th. Br. III. p. 74. —

Brasilien — ♂ ad. & jun. — 2 St.

Gen. MYRMOPHILA *) nov. gen. — Zwerg-Wollrücken.

43. 1. M. brevicauda Nob.

Formicivora brevicauda Sws. Z. Jour. II. p. 146 — Scl.

*) Von μύρμος (Ameise) und φιλέω (lieben). Diese kleinern, kurzschwänzigen Arten hat Sclater schon von den eigentlichen grössern *Formicivoren* getrennt, jedoch den Begriff der Gattung zu weit ausgedehnt. Bei seiner Gattung *Mormotherula* (!), welche wir in *Myrmotherium* umzuändern vorschlagen, bleiben die typischen Arten:

P. Z. S. 1857. p. 131.— *Myrmotherula brevicauda* Id. Syn. Form. II. p. 7. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

44. 2. M. axillaris *) Nob.

Le grisin de Cayenne ♀ Buff. Pl. enl. 643. 2. — *Myrmothera axillaris* Vieill. N. D. XVII. p. 321. — Id. Enc. p. 682. — *Myiothera fuliginosa* pt. Licht. Doubl. no. 483-484. — *Formicarius cirrhatus* Gray Gen. B. I. p. 211. — *Formicivora axillaris* Cab. O. N. p. 226. — *Myrmotherula axillaris* Scl. Syn. Form. II. p. 6. —
Cayenne — ♂ — 1 St.

Gen. RHOPIAS **) nov. gen. — Busch-Wollrücken.

45. 1. R. gularis Nob.

Thamnophilus gularis Spix Av. Br. II. p. 30. t. 41. 2. — *Myiothera cinerea* Wied Beitr. III. p. 1093. — *Myrmothera gularis* Mén. M. M. p. 476. t. 2. 2. — *Formicarius gularis* Gray Gen. B. I. p. 211. — *Rhopoterpe gularis* Cab. O. N. p. 228.— *Myrmotherula gularis* Scl. Syn. II. Form. p. 5.—
Brasilien — ♂ — 1 St.

Subfam. THAMNOPHILINÆ. Batara's.

Gen. DASYCEPHALA Sws. 1831. — Attila.
Attila (!) Less. 1831. *Dasyopsis* Rchb. 1850.

---

1. *M. pygmaeum.* — *Muscicapa pygmaea* Gm.;
2. *M. surinamense.* — *Sitta surinamensis* Gm.;
3. *M. multostriatum.* — *Myrmotherula multostriata* Scl. —

*) Den brasilianischen Vogel, welcher sich, wie schon Lichtenstein a. a. O. bemerkt, durch die nicht weiss gefärbten Weichen deutlich genug von dem Buffon's unterscheidet, trennen wir, als:

3. *M. melanogastra.* — *Myiothera fuliginosa* pt. Licht. Doubl. no. 483 bis 484. — *Thamnophilus melanogaster* Spix Av. Br. II. p. 31. t. 43. 1. — *Myiothera fuliginosa* Wied Beitr. III. p. 1067. — *Formicivora axillaris* Burm. Th. Br. III. p. 76. —

Ausser diesen 3 Arten gehören zu *Myrmophila* u. a. noch folgende:

4. *M. Menetriesi.* — *Myrmothera Menetriesii* Orb.;
5. *M. melaena.* — *Formicivora melaena* Scl.;
6. *M. unicolor.* — *Myrmothera unicolor* Mén.;
7. *M. urosticta.* — *Formicivora urosticta* Scl.;

**) Von ῥώψ (Gebüsch) wie λοχμίας von λοχμός (Dickicht) gebildet. Da diese früher zu *Rhopoterpe* gestellten kleinern Arten nicht recht zum Typus der Gattung: *R. torquata* Scl. passen, so scheint die generische Absonderung gerechtfertigt. Sclater hat sie zu *Myrmotherula* gestellt, von der sie sich durch die viel stärker entwickelten Läufe und Zehen genügend unterscheiden. Es gehören hierher:

2. *R. guttata.* — *Myrmothera guttata* Vieill.;
3. *R. ornata.* — *Formicivora ornata* Scl.;
4. *R. haematonata.* — *Formicivora haematonata* Scl.;
5. *R. Hauxwelli.* — *Formicivora Hauxwelli* Scl. —

46. 1. D. cinerea Sws.

Flycatch. — *Muscicapa cinerea* Gm. S. N. p. 933. 27. — *Tyrannus cinereus* Sws. Qu. Jour. XX. p. 278. —
Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

47. 2. D. citrinopyga Nob.

Dasycephala citreopyga (!) Bp. Not. Orn. p. 86. — *Attila citreopygia* Scl. Ibis 1859. p. 120. —
Xalapa — ♂ — 1 St.

48. 3. D uropygialis Cab.

Schomb. Reis. Guian. III. p. 686. —
Guiana — ♀ — 1 St.

49. 4. D. thamnophiloides Gray

Gen. B. I. p. 208. — *Muscicapa thamnophiloides* Spix Av. Br. II. p. 19. t. 26. 1. — *Tyrannus rufescens* Sws. Qu. Jour. XX. p. 278. — *Tyrannus rufus* Orb. & Lafr. Syn. p. 44. 9. — *Tyrannus thamnophiloides* Orb. Voy. p. 308. 209. —
Guiana — ♂ — 1 St.

Gen. THAMNOMANES Cab. 1847. — Schnäpper-Batara.

50. 1. T. caesius Cab.

O. N. p. 230. — *Lanius caesius* Licht. Doubl. no. 498-499. — *Muscicapa caesia* Wied Beitr. III. p. 826. — Temm. Pl. col. 17. 1-2. — *Tyrannus caesius* Less. Tr. p. 383. — Orb. Voy. p. 309. 210. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. HERPSILOCHMUS Cab. 1847. — Zwerg-Batara.

51. 1. H. pileatus Cab.

O. N. p. 224. — *Myiothera pileata* Licht. Doubl. no. 479. — *Formicivora pileata* Mén. M. M. p. 485. — *Thamnophilus pileatus* Orb. & Lafr. Syn. p. 12. 13. — Orb. Voy. p. 175. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. DYSITHAMNUS Cab. 1847. — Stummel-Batara.
Dasythamnus Burm. 1856 (crr.).

52. 1. D. mentalis Cab.

O. N. p. 223. — *Myiothera mentalis* Temm. Pl. col. 179. 3. *Myiothera poliocephala* Wied Beitr. III. p. 1098. — *Thamnophilus mentalis* Orb. & Lafr. Syn. p. 12. 15. — Orb. Voy. p. 177. — *Formicarius mentalis* Gray Gen. B. I. p. 211. — *Dasythamnus mentalis* Burm. Th. Br. III. p. 82. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

53. 2. D. guttulatus Cab.

O. N. p. 223. — *Lanius guttulatus* Licht. Doubl. no. 500-501. — *Myiothera stictothorax* Temm. Pl. col. 179. 1-2.— *Thamnophilus strictothorax* Wied Beitr. III. p. 1013. — *Myrmothera strictothorax* Less. Tr. p. 396. — *Thamnophilus striatothorax* Orb. & Lafr. Syn. p. 12. 16. — Orb. Voy. p. 176. — *Formicarius strictothorax* Gray Gen. B I. p. 211. — *Dasythamnus guttulatus* Burm. Th. Br. III. p. 81. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. PYGOPTILA Scl. 1858. — Wollbürzelchen.
Pygiptila (!) Scl.

54. 1. P. maculipennis Scl.

Syn. Form. I. p. 20. — *Thamnophilus stellaris* Id. (nec Spix) P. Z. S. 1851. p. 112. — *Thamnophilus maculipennis* Id. Dr. Arr. Gen. Thamn. no. 36. —
Cayenne — ♂ — 1 St.

55. 2. P. margaritata Scl.

Syn. Form. I. p. 21. — *Myrmeciza margaritata* Id. P. Z. S. 1854. p. 253. t. 70. —
Peru — ♂ — 1 St.

Gen. ERIONOTUS *) nov. gen. — Woll-Batara.

56. 1. E. caerulescens Nob.

Thamnophilus caerulescens Vieill. N. D. III. p. 311.— Id. Enc. p. 743 (♂). — *Thamnophilus auratus* Id. N. D. III. p. 312. — Id. Enc. p. 743 (♀). — *Thamnophilus maculatus* Orb. & Lafr. Syn. p. 11. 7. — Orb. Voy. p. 172. — Scl. Gen. Thamn. no. 34 (♂ jun. & ♀). — *Thamnophilus ventralis* Id. l. l. no. 30 (♂ adult.).— *Thamnophilus pileatus* Burm. (necSws.) Th. Br. III. p. 95 (♂ adol. & ♀ jun.).— Scl. Syn. Form. I. p. 13 (♂ adult. & ♀). —
Buenos Ayres — ♂ adol., ♀ jun.; Rio Grande— ♂ jun.; Brasilien —♂ adult., ♂ adol., ♀ adult. — 6 St.

57. 2. E. ambiguus Nob.

Thamnophilus naevius Vieill. (nec Gm.) N. D. III. p. 316. — Id. Enc. p. 747.— *Thamnophilus ambiguus* Sws. Z. Jour. II. p. 91 (♂ ad.). — *Thamnophilus pileatus* Id. l. l. p. 91 (♂ jun.).— *Thamnophilus ferrugineus* Id. l. l. p. 92 (♀).—

*) Von ἔριον (Wolle) und νῶτος (Rücken). Diese Gattung umfasst die kleinern, ungehäubten Batara's mit schwächerm, weniger würgerartigen Schnabel; das Gefieder ist beim Männchen vorherrschend grau, beim Weibchen bräunlich, mit weisser Fleckenzeichnung. —

& t. 38. 2 (♂ ad. & juv.). — *Thamnophilus nigricans* Wied Beitr. III. p. 1006. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

58. 3. E. naevius Nob.

Lanius naevius Gm. S. N. p. 308. 44. — *Lanius punctatus* Shaw Gen. Z. VIII. 2. p. 327. — *Thamnophilus naevius* Vieill. N. D. III. p. 316. — Id. Enc. p. 747. — *Thamnophilus caerulescens* Lafr. R. Z. 1853. p. 388. —
Cayenne — ♂, ♀; Guiana — ♂ — 3 St.

Gen. HYPOLOPHUS *) nov. gen. — Hauben-Batara.

59. 1. H. cirrhatus Nob.

Lanius canadensis (!) Lin. S. N. p. 134. 4 (♀). — *Turdus cirrhatus* Gm. S. N. p. 826. 91 (♂). — *Lanius pileatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 76. 31. — *Tyrannus atricapillus* Vieill. Ois. Am. sept. p. 78. t. 48 (♂). — *Tyrannus canadensis* Id. l. l. p. 79. t. 49 (♀) — *Thamnophilus cirrhatus* Id. N. D. III. p. 315. — Id. Enc. p. 745. — *Thamnophilus atricapillus* Scl. Gen. Thamn. no. 23. —
Cayenne — 2 ♂; Guiana — ♂ — 3 St.

60. 2. H. albinuchalis Nob.

Thamnophilus albinuchalis Scl. P. Z. S. 1855. p. 18. —
Neu-Granada — ♂ juv. — 1 St.

61. 3. H. pulchellus nov. sp.

Supra laete rufescente-brunneus, capitis lateribus, gutture medioque pectore nigris — cristae plumis mediis longissimis pectoreque unicoloribus exceptis — albo-marginatis; subtus albescens, pectoris lateribus cinerascentibus, hypochondriis brunnescentibus; alis nigris, tectricibus externo pogonio late albis, interno brunnescentibus, remigibus partim albo-, partim brunnescente-marginatis, rectricibus nigris, albo-marginatis et terminatis, unae utrinque extimae externo pogonio albo. — Long. tot. 6″ 2‴, al. 2″ 10‴, caud. 2″ 5‴, tars. 1″, rostr. culm. 9‴. —
Cartagena — ♂ ad. — 1 St.

---

*) Von ὑπόλοφος (subcristatus). Es unterscheidet sich diese Gattung von der vorigen durch weit stärkern Schnabel und verlängerte Haubenfedern und erinnert in der Färbung an *Formicivora*. Es gehören noch ferner dahin:

4. *H. cristatus.* — *Thamnophilus cristatus* Wied (falls wirklich von *H. cristatus* verschieden);
5. *H. leucauchen.* — *Thamnophilus leucauchen* Scl.;
6. *H. melanonotus.* — *Thamnophilus melanonotus* Scl.;
7. *H. luctuosus.* — *Lanius luctuosus* Licht. —

Gen. RHOPOCHARES *) nov. gen. — Busch-Batara.

62. 1. R. torquatus Nob.

Thamnophilus torquatus Sws. Z. Journ. II. p. 89. — *Thamnophilus scalaris* Wied Beitr. III. p. 999. — *Thamnophilus pectoralis* Sws. Two Cent. p. 283. — *Thamnophilus atropileus* Orb. & Lafr. Syn. p. 11. 6. — Orb. Voy. p. 173. — Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

63. 2. R. argentinus **) nov. sp.

?*Batara acanelado* Azar. Apunt. no. 215. — *Thamnophilus ruficapillus* Vieill. N. D. III. p. 218. — Id. Enc. p. 748 (♀).— Similis praecedenti, sed major; cauda longiore, supra obscurius cinnamomeo-brunnens, pileo minus nigro, subtus magis latiusque fasciatus. —

Montevideo — ♂ ad.; Buenos Ayres — ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. THAMNOPHILUS Vieill. 1816. — Batara.

Batara (!) Temm. 1820.

64. 1. T. palliatus Wied

Beitr. III. p. 1010. — *Lanius palliatus* Licht. Doubl. no. 492-493. — *Thamnophilus lineatus* Spix Av. Bras. II. p. 24. t. 33. 1-2. — *Thamnophilus fasciatus* Sws. Z. Journ. II. p. 88. — *Thamnophilus badius* Id. B. Braz. t. 65-66. — *Thamnophilus fasciatus & palliatus* Gray Gen. B. I. p. 297.— Brasilien — 4 ♂, 3 ♀ — 7 St.

65. 2. T. doliatus Vieill.

Enc. p. 746. — Sel. Gen. Thamn. p. 12. 14. — Burm. Th. Bras. III. p. 98. — *Lanius doliatus* Lin. S. N. p. 136. 16 (♂). — *Lanius rubiginosus* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 18 (♀). — Brasilien — 2 ♂ ad., ♂ jun.; Cayenne — 2 ♀ — 5 St.

66. 3. T. affinis ***) nov. sp.

Simillimus praecedenti, sed maior; fasciis omnibus, imprimis autem caudae latius distantibus. — Long. tot. 7". —

Xalapa — ♂ jun., ♂ juv. — 2 St.

---

*) Von ῥώψ (Gebüsch) und χαίρω (sich freuen). Zeichnet sich durch schlankere Gestalt und schwächere Schnabelbildung vor ihren Verwandten aus. —

**) Vertritt die vorige Art im Süden, und ist vielleicht Azara's *Batara acanelado*. Er ist grösser und langschwänziger als *R. torquatus*, oben dunkler und weniger intensiv rothbraun; auch scheint die Haube nie so einfarbig schwarz zu werden, und unten erstreckt sich die breitere Bänderung weiter hinab, so dass auch Kehle und Bauchseiten deutliche Spuren davon zeigen. —

***) Von *T. doliatus* durch die namentlich auf dem Schwanze weiter auseinanderstehenden Binden und die bedeutend grössern Dimensionen leicht zu unterscheiden; ausser-

67. 4. T. albicans Lafr.

R. Z. 1844. p. 82. — Scl. Gen. Thamn. p. 13. 15. — Cartagena — ♂ ad. — 1 St.

Gen. DIALLACTES *) Rchb. 1850. — Busch-Würger.

Taraba (!) Less. 1831.

68. 1. D. maior Nob.

Thamnophilus maior Vieill. N. D. III. p. 313. — Id. Enc. p. 744. — *Lanius stagurus* Licht. Doubl. no. 487-488. — *Thamnophilus stagurus* Wied Beitr. III. p. 990. — *Thamnophilus albiventris* Spix Av. Bras. II. p. 23. t. 32. — *Thamnophilus bicolor* Sws. Z. Journ. II. p. 86 (♂). — *Thamnophilus cinnamomeus* Id. I. I. p. 87. (♀). — *Thamnophilus magnus* Less. Trait. p. 375. — *Thamnophilus cinnamomeus, bicolor & stagurus* Gray Gen. B. I. p. 297. — Brasilien — 2 ♂ ad., ♂ jun.; Guiana — ♀ — 4 St.

69. 2. D. melanurus Nob.

Thamnophilus maior Tsch. (nec Vieill.) Consp. p. 17. 89. — Id. Faun. Per. p. 170. — *Thamnophilus melanurus* Gould Ann. N. H. XV. p. 345. — Id. P. Z. S. 1855. p. 69. t. 83. — Scl. Syn. Form. I. p. 10. — Neu-Granada — ♀ — 1 St.

Gen. HYPOEDALEUS **) nov. gen. — Perl-Batara.

70. 1. H. guttatus Nob.

Thamnophilus guttatus Vieill. N. D. III. p. 315. — *Lanius meleager* Licht. Doubl. no. 491. — *Thamnophilus maculatus* Such Z. Journ. I. p. 557. t. suppl. 6. — *Thamnophilus meleagris* Gray Gen. B. I. p. 297. — *Thamnophilus meleager* Scl. Gen. Thamn. no. 4. — Brasilien — ♂ jun. — 1 St.

Gen. LOCHITES ***) Nob. — Sperber-Batara.

Nisius (!) & *Othello* (!) Rchb. 1850.

---

dem bietet die Schnabelbildung Unterschiede: bei den südamerikanischen Vögeln ist die Schnabelfirste 8‴ lang, die Schnabelhöhe $2^1/_2$‴; bei denen aus Xalapa beträgt die Länge der Schnabelfirste 7‴, die Schnabelhöhe $3^1/_2$‴. —

*) Hierher gehören noch:

3. *D. transandeanus.* — *Thamnophilus transandeanus* Scl.;

4. *D. corvinus.* — *Thamnophilus corvinus* Gould;

5. *D. melanocephalus.* — *Thamnophilus melanoceps* (!) Spix. —

**) Von ὑποιδάλιος (subtumidus); durch die schon an *Cymbolaemus* erinnernde, angeschwollene Schnabelbildung ausgezeichnete Gattung. —

***) Von λοχίτης (im Hinterhalte auflauernd). —

71. 1. L. severus Nob.

Lanius severus Licht. Doubl. no. 489-490. — *Thamnophilus niger* Such Z. Journ. I. p. 589 (♂). — *Thamnophilus Swainsonii* Id. l. l. p. 556. t. suppl. 5 (♀). — *Thamnophilus Othello* Less. Cent. Z. p. 65. t. 19 (♂). — *Batara Othello* Id. Tr. p. 347. — *Thamnophilus severus* Gray Gen. B. I. p. 297. — *Thamnophilus luctuosus* Id.*) (nec Licht.) ibid. — Bp. Consp. I. p. 198. — Burm. Th. Bras. III. p. 90.—

Brasilien — ♂, 2 ♀ — 3 St.

72. 2. L. Leachi Nob.

Thamnophilus Leachii Such Z. Journ. I. p. 588 (♂). — *Thamnophilus ruficeps* Id. l. l. p. 589 (♀). — *Lanius variolosus* Licht. in Mus. Berol. — Burm. Th. Bras. III. p. 90. —

Montevideo — ♂; Brasilien — ♀ — 2 St.

Gen. THAMNARCHUS **) nov. gen. — Riesen-Batara.

Batara (!) Less. 1831 (nec Temm. 1820).

73. 1. T. cinereus Nob.

Thamnophilus cinereus Vieill. N. D. XXXV. p. 200. — Id. Enc. p. 750 (♂). — *Thamnophilus rufus* Id. N. D. XXXV. p. 200 (♀). — *Thamnophilus cristatellus* Id. ibid. — Id. Enc. p. 749. — *Lanius undulatus* Mikan Del. Flor. & Faun. Bras. t. 2. — *Thamnophilus Vigorsii* Such Z. Journ. I. p. 557. t. suppl. 7-8. — *Thamnophilus gigas* Sws. Class. II. p. 220. — *Vanga striata* Quoy & Gaim. Voy. Uran. I. p. 98. t. 18-19. — *Batara striata* Less. Tr. p. 347. — *Thamnophilus undulatus* Gray Gen. B. I. p. 297. — *Batara cinerea* Scl. Syn. Form. I. p. 7. — *Lanius procerus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂, ♀; Rio Grande — ♀ — 3 St.

Gen. BIATAS ***) Nob. — Kletter-Batara.

Biastes Rchb. 1853 (nec Panz.) 1806).

74. 1. B. nigropectus Nob.

Anabates nigropectus Lafr. R. Z. 1850. p. 107. t. 1. 3. — *Biastes nigropectus* Rchb. Handb. spec. Orn. I. p. 175 Anm. — Burm. Th. Bras. III. p. 84. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

*) Gray und Bonaparte haben hier den *Lanius luctuosus* Licht. irrthümlich zu *Thamnophilus Othello* Less. gezogen, und Reichenbach scheint ihnen darin gefolgt zu sein, da er als Typus seiner Gattung *Othello* (!) den *Lanius luctuosus* Licht. angiebt, während er offenbar dessen *Lanius severus* meint. —

**) Von *Θάμνος* (Gebüsch) und *ἄρχω* (herrschen). —

***) Von *βιάτας* = *βιάστης*. Diese Gattung gehört unbedingt hierher, da die Beschildung an beiden Seiten des Laufes ganz wie bei den *Thamnophilinen* ist. —

Fam. PTEROPTOCHIDÆ. Rallenschlüpfer.

Subfam. PTEROPTOCHINÆ. Rallenschlüpfer.

Gen. SCYTALOPUS Gould 1836. — Lederschnäbelschen.

Sylviaxis (!?) Less. 1840.

75. 1. S. indigoticus Cab.

Orn. Not. p. 220. — *Myiothera indigotica* „Licht." Wied Beitr. III. p. 1091. — *Malacorhynchus albiventris* Mén. M. M. p. 525. t. 13. 2. — *Malacorhynchus indigoticus* Id. l. l. p. 529. — *Scytalopus albogularis* Gould P. Z. S. 1836. p. 90. — *Pteroptochus albiventris* & *indigoticus* Gray Gen. B. I. p. 155. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. TRIPTORRHINUS Cab. 1847. — Plattnäschen.

76. 1. T. paradoxus Cab.

Orn. Not. p. 219. — *Troglodytes paradoxus* Kittl. Ueb. ein. Vög. Chil. p. 12. t. 5. — *Malacorhynchus chilensis* Mén. M. M. p. 520. — *Platyurus lepturus* Sws. Class. II. p. 319. — *Scytalopus paradoxus* Less. — *Leptonyx paradoxus* Orb. Voy. p. 197. — *Pteroptochus chilensis* Gray Gen. B. I. p. 155. —

Araucana — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. ACROPTERNIS *) nov. gen. — Spiessnagel.

77. 1. A. orthonyx Nob.

Merulaxis orthonyx Lafr. R. Z. 1843. p. 131. — *Pteroptochus orthonyx* Gray Gen. B. I. p. 155. — *Triptorrhinus orthonyx* Cab. Orn. Not. p. 220. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. PTEROPTOCHUS Kittl. 1831. — Tapacolo.

Leptonyx Sws. 1832.

78. 1. P. rubecula Kittl.

Ein. Vög. Chil. p. 7. t. 2. — *Megalonyx rubecula* Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 4. — *Megalonyx rufogularis* Orb. Voy. t. 7. 3-4. — *Leptonyx rubecula* Id. l. l. p. 196. —

Araucana — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

---

*) Von ἀκρός (in eine Spitze auslaufend) und πτέρνις (Ferse). Durch die abnorme Bildung der Hinterzehe ist diese Gattung wohl genügend charakterisirt. —

79. 2. P. albicollis Kittl.

Ein. Vög. Chil. p. 8. t. 3. — *Megalonyx medius* Less. Ill. Z. t. 60. — *Megalonyx albicollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 15. 3. — Orb. Voy. t. 8. 2. — *Leptonyx albicollis* Id. l. l. p. 186. —

Araucana — ♂ — 1 St.

Gen. HYLACTES King 1830. — Turco.

Megalonyx Less. 1831.

80. 1. H. megapodius Gray

Gen. B. I. p. 154. — *Pteroptochus megapodius* Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 10. t. 4. — *Megalonyx rufus* Less. Cent. Z. t. 66. — Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 1. — *Leptonyx macropus* Sws. Z. Ill. t 117. — Orb. Voy p. 16. 1. — *Hylactes rufus* Cab. Orn. Not. p. 219. —

Araucana — ♂, ♀ — 2 St.

81. 2. H. Tarni King

P. Z. S. 1830. p. 15. — *Megalonyx ruficeps* Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 2. — Orb. Voy. t. 8. 1. — *Leptonyx Tarnii* Id. l. l. p. 198. —

Araucana — ♂, ♀ — 2 St.

Subfam. MENURINÆ. Leiervögel.

Gen. MENURA Davis 1820. — Leierschwanz.

Parkinsonius (!) Bechst. — *Megapodius* pt. Wagl. 1837.

82. 1. M. Alberti „Gould

1850“ Bp. Consp. I. p. 215. —

Nord-Australien — ♂, ♀ — 2 St.

83. 2. M. superba Davis

Lin. Trans. VII. p. 207. t. 22. — Gould B. Austr. III. t. 14. — *Menura lyra* Shaw Nat. Misc. t. 577. — *Menura Novae-Hollandiae* Lath. Ind. Orn. suppl. 61. — *Menura vulgaris* Flemm. — *Parkinsonius admirabilis* Bechst. in Lath.'s Uebers. — *Megapodius menura* Wagl. Syst. Av. no. 1. — *Menura paradisea* Sws. Class. II. p. 351. —

Neu-Süd-Wales — ♂, ♀ — 2 St.

Fam. ANABATIDÆ. Steiger.

Subfam FURNARIINÆ. Töpfervögel.

Gen. GEOBATES Sws. 1837. — Erdläufer.

84. 1. G. brevicaudus Sws.

Two Cent. p. 322. 126. — Rchb. Handb. I p. 215. 523. — *Geositta brevicauda* Gray Gen. B. I. p. 134. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. GEOSITTA Sws. 1837. — Casarita.

Certhilauda Orb. 1839 (nec Sws. 1837). *Euthyonyx* Rchb. 1850.

85. 1. G. cunicularia Gray

List Gen. B. p. 22. — Rchb. Handb. I. p. 215. 525. t. 549. 3736. — *Alondra minera* Azar. Apunt. no. 148. — *Alauda cunicularia* Vieill. N. D. I. p. 369. — Id. Enc. p. 323. — *Geositta anthoides* Sws. Two Cent. p. 323. 129. — *Certhilauda cunicularia* Orb. Voy. p. 358. 288. t. 43. 1. — *Furnarius cunicularius* Gray Voy. Beagl. p. 65. — *Alauda erythroptera* Licht. in Mus. Berol. —
Patagonien — ♀ — 1 St.

86. 2. G. peruviana Lafr.

R. Z. 1847. p. 75. — Rchb. Handb. I. p. 217. 527. —
Peru — ♂ — 1 St.

Gen. FURNARIUS Vieill. 1816. — Töpfervogel.

Opetiorhynchus Temm. 1820. *Figulus* Spix 1824. *Ipnodomus* Glog. 1842.

87. 1. F. assimilis *) nov. sp.

Similis insequenti, sed paulo minor; supra et in pectore rufescentior, pileo minus fuscescente, remigis primae interno pogonio macula rufa minore. — Long. tot. 6″ 2‴, al. 3″ 5‴, caud. 2″ 3‴, rostr. culm. 9‴, tars. 1″ 1‴, dig. med. exc. ung. 10‴. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

*) Südlicher, etwas kleinerer Repräsentant des Folgenden, von dem er sich durch die röthlichere Färbung der Oberseite, die mehr rothbraune als schwärzliche Haube, den röthlichern Anflug der Brustgegend und die gefleckte erste Schwinge unterscheidet. —

88. 2. F. leucopus *) Sws.

Two Cent. p. 325. 133. t. 67a. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 688. 110. — Rchb. Handb. I. p. 204. 498. t. 543. 3711. — Guiana — ♂ — 1 St.

89. 3. F. griseiceps **) nov. sp.

Similis praecedenti, sed maior; supra pallidior, pileo griseo; subtus albescens, gula albissima, pectore hypochondriisque vix pallide ochrascentibus, remigis primae interno pogonio macula rufa maiore. — Long. tot. 6″ 9‴, al. 4″, caud. 2″ 7‴, rostr. culm. 1″, tars. 1″ 4‴, dig. med. exc. ung. 1″. — Peru — ♂ — 1 St.

90. 4. F. figulus Gray

Gen. B. I. p. 132. — Rchb. Handb. I. p. 202. 492. t. 544. 3712. — *Turdus figulus* „Jll." Licht. Doubl. p. 40. 450. — *Furnarius rufus* Vieill. (nec Gm.) Gal. II. p. 301. t. 182. — *Opetiorhynchus rufus* Wied Beitr. III. p. 667. — *Furnarius melanotis* Sws. Two Cent. p. 324. 132. — Bahia — ♂, ♀ — 2 St.

91. 5. F. rufus Orb.

Voy. p. 250. 129. t. 55. 2. — *Merops rufus* Gm. S. N. p. 465. 20. — *Turdus badius* Licht. Doubl. p. 40. 451. — *Figulus albogularis* Spix Av. Bras. I. p. 76. t. 78. 1-2. — *Opetiorhynchus ruficaudus* Wied Beitr. III. p. 671. — *Furnarius badius* Rchb. Handb. I. p. 202. 492. t. 543. 3709. — Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

Gen. RHODINOCICHLA Hartl. 1853. — Rosen-Töpfervogel.

Rhodinocincla Rchb. 1853. *Cichlalopia* (♀!) Bp. 1854.

92. 1. R. rosea Hartl.

Journ. Orn. 1853. p. 33. — *Furnarius roseus* Less. Jll. Z. t. 5 (♂). — *Turdus vulpinus* Hartl. R. Z. 1849. p. 276 (♀). — *Rhodinocincla rosea* Rchb. Handb. I. p. 202. 491. t. 543. 3707-8. — *Cichlalopia vulpina* Bp. Not. Orn. p. 29 (♀). — Caracas — 2 ♂ ad., ♂ jun. — 3 St.

Gen. HENICORNIS Gray 1840. — Einsiedler.

Eremobius Gould 1838 (nec Steph. 1829). *Enicornis* (!) Gray 1840.

---

*) Die erste Schwinge ist hier ganz schwarz. — G. L. 6″ 4‴, Fl. 3″ 7‴, Schw. 2″ 5‴, Schnabelf. 10‴, Lauf 1″, Mittelz. o. Kr. 9‴. —

**) Weit heller und grösser als die beiden Vorhergehenden, von denen er sich durch seine graue Haube am deutlichsten auszeichnet, auf der ersten Schwinge hat er einen sehr grossen schwarzen Fleck. —

93. 1. H. Gouldi *) Nob.

Eremobius phoenicurus Gould Voy. Beagl. p. 69. t. 21 (♀ an ♂ juv.) — *Enicornis phoenicura* Gray List. Gen. B. p. 22. — Id. Gen. B. I. p. 133. 1. — *Enicornis melanura* Id. l. l. p. 133. 2. t. 4 (♂ ad.). — *Henicornis phoenicura* Rchb. Handb. I. p. 206. 501. t. 545. 3718. — *Henicornis melanura* Id. l. l. p. 206. 502. t. 545. 3719. —

Patagonien — ♂ jun. — 1 St.

Gen. COPROTRETIS **) Nob. — Mistbohrer.

Upucerthia (!) Geoffr. 1832. *Uppucerthia* (!) Orb. 1839. *Upupicerthia* (!) Agass. 1848.

94. 1. C. dumetoria Nob.

Upucerthia dumetoria Geoffr. & Orb. Ann. Mus. I. p. 393. — Rchb. Handb. I. p. 214. 521. t. 547. 3734. — *Furnarius dumetorum* Orb. — *Uppucerthia dumetorum* Orb. & Lafr. Syn. p. 20. — Gould Voy. Beagl. p. 66. t. 19. — *Cinclodes dumetorius* Gray Gen. B. I. p. 152. 9. —

Patagonien — ♂ — 1 St.

Gen. CILLURUS Cab. 1844. — Uferwipper.

Opetiorhynchus Kittl. 1831 (nec Temm. 1820). *Cinclodes* (!) Gray 1840.

95. 1. C minor ***) nov. sp.

Similis *C. fusco*, sed minor, ubique obscurior, supra magis

*) Der zuerst von Gould beschriebene und abgebildete Vogel scheint noch im jugendlichern Färbungszustande zu sein, während Gray wahrscheinlich ein ganz altes Exemplar vor sich hatte. Wir schliessen dieses aus dem unsrigen, das zwischen beiden Arten in der Mitte stehend von *H. phoenicura* den weisslichen Augenbrauenstreif, jedoch schon weniger markirt, von *H. melanura* die rostrothe Färbung des Bürzels besitzt. Auch zeigt die Schwanzfärbung deutlich, wie die beiden bisherigen Arten in einander übergehen, indem bei unserm Vogel die Schwanzfedern nur noch am Grunde und die äussersten am Rande rostroth sind, während Gray's leider ohne Beschreibung gegebene Abbildung den ganzen Schwanz schwarz zeigt, und bei dem Gould'schen Exemplare das Roth noch die grössere Hälfte desselben einnimmt. Aus diesem Grunde sind beide Namen wohl unstatthaft. Die von Gould erwähnte rostrothe Flügelbinde zeigt der uns vorliegende Vogel gleichfalls, und ist darunter zu verstehen, dass sämmtliche Schwingen, mit Ausnahme der 3 vordersten, wie bei den meisten der hierher gehörigen Gattungen rostroth sind. Im Berliner Museum befindet sich ein in der Färbung mit dem unsrigen völlig übereinstimmendes Exemplar aus Chile. —

**) Von κόπρος (Mist) und τιτράω (bohren). — Die Uebrigen von d'Orbigny in seiner Voyage dans l'Amérique méridionale zu *Uppucerthia* gestellten Arten gehören nicht hierher, sondern theils zu *Cillurus*, theils zu *Ochetorhynchus*. *U. montana* ist nämlich identisch mit *Ochetorhynchus ruficaudus* Meyen, und *U. andecola* wird wahrscheinlich nur ein jüngerer Vogel desselben sein; *U. nigrofumosa* und *U. vulgaris* gehören zu *Cillurus*. —

***) Diese kleinste der bis jetzt bekannten Arten ist bereits vor mehrern Jahren an

ferrugineus, caudae tectricibus inferioribus rufo-fuscis. — Long. tot. 6″ 9‴, al. 3″ 6‴, caud. 2″ 9‴, rostr. culm. 6‴, tars. 11‴, dig. med. exc. ung. 8½‴. —

Araucana — ♂ — 1 St.

Gen. LOCHMIAS Sws. 1827. — Kothvögelchen.

Picerthia (!) Geoffr. 1832.

96. 1. L. nematura Cab.

Orn. Not. p. 231. — Burm. Th. Bras. III. p. 6. — *Myiothera nematura* Licht. Doubl. p. 43. 472. — *Furnarius St.-Hilarii* Less. Trait. p. 307. — *Lochmias squamulata* Sws. B. Braz. t. 38. — *Myrmothera nematura* Mén. M. M. p. 474. — *Lochmias St.-Hilairii* Gray List Gen. B. p. 22. — Id. Gen. B. I. p. 138. — *Lochmia nematura* Rchb. Handb. I. p. 178. 411. t. 602. 4055. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. SCLERURUS Sws. 1827. — Wurfvogel.

Tinactor Wied 1831. *Oxypyga* Mén. 1834. *Scelurus* (!) Burm. 1850 & 1856.

97. 1. S. caudacutus Gray

Gen. B. I. p. 210. — *Thamnophilus caudacutus* Vieill. N. D. III. p. 310. — Id. Enc. p. 742. — *Myiothera umbretta* Licht. Doubl. p. 43. 471. — *Tinactor fuscus* Wied Beitr. III. p. 1106. — *Myioturdus umbretta* Mén. M. M. p. 468. — *Oxypyga scansor* Id. l. l. p. 540. t. 11. — *Sclerurus albogularis*

Bonaparte zu den Nachträgen seines Conspectus mitgetheilt, wir wissen jedoch nicht, ob sie früher schon von ihm publicirt ist.

Am nächsten steht derselben:

2. *C. fuscus.* — *Alondra parda* Azar. Apunt. no. 147. — *Anthus fuscus* Vieill. Enc. p. 325. — *Upucerthia vulgaris* Orb. & Lafr. Syn. p. 22. 5. — Orb. Voy. p. 372. 313. t. 57. 1. — *Cinclodes vulgaris* Gray Gen. B. I. p. 132. — *Opetiorhynchus vulgaris* Rchb. Hdb. I. p. 212. 515. t. 547. 3727-28. —

Ausserdem gehören noch hierher:

3. *C. nigrofumosus* Cab. Tsch. Consp. p. 21. 112. — *Upucerthia nigrofumosa* Orb. & Lafr. Syn. p. 23. 6. — Orb. Voy. p. 372. 314. — *Opetiorhynchus nigrofumosus* Gray Voy. Beagl. p. 68. — *Cinclodes nigrofumosus* Bp. Consp. I. p. 214. — Rchb. Handb. I. p. 211. 515. t. 548. 3731-32;

4. *C. palliatus* Tsch. Consp. p. 21. 110. — Id. Faun. Per. p. 235. t. 15. 2. — Rchb. Handb. I. p. 214. 520. t. 548. 3735. — *Cinclodes palliatus* Bp. Consp. I. p. 214;

5. *C. patagonicus.* — *Motacilla patagonica* Gm. S. N. p. 958. 66. — *Sylvia patagonica* Lath. — *Motacilla gracula* Forst. Descr. p. 324. — *Furnarius chilensis* Less. Man. II. p. 17. — Id. Trait. p. 307. — *Furnarius Lessoni* Dum. Atl. t. 75. 1. — *Opetiorhynchus rupestris* Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 16. t. 8. — *Uppucerthia rupestris* Orb. & Lafr. Mag. Z. 1838. p. 21. — *Cinclodes patagonicus* Gray List Gen. B. p. 22. — Rchb. Handb. I. p. 211. 514. t. 547. 3725-26. — *Cillurus rupestris* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 45. —

Sws. B. Braz. t. 87. — *Myiothera caudacuta* Lafr. Mag. Z. 1838. t. 10. — *Formicarius umbrettus* Gray Gen. B. I. p. 211. — *Scelurus caudacutus* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 45. — Id. Th. Bras. III. p. 45. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Subfam. SYNALLAXINÆ. Baumschlüpfer.

Gen. PHLEOCRYPTES *) nov. gen. — Binsensteiger.

98. 1. P. melanops Nob.

Sylvia melanops Vieill. N. D. II. p. 232. — Id. Enc. p. 434. — *Synallaxis dorsomaculatus* Orb. & Lafr. Syn. p. 21. 1. — Orb. Voy. p. 237. — *Synallaxis dorsomaculata* Id. l. l. t. 14. 1-2. — *Oxyurus dorsomaculatus* Gould Voy. Beagl. p. 82. — *Synallaxis melanops* Gray Gen. B. I. p. 136. — *Bathmidura dorsomaculata* Rchb. Handb. I. p. 164. 365. t. 522. 3615. —

Chile — ♀ — 1 St.

99. 2. P. schoenobaenus **) nov. sp.

Simillimus praecedenti, sed multo maior, rostro longiore; supra obscurius tinctus, rectricibus mediis totis reliquorumque apicibus olivascente- (nec, ut in praecedente, rufescente-) brunneis, superciliis cinerascentibus; subtus albidus, gutture sordide lavato. — Long. tot. 5″ 6‴, al. 2″ 8‴, caud. 2″ 5‴, rostr. culm. 8‴, tars. 11‴, dig. med. exc. ung. 8‴. —

Peru — ♂ — 1 St.

Gen. SCHIZURA Cab. 1847. — Spaltschwänzchen.

Sylviorthorhynchus (!) Gay 1844.

100. 1. S. Desmursi Rchb.

Handb. I. p. 158. 346. t. 518. 3591. — *Sylviorthorhynchus Desmurii* Gay Hist. fisic. y politic. Chil. 1844. — Des Murs Iconogr. Orn. livr. 8. 5-6. — *Sylviorthorhynchus maluroides* Id. l. l. t. 45. — Bp. Consp. I. p. 213. — *Schizura maluroides* Cab. Orn. Not. p. 338. —

Chile — ♂ — 1 St.

---

*) Von φλέως (Binse) und κρύπτω (sich verbergen). Der verhältnissmässig längere, gestrecktere Schnabel, der kürzere, stufenförmige, weniger rigide Schwanz und die stärker entwickelten Zehen charakterisiren diese Gattung. Ebenso deutet die eigenthümliche an unsere Schilfrohrsänger (*Calamodus* Kaup) erinnernde Rückenfärbung auf die durch d'Orbigny's Beobachtungen bestätigte Lebensweise hin. —

**) Dieser von dem Reisendem Warscewicz in den Binsen am Titicaca-See aufgefundene Vogel ist der grössere, nördliche Repräsentant des vorigen und die zweite gute Art dieser Gattung. —

Gen. LEPTASTHENURA *) Rchb. 1853. — Zartschwänzchen.

Bathmidura Rchb. 1853 (nec *Bathmidurus* Cab. 1847).

101. 1. L. aegithaloides Rchb.

Handb. I. p. 160. 353. t. 519. 3595-96. — *Synallaxis aegithaloides* Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 15. t. 7. — *Synallaxis aegithaloides* Orb. & Lafr. Syn. p. 23. 9. — Orb. Voy. p. 243. — *Synallaxis Thelotii* Less. R. Z. 1840. p. 99. — *Synallaxis aegithaloides* & *Thelotii* Gray Gen. B. I. p. 135-136. —

Chile — ♂; Patagonien — ♂ — 2 St.

Gen. SYNALLAXIS Vieill. 1818. — Baumschlüpfer.

Anabates Temm. 1820. *Parulus* Spix 1824. *Anabacerthia* (!) Lafr. 1841.

102. 1. S. albescens Temm.

Pl. col. 227. 2 (juv.). — Rchb. Handb. I. p. 159. 349. t. 518. 3592. — Burm. Th. Bras. III. p. 39. — *Parulus ruficeps* Spix Av. Bras. I. p. 85. t. 86. 1. —

Brasilien — ♂ — 2 St.

103. 2. S. guianensis **) Nob.

Rouge-queue de la Guyane (Cayenne) Buff. Pl. enl. 686. 2. — *Motacilla guianensis* Gm. S. N p. 988. 161. — *Anabates guianensis* Temm. Man. I. p. 82. 6. — Gray List Gen. B. p. 23. — Bp. Consp. I. p. 210. — Rchb. Handb. I. p. 175. 396. t. 526. 3634. — *Anabates ruficaudus* Temm. Tabl. méth. p. 66. — *Sphenura cinnamomea* Licht. (nec Gm.) Doubl. p. 42. 462. —

Cayenne — ♂ — 1 St.

104. 3. S. ruticilla Nob.

Sphenura ruticilla ♀ *gvajacina* Licht. in Mus. Berol. — Supra brunneo-olivacea, loris albescentibus tenuissime nigricante-adspersis, capite grisescentiore, uropygio brunnescentiore, rectricibus alarumque tectricibus minoribus rufocinnamomeis, maioribus cinnamomeo-marginatis; subtus

*) Hierher stellen wir noch:

2. *L. setaria.* — *Synallaxis setaria* Temm. Pl. col. 311. 2. — *Bathmidura setaria* Rchb. Handb. I. p. 163. 361. t. 520. 3604., — nach Gray Typus des Genus *Bathmidura* Rchb.; denn dieselbe möchte wohl nicht gut generisch von *L. aegithaloides* zu trennen sein. —

**) Wir glauben Buffon's Vogel richtig wiedererkannt zu haben und stellen denselben ohne Zweifel zu *Synallaxis*. Lichtenstein hat ihn irrthümlich auf *Certhia cinnamomea* Gm. gedeutet, sonst aber zwar kurz, doch ziemlich kenntlich beschrieben. Da Temminck für denselben seine Gattung *Anabates* bildete, so ist diese somit nur als Synonym zu *Synallaxis* Vieill. zu stellen. —

dilutior, gula albicante, pectus versus sensim flavescente, pectore abdomineque olivaceo - grisescentibus; maxilla nigra, mandibula rufescente. — Long. tot. 5″ 5‴, al. 2‴ 4‴, caud. 2″ 5‴, rostr. culm. 5‴, tars. 9‴. —

Buenos Ayres — ♂ — 1 St.

105. 4. S. castanea Scl.

Ann. & Mag. Nat. Hist. June 1856. Descript. eight new spec. South - Amer. B. no. 1. —

Caracas — ♂ — 1 St.

Gen. LEPTOXYURA Rchb. 1853. — Spitzschwänzchen.

106. 1. L. cinnamomea Rchb.

Handb. I. p. 170. 382. t. 523. 3617. — *Certhia cinnamomea* Gm. S. N. p. 480. 47. — Vieill. Gal. II. p. 283. t. 173. — *Sylvia russeola* Id. N. D. II. p. 217. — Id. Enc. p. 463. — *Synallaxis ruficauda* Id. N. D. XXXII. p. 310. — Id. Enc. p. 623. — Spix Av. Bras. I. p. 84 t. 85. 2. — *Sphenura mentalis* Licht. Doubl. p. 42. 461. — *Opetiorhynchus inundatus* Temm. — *Synallaxis caudacutus* Wied Beitr. III. p. 692. — *Synallaxis ruficauda* ♀ *cinnamomea* Gray Gen. B. I. p. 135-136. — *Leptoxyura ruficauda* Rchb. Handb. I. p. 170. 380. t. 510. 3605. — *Synallaxis mentalis* Burm. Th. Bras. III. p. 41. — *Synallaxis cinnamomea* Id. l. l. p. 42. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PHACELLODOMUS Rchb. 1853. — Bündelnister.

Synallaxis Sws. 1837 (nec Vieill. 1818). ? *Malacurus* Rchb. 1850.

107. 1. P. frontalis Nob.

Sphenura frontalis Licht. Doubl. p. 42. 460. — *Anabates rufifrons* Spix Av. Bras. I. p. 84. t. 85. 1. — Wied Beitr. III. p. 1191. — *Malurus garrulus* Sws. Z. Ill. t. 138. — *Anumbius rufifrons* Orb. & Lafr. Syn. no. 4. — *Anumbius frontalis* Orb. Voy. p. 256. 134. — Burm. Th. Bras. III. p. 36. — *Synallaxis rufifrons* Gray Gen. B. I. p. 136. — *Phacellodomus rufifrons* Rchb. Handb. I. p. 169. 379. t. 520. 3611-12. —

Bahia — ♂ — 1 St.

Gen. SPHENOPYGA *) Cab. 1847. — Anumbi.

Anumbius (!) Orb. & Lafr. 1838.

*) Hierher gehört noch als zweite Art:

2. *S. rufigularis.* — *Synallaxis rufogularis* Gould Voy. Beagl. p. 77. t. 23. — *Synallaxis rufigularis* Bp. Consp. I. p. 213. — *Anumbius rufigularis* Rchb. Handb. I. p. 162. 360. t. 521. 3608. —

108. 1. S. Anumbi Cab.

Orn. Not. p. 338. — *Anumbi* Azar. Apunt. no. 122. — *Furnarius Anumbi* Vieill. N. D. XII. p. 117. — Id. Enc. p. 514.— *Anthus acuticaudatus* Less. Trait. p. 424. — *Anumbius anthoides* Orb. Voy. p. 252. 130. — *Synallaxis maior* Gould Voy. Beagl. p. 76. t. 22. — *Anumbius acuticaudatus* Gray List Gen. B. p. 23. — Rchb. Handb. I. p. 162. 359. t. 521. 3307. — *Anabates puncticollis* „Licht."*) Bp. Consp. I. p. 210. — Rchb. Handb. I. p. 175. 400. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PHILYDOR **) Spix 1824. — Fluss-Baumsteiger.

Dendroma (!) Sws. 1836.

109. 1. P. superciliaris ***) Spix

Av. Bras. I. p. 73. t. 73. 1. — Rchb. Handb. I. p. 199. 484. t. 542. 3704-5. — *Sphenura superciliaris* Licht. Doubl. p. 41. 459. — *Anabates atricapillus* Wied Beitr. III. p. 1187.— *Xenops Cannivetii* Less. Cent. Z. t. 16. — *Xenops melanocephalus* Id. Trait. p. 318. — *Anabates superciliaris* Burm. Th. Bras. III. p. 28. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

110. 2. P. Lichtensteini ****) nov. sp.

Sphenura poliocephala jun. Licht. Doubl. p. 41. 458. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

111. 3. P. rufus Nob.

Dendrocopus rufus Vieill. N. D. XXVI. p. 119. — Lafr.

---

*) Unter diesem lichtensteinischen Namen stand der *Anumbi* ursprünglich im berliner Museum, und scheint Natterer denselben von dort in das wiener übertragen zu haben.

**) Dahin gehören noch:

4. *P. columbianus* nov. sp. — die nördliche, grössere Form des *P. rufus*, von dem sie sich indessen durch beträchtlich stärkere Schnabel- und Fuss-Bildung leicht unterscheidet. Ausserdem ist sie bedeutend dunkler gefärbt, Kehle und Augenstreifen sind weit stärker rostgelb angeflogen, das Grau des Oberkopfes erstreckt sich nicht so weit den Rücken hinab, wie bei *P. rufus*, und die Stirn ist nur ganz schwach rostgelblich angehaucht. — G. L. 7" 4"', Fl. 3" 5"', Schwz. 3", Schnabelf. 8"', Lf. 10"', Mittelz. o. K. 6"'. — Ein Exemplar im berliner Museum aus Porto Cabello;

5. *P. pyrrhodes* Rchb. Handb. I. p. 200. 459. — *Anabates pyrrhodes* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 689. 113. —

***) Die von Wied, Reichenbach und Burmeister für *P. superciliaris* gehaltene *Sylvia rubricata* Ill. bezeichnet im berliner Museum nicht diesen Vogel, sondern ist identisch mit *Synallaxis rutilans* Temm. Pl. col. 227. 1. —

****) Die von Lichtenstein als jüngere Vögel angesehenen Exemplare sind specifisch verschieden. In der Gestalt und namentlich in der Schnabelbildung gleichen sie dem *P. superciliaris*, in der Färbung völlig dem *P. rufus*, von welchem sie sich indessen schon genügend durch die nicht gelbliche, sondern, wie der ganze übrige Oberkopf, olivengrauliche Stirn unterscheiden. Im Ganzen sind sie kleiner, die Schnabelspitze ist vorn nicht hakig, sondern nur gekrümmt, die Unterkieferspitze merklich aufsteigend, die Schwingen lebhaft hellbraun, nicht rostroth. —

Essai Monogr. Dendrocolapt. p. 30. 17. — *Sphenura poliocephala adult.* Licht. Doubl. p. 41. 358. — *Philydor ruficollis* Spix Av. Bras. I. p. 74. t. 75. — *Dendroma caniceps* Sws. B. Braz. t. 80. — Id. Class. p. 316. — *Xenops rufifrons* „Valenc." Less. Trait. p. 317. — *Dendroma poliocephalum* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 27. — *Anabates poliocephalus* Rchb. Handb. I. p. 199. 485. t. 542. 3703. — Burm. Th. Bras. III. p. 29. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. THRIPOPHAGA Cab 1847. — Deckelnasen-Baumsteiger.

112. 1. T. striolata Cab.

Orn. Not. p. 338. — Rchb. Handb. I. p. 209. 509. t. 540. 3693-94. — Burm. Th. Bras. III. p. 35. — *Sphenura striolata* Licht. Doubl. p. 42. 465. — *Anabates striatus* Spix Av. Bras. I. p. 83. — *Anabates striolatus* Id. l. l. t. 83. 2. — Temm. Pl. col. 238. 1. — Wied Beitr. III. p. 1182. — *Anabates macrourus* Id. Reise Bras. II. p. 147. — *Xenops striolatus* Less. Trait. p. 318. — *Xenops ruficollaris* Id. Cent. Z. t. 36. — *Anabates striatus* & *striolatus* Gray Gen. B. I. p. 138. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. OTIPNE *) Nob. — Ohren-Baumsteiger.

Pseudocolaptes (!) & *Philydor* Rchb. 1853.

113. 1. O. Boissoneaui **) Nob.

Anabates Boissonneautii Lafr. R. Z. 1840. p. 104. — Scl. B. Bogot. p. 13 — *Anabates auritus* „Licht." Tsch. Consp. p. 34. 192. — Id. Faun. Per. p. 239. — *Anabates Boissoneautii* & *auritus* Gray Gen. B. I. p. 138. — *Thripophaga aurita* Cab. Orn. Not. p. 338. — *Philydor Boissonneautii* Rchb. Handb. I. p. 209. 486. — *Pseudocolaptes semicinnamomeus* Id. l. l. p. 210. 511. t. 534. 3668. — *Pseudocolaptes auritus* Id. l. l. p. 210. 512. —

Caracas — ♂, ♀ — 2 St.

---

*) Von οὖς (Ohr) und ὑπνη (Baumhacker). —

**) Das im berliner Museum befindliche Originalexemplar des lichtensteinischen *A. auritus* beweist die Identität desselben mit Lafresnaye's *A. Boissoneautii;* bei unseren Exemplaren aus Caracas hingegen hat die nicht schwarze, sondern nur wenig dunkler als der Rücken gefärbte Haube helle, rosröthliche Schaftstriche. Ob diess indessen auf einen specifischen Unterschied hindeutet, oder nur im Jugendzustande stattfindet, vermögen wir bei dem Mangel mehrerer Exemplare nicht zu entscheiden. Besonders auffällig ist dabei der grosse, vielleicht sexuelle Unterschied in der Schnabellänge, welcher, freilich nur entfernt, an *Heteralocha* Cab. (*Neomorpha* Gould nec Glog.) erinnert. —

Gen. HOMORUS Rchb. 1853. — Hauben-Baumsteiger.

114. 1. H cristatus Rchb.

Handb. I. p. 173. 389. t. 525. 3629. — *Anabates cristatus* Spix Av. Bras. I. p. 83. t. 84. — Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 5. — Orb. Voy. p. 258. 137. — Burm. Th. Bras. III. p. 26. — *Xenops cristatus* Less. Trait. p. 317. — *Anabates unirufus* Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 7. — Orb. Voy. p. 259. 138 & 370. 309. t. 55. 1. — *Anabates cristatus* & *unirufus* Gray Gen. B. I. p. 138. — *Homorus unirufus* Rchb. Handb. I. p. 173. 390. —

Bolivien — ♂; Brasilien — ♂ — 2 St.

Gen. OXYRHYNCHUS Temm. 1820. — Flammenköpfchen.

Oxyruncus (!) Temm. *Oxyrhamphus* *) Strickl. 1841.

115. 1. O. flammiceps Temm.

Pl. col. 125. — Rchb. Handb. I. p. 433. 1021. t. 618. 4122-23. — Burm. Th. Bras. III. p. 33. — *Oxyrhynchus cristatus* Sws. Z. Ill. t. 49. — *Oxyrhynchus striatus* Mikan Del. Flor. & Faun. Bras. fig. — *Oxyrhamphus flammiceps* Gray List. Gen. B. p. 23. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. IPOBORUS **) Nob. — Baumsteiger.

Automolus Rchb. 1853 (nec *Automolis* Hübn. 1816).

116. 1. I. sulphurascens Nob.

Sphenura sulphurascens Licht. Doubl. p. 41. 458. — *Philydor albogularis* Spix Av. Bras. I. p. 74. t. 74. 1. — *Anabates leucophthalmus* Wied Beitr. III. p. 1170. — *Xenops gularis* „Valenc." Less. Trait. p. 317. — *Phylidor atrogularis* (!) Id. l. l. p. 317. — *Automolus sulphurascens* Rchb. Handb. I. p. 174. 392. t. 526. 3633. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

117. 2. I. montanus Nob.

Anabates montanus Tschud. Consp. p. 35. 193. — Id. Faun. Per. p. 240. t. 20. 1. — Rchb. Handb. I. p. 175. 398. t. 527. 3636. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

118. 3. I. ferruginolentus Nob.

Anabates ferruginolentus Wied Beitr. III. p. 1166. — *Ana-*

*) Strickland verwirft Temminck's Namen, weil derselbe bereits mehr als 200 Jahre früher von Gessner (1604) vergeben sei; wir halten es jedoch nicht für rathsam, über Linné's 12te Ausgabe hinaus zurück zu gehen. —

**) Von ἴψ (Holzwurm) und βιβρώσκω (fressen). —

bates leucophrys Jard. & Selby Ill. Orn. t. 93. — *Anabates ferruginolentus* ♀ *leucophrys* Gray Gen. B. I. p. 138. — Bp. Consp. I. p. 211. — *Cichlocolaptes ferruginolentus* Rchb. Handb. I. p. 174. 393. t. 527. 3637. — *Furnarius leucophrys* Id. l. l. p. 205. 490. t. 542. 3706. — *Anabatoides ferruginolentus* Burm. Th. Bras. III. p. 25. — *Sphenura dendrocolaptes* ♀ *maculata* Licht. in Mus Berol. —

Bahia — ♂ — 1 St.

Gen. XENICOPSIS *) Nob. — Meissel-Baumsteiger.

Anabasitta (!) Lafr. 1838. *Anabazenops* (!) Lafr. 1841. *Anabatoides* (!) Des Murs 1853. *Anabazenops* (!), *Cichlocolaptes* (!) & *Syndactyla* Rchb. 1853.

119. 1. X. rufosuperciliata Nob.

Xenops rufosuperciliatus Lafr. Mag. Z. 1832. t. 7. — *Anabazenops rufosupereiliatus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 27. — *Leptoxyura seu Syndactyla rufosuperciliata* Rchb. Handb. I. p. 171. 384. t. 528. 3614. — *Cichlocolaptes ochroblepharus* Id. l. l. p. 174. 3904. t. 527. 3638. — *Anabates adspersus* Licht. in Mus. Berol. — *Cichlocolaptes adspersus* Rchb. Handb. I. p. 174. 395. — *Anabatoides adspersus* Burm. Th. Bras. III. p. 24. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

120. 2. X. fusca Nob.

Sitta fusca Vieill. Anal. p. 68. — *Sphenura albicollis* Licht. Doubl. p. 41. 456. — *Xenops anabatoides* Temm. Pl. col. 150. 2. — *Xenops fuscus* Lafr. Mag. Z. 1832. t. 7. — *Anabazenops fuscus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 27. — Rchb. Handb. I. p. 198. 482. t. 541. 3701. & t. 545. 3716. — *Anabatoides fuscus* Burm. Th. Bras. III. p. 24. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. XENOPS Ill. 1811. — Steigschnabel.

Neops Vieill. 1816.

121. 1. X. rutilus Licht.

Doubl. p. 17. 158. — *Xenops rutilans* Temm. Pl. col. 72. 2. — Rchb. Handb. I. p. 198. 480. t. 541. 3699-3700. — *Xenops genibarbis* Sws. (nec Ill.) Z. Ill. t. 100. — *Zenops affinis* Id. Two Cent. 352. 210. —

Brasilien — ♀ — 1 St.

---

*) *Ξενικόψις* (= *ξένωψ*) von *ξενικός* (fremdartig) und *ὄψις* (Aussehen). — Es gehören zu dieser Gattung die Arten mit, wie bei *Xenops*, stark aufsteigendem Unterschnabel, welche gleichsam nur eine grössere Wiederholung der eigentlichen kleinen Steigschnäbel sind. —

122. 2. X. heterurus *) nov. sp.

Xenops rutilans Scl. (nec Temm.) P. Z. 1856. p. 27. 7. — Similis praecedenti, sed supra minus rufescens, pileo tenuissime fusco-striato, subtus olivaceus, pectore epigastrioque angustius, hypochondriis ventreque obsoletius striatis; rectricibus omnibus duabus mediis exceptis, plus minusve nigris. — Long. tot. 5″, al. 2″ 9‴, caud. 2″ 1‴, rostr. culm. 5½‴. tars. 6‴. —

Columbien — ♂ — 1 St.

123. 3. X. genibarbis „Hoffm.“

Ill. Prodrom. p. 213. — Rchb. Handb. I. p. 197. 479. t. 541. 3697-98. — *Neops ruficaudus* Vieill. Anal. p. 68. — Id. N. D. XXXI. p. 338. — Id. Enc. p. 915. — Id. Gal. Ois. II. p. 279. t. 170. — *Xenops Hoffmanseggii* Cuv. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Subfam. DENDROCOLAPTINÆ Baumhacker.

Gen. SITTOSOMUS Sws. 1827. — Kletter-Rothschwanz.

Sittasomus (!) Sws. 1827.

124. 1. S. erithacus Lafr.

Mon. Dendr. p. 59. 1. — *Dendrocolaptes erithacus* Licht. Abh. Berl. Acad. 1820. Gatt. Dendr. p. 259 & 266. t. 1. 1-2. — *Dendrocolaptes sylviellus* Temm. Pl. col. 72. 1. — *Sittasomus sylviellus* Sws. Class. B. II. p. 314. — *Sittasomus Temmincki* Less. Trait. p. 314. — *Sittasomus erythacus* Gray Gen. B. I. p. 142. — Rchb. Handb. I. p. 176 405. t. 528. 3639 & t. 602. 4056. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

125. 2. S. pectinicaudus „Cab.“

Rchb. Handb. I. p. 177. — *Sittasomus sylvioides* (!) Lafr. R. & Mag. Z. 1849. p. 331. — Id. Mon. Dendr. p. 60. 2. — Rchb. Handb. I. p. 177. 407. — *Sittasomus olivaceus* Id. (nec Wied **) l. l. p. 176. 406. t. 602. 4057. —

Mexico — ♂ — 1 St.

---

*) Diese Art unterscheidet sich von *X. rutilus* sofort durch die eigenthümliche Schwanzzeichnung. Bei *X. rutilus* ist nur die vierte Feder an der Innenfahne schwarz; *X. heterurus* dagegen zeigt nur die innerste einfarbig rostroth, die erste ist am Grunde der Innenfahne, die zweite nicht ganz bis zur Hälfte, die dritte ganz an derselben, die vierte an beiden Fahnen fast ganz schwarz, nur rostroth gerandet, bei der fünften nimmt die schwarze Färbung wieder ab und zeigt an beiden Fahnen nur einen schwärzlichen Längsfleck. —

**) Die Identität unseres Vogels mit *S. sylvioides* ist zweifellos, dagegen wird der von Reichenbach mit demselben vereinigte *S. olivaceus* Wied (Beitr. III. p. 1146.)

Gen. MARGARORNIS Rchb. 1853. — Perlbrüstchen.

126. 1. M. squamigera Rchb.

Handb. I. p. 179. 414. t. 529. 3646. — Scl. B. Bogot. p. 14. 121. — *Anabates squamiger* Orb. & Lafr. Syn. p. 14. 1. — Orb. Voy. p. 369. 308. t. 54. 2. — *Sittasomus perlatus* Less. Ech. Mond. sav. 1844. p. 275. — *Anabasitta squamigera* Lafr. R. & Mag. Z. 1853. p. 592. — *Margarornis perlatus* Rchb. Handb. I. p. 179. 413. t. 529. 3647. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. PYGARRHICHUS „Licht." Burm. 1837. — Kletterschwanz.

Dendrodramus (!) Gould 1839. *Dromodendron* Gray 1842.

127. 1. P. albigularis Nob.

Dendrocolaptes albigularis King P. Z. S. 1830. p. 30. — *Dendrodramus leucosternus* Gould Voy. Beagl. p. 82. t. 27. — *Dromodendron leucosternus* Gray List. Gen. B. III. App. p. 6. — *Picolaptes albogularis* Gray Gen. B. I. p. 140. — *Pygarrhichus leucosternus* Cab. Orn. Not. p. 232. — Rchb. Handb. I. p. 178. 412. t. 528. 3643. — *Pygarrhichus sittellus* Licht. in Mus. Berol. —

Araucana — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. DENDROCINCLA Gray 1840. — Kletterdrossel.

Dryocopus Wied 1831 (nec Boie 1826).

128. 1. D. turdina Gray

List. Gen. B. p. 23. — Rchb. Handb. I. p. 191. 459. t. 535. 3671. — *Dendrocolaptes turdinus* Licht. Gatt. Dendr. p. 201. t. 2. 1. — Id. Doubl. p. 16. 150. — *Dryocopus turdinus* Wied Beitr. III. p. 1112. — *Dendrocops turdinus* Lafr. Mon. Dendr. p. 81. 7. — *Dendrocincla turdinea* Burm. Th. Bras. III. p. 8. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

129. 2. D. merulina *) Nob.

Dendrocops meruloides (!) Lafr. Mon. Dendr. p. 84. 11. — *Dendrocincla meruloides* (!) Rchb. Handb. I. p. 191. 462. —

Caracas — ♀ — 1 St.

---

sicherlich nicht dazu gehören. Ebenso gewiss ist aber derselbe nicht *S. erithacus*, da die doch sonst so sehr genaue Beschreibungsweise des Prinzen vermuthen lässt, dass der von ihm beobachtete Vogel eine selbstständige Art sei, welche vielleicht dem *S. amazonus* Lafr. (Mon. Dendr. p. 60. 3.) am nächsten stehen würde. —

*) Am nächsten mit *D. turdina* verwandt, unterscheidet sich dieser Vogel durch die lebhaftere zimmetbraune Färbung des Schwanzes und der Flügel, wodurch die

Gen. DENDREXETASTES Eyt. 1851. — Borkenspäher.

Cladoscopus Rchb. 1853.

130. 1. D. Temmincki Scl

P. Z. S. 24 Apr. 1855. — Id. B. Bogot. p. 14. 124. — *Dendrocolaptes Temminckii* Lafr. Mon. Dendr. p. 68. t. 4. — *Cladoscopus Temminckii* Rchb. Handb. I. p. 192. 465. t. 536. 3680. — *Dendrexetastes capitoides* Eyt. Contr. Orn. 1851. p. 76. — Lafr. Mon. Dendr. p. 86. — Rchb. Handb. I. p. 195. 476. —

Cayenne — ♂ — 1 St.

Gen. DENDROCOLAPTES *) Herm. 1804. — Baumhacker.

Dendrocopus Vieill. 1816. *Dendrocops* Sws. 1837. *Orthocolaptes* Less. 1840. *Premnocopus* Cab. 1847.

131. 1. D. picumnus **) Licht.

Gatt. Dendr. p. 202. 8. — *Dendrocolaptes cayennensis* Id. (nec Gm.) l. l. p. 264. 4. — *Dendrocolaptes platyrostris* (!) Spix Av. Bras. I. p. 87. t. 89. — Less. Trait. p. 312. — *Dendrocops platyrostris* (!) Sws. Class. B. II. p. 314. — Lafr. Mon. Dendr. p. 78. 5. — *Dendrocolaptes melanoceps* (!) Less. R. Z. 1840. p. 261. — *Dendrocops platyrostris* ♀ *melanoceps* Bp. Consp. I. p. 207. — *Dendrocolaptes platyrhynchus* Rchb. Handb. I. p. 194. 473. t. 536. 3676-77. — *Dendrocopus platyrhynchus* Burm. Th. Bras. III. p. 9. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. XIPHOCOLAPTES Less. 1840. — Riesen-Baumhacker.

Dendrocopus Rchb. 1853 (nec Vieill. 1815).

---

langen schwarzen Spitzen der Handschwingen mehr hervortreten. Die Unterseite ist gleichfalls stärker roströthlich angeflogen, die Kehle etwas dunkler, und die bei *D. turdina* noch sichtbaren verloschenen Schaftstriche fehlen gänzlich. Da Lafresnaye die *D. turdina* nicht selbst gesehen hat, so ist es nicht zu verwundern, dass er seine *D. meruloides* mit der entfernter stehenden *D. merula* Licht. vergleicht. —

*) Hierher gehören noch:

2. *D. cayennensis* Licht. Gatt. Dendr. p. 201. 3. (nec ibid. p. 264. 4). — *Gracula cayennensis* Gm. — *Dendrocolaptes maior* Herm. — *Dendrocolaptes communis* Less. Trait. p. 312;
3. *D. undulatus*. — *Premnocopus undulatus* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 689. —

**) Lichtenstein hat, wie die Exemplare im berliner Museum zeigen, den ächten *D. cayennensis* gar nicht gekannt und desshalb seinen *D. picumnus*, welchen Spix später unter dem Namen *D. platyrostris* (!) als neu beschrieben hat, wieder mit *D. cayennensis* zusammengezogen. Dem brasilianischen Vogel gebührt daher die älteste lichtensteinische Benennung. —

132. 1. X. albicollis Scl.

Ibis 1859. p. 118. — *Dendrocopus albicollis* Vieill. N. D. XXVI. p. 117. — Id. Enc. p. 625. — Rchb. Handb. I. p. 189. 454. t. 539. 3692. — *Dendrocolaptes decumanus* „Ill." Licht. Gatt. Dendr. p. 256. t. 1. 1. — Id. Doubl. p. 16. 147. — *Dendrocolaptes guttatus* Wied (nec Licht.) Beitr. III. p. 1120. — *Dendrocolaptes albicollis* Gray Gen. B. I. p. 140. — Lafr. Mon. Dendr. p. 4. 1. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

133. 2. X. emigrans Scl.

Ibis 1859. p. 118. 127. —, *Xiphocolaptes albicollis* Id. (nec Vieill.) P. Z. S. 1857. p. 202. —

Guatimala — ♀ — 1 St.

134. 3. X. procerus *) nov. sp.

Similis insequenti sed maior, pallidior, rostro longiore, pallide corneo, gula albo-flavescente, immaculata subtus striis punctisque obsoletioribus. — Long. tot. 1″ 6‴, al. 5″ 11‴, tars. 1″, caud. 5″. —

Caracas — 2 ♂, ♀ — 3 St.

135. 4. X. promeroporhynchus Nob.

Dendrocolaptes lineatocephalus (!) Gray Gen. B. I. p. 140. t. 43. — *Picolaptes promeropirhynchus* Id. l. l. p. 140. — *Dendrocops lineatocephalus* Bp. Consp. I. p. 207. — *Dendrocolaptes promeropirhynchus* Less. R. Z. 1840. p. 270. 14. — Lafr. Mon. Dendr. p. 5. 2. — Scl. B. Bogot. p. 14. 122. — *Dendrocopus promeropirhynchus* Rchb. Handb. I. p. 190. 457. t. 536. 3678. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. DENDRORNIS Eyton. 1852. — Stammhacker.

Premnocopus Rchb. 1853 (nec Cab. 1847).

136. 1. D. guttata Scl.

P. Z. S. 9 May 1854. no. 20. — *Dendrocolaptes guttatus* Licht. Gatt. Dendr. p. 201. — *Dendrocops guttatus* Bp. Consp. I. p. 207. — *Nasica guttatus* Lafr. Mon. Dendr. p. 46. 3. — *Premnocopus guttatus* Rchb. Hdb. I. p. 186. 443. t. 537. 3683. —

Bahia — ♂, ♀ — 2 St.

*) Die Exemplare aus Caracas stehen gleichsam in der Mitte zwischen *X. emigrans* und *X. promeroporhynchus*. Der Kopf ist heller olivenbraun, Flügel und Schwanz sind heller zimmtbraun als bei *X. promeroporhynchus*, während bei *X. emigrans* das kleine Gefieder noch mehr olivenfarbig und die Zeichnung des Bauches fast ganz verloschen ist. Ob *X. lineatocephalus* Gray zu dieser oder der folgenden Art gehört, ist nach der Abbildung allein ohne Beschreibung und Angabe des Vaterlandes kaum mit Sicherheit festzustellen. —

137. 2. D. eburneirostris Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 11. — *Ziphorhynchus flavigaster* (!) Sws. Syn. B. Mex. p. 440. 86. — *Dryocopus eburneirostris* Less. Ech. Mond. sav. 1843. — Desmurs Iconogr. Orn. t. 52. — *Dryocopus flavigaster* Id. I. l. livr. 9. 5. — *Xiphorhynchus flavigaster* Bp. Consp. I. p. 208. — *Nasica flavigaster* Lafr. Mon. Dendr. p. 44. 2. — *Premnocopus eburneirostris* Rchb. Handb. I. p. 186. 444. t. 603. 4059. — *Dendrocolaptes poecilonotus* Wagl. in Mus. Berol. —

Mexico — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. DENDROPLEX Sws. 1827. — Specht-Baumhacker.

Dendrocopus Sundev. 1836 (nec Vieill. 1816).

138. 1. D. picus Gray

List Gen. B. p. 23. — Rchb. Handb. I. p. 180. 415. t. 529. 3648. — *Oriolus picus* Gm. S. N. p. 384. 22. — *Dendrocolaptes minor* Herm. Obs. Z. p. 135. — *Oriolus picoides* Shaw. — *Dendrocolaptes chrysolopus* (!?) „Ill." Licht. Gatt. Dendr. p. 203 (juv.). — *Dendrocolaptes picus* Id. I. l. p. 203 & 209. — *Dendrocopus rectirostris* Vieill. N. D. XXVI. p. 129. — Id. Enc. p 626. — *Dendroplex chrysolopus* Sws. — *Dendrocolaptes guttatus* Less. Trait. p. 313. —

Brasilien — 3 ♂, ♀; Guiana — ♂ — 5 St.

Gen. THRIPOBROTUS *) Cab. 1847. — Baumpicker.

Picolaptes (!) Less. 1831. *Picolaptes* & *Lepidocolaptes* Rchb. 1853. *Picolaptes, Lepidocolaptes* & *Dacryophorus* Bp. 1854.

139. 1. T. squamatus Nob.

Dendrocolaptes squamatus Licht. Gatt. Dendr. p. 258. t. 2. l. — Id. Doubl. p. 17. 152. — *Dendrocolaptes Wagleri* **) Spix Av. Bras. I. p. 88. t. 90. 2. — *Xiphorhynchus maculirenter* Less. Suppl. Buff. 1847. p. 283. — *Picolaptes squamatus* & *Wagleri* Gray Gen. B. I. p. 140. — *Picolaptes squamatus* Lafr. Mon. Dendr. p. 17. 1. — *Picolaptes Wagleri* Id. I. l. p. 70. — *Lepidocolaptes squamatus* Rchb. Hdb. I.

---

*) Hierher gehören noch:

9. *T. bivittatus* Cab. — *Dendrocolaptes bivittatus* Licht.;
10. *T. leucogaster.* — *Ziphorhynchus leucogaster* Sws.;
11. *T. Souleyeti.* — *Dendrocolaptes Souleyeti* Lafr.;
12. *T. albolineatus.* — *Picolaptes albolineatus* Lafr. —

**) Im berliner Museum ist von Wagler's eigener Hand am Original des *D. squamatus* Licht. als Synonym *D. Wagleri* Spix hinzugeschrieben. —

p. 184. 432. t. 533. 3652. — *Lepidocolaptes Wagleri* Id. l. l. p. 184. 433. t. 533. 3663. —
Brasilien — ♂ ad., ♀ jun. — 2 St.

140. 2. T. falcinellus *) Nob.

Picolaptes squamatus Lafr. (nec Licht.) Mon. Dendr. p. 71. 12. — *Dendrocolaptes falcinellus* Licht. in Mus. Berol. —
Montevideo — ♂; Buneos Ayres — ♀ — 2 St.

141. 3. T. lacrymiger Nob.

Dendrocolaptes lacrymiger „Lafr.“ Des Murs Iconogr. livr. 12. 5. t. 71. — *Picolaptes lacrymiger* Lafr. Mon. Dendr. p. 22. 6. — Rchb. Handb. I. p. 182. 424. — *Dacryophorus lacrymiger* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 11. — Long. caud. 3″ 6‴, al. 4″. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

142. 4. T. Lafresnayi nov. sp.

Similis praecedenti, sed rostro graciliore; alis brevioribus, cauda longiore, supra subtusque pallidior, gula albidiore, lacrymis obsoleti ribus. — Long. caud. 3″ 9‴, a. 3″ 7‴.—
Caracas — ♂ — 1 St.

143. 5. T. affinis Nob.

Dendrocolaptes affinis Lafr. R. Z. 1839. p. 100. — *Picolaptes affinis* Gray Gen. B. I. p. 140. — Lafr. Mon. Dendr. p. 25. 7. — Scl. Ibis 1859. p. 117. 124. — *Picolaptes angustirostris* Bp. — *Lepidocolaptes affinis* Rchb. Handb. I. p. 184. 435. t. 6 3. 4 58. — *Dacryophorus affinis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 11. —
Xalapa — ♂, ♀ — 2 St.

144. 6. T. tenuirostris Nob.

Dendrocolaptes tenuirostris Licht. Catt. Dendr. p. 2025. — Id. Doubl. p. 153. — *Dendrocolaptes fuscus* Vieill. N. D. XXVI. p. 117. — Id. Enc. p. 624. — *Dendrocolaptes gracilirostris* Steph. — *Picolaptes guttata* Less. Cent. Z. p. 93. t. 32. — *Picolaptes Spixii* Id. Trait. p. 314. — *Picolaptes tenuirostris* Gray Gen. B. I. p. 140. — Lafr. Mon. Dendr. p. 19. 3. — Rchb. Handb. I. p. 181. 422. t. 531. 3654. — *Lepidocolaptes Spixii* Id. l. l. p. 185. 437. t. 533. 3664. —
Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

---

*) Südlicher Repräsentant des *T. squamatus*, für den ihn Lafresnaye a. a. O. irrthümlich gehalten hat. Die dunklere Grundfarbe des Kopfes, dessen helle Fleckenzeichnung lebhafter hervortritt und sich weiter über den Rücken herab erstreckt, sowie die dunkelzimmtrothe Färbung des Bürzels und Schwanzes macht ihn von *T. squamatus* leicht unterscheidbar. —

145. 7. T. lineaticeps *) Nob.

Picolaptes lineaticeps Lafr. Mon. Dendr. p. 21. 9. — *Lepidocolaptes lineaticeps* Rchb. Handb. I. p. 185. 440. —

Venezuela — ♂ jun. — 1 St.

146. 8. T. Warscewiczi **) nov. sp.

Similis *T. albolineato*, sed multo maior, alis caudaque longissimis, capite dorso vix concolore, maculis pallidis striaeformibus usque ad nucham notato; subtus pictura *T. albolineati*. — Long. tot. 7″ 6‴, caud. 4″, al. 4″ 5‴, rostr. culm. 1″ 1‴, tars. 9‴. —

Peru — ♀ — 1 St.

Gen. XIPHORHYNCHUS Sws. 1827. — Sichel-Baumhacker.

Dendrocopus Less. 1831 (nec Vieill. 1816). *Ziphorhynchus* (!) Sws. 1837.

147. 1. X. trochilirostris Gray

Gen. B. I. p. 149. — *Dendrocolaptes trochilirostris* Licht. Catt. Dendr. p. 207. t. 3. — *Xiphorhynchus trochilirostris* Wied Beitr. III. p. 1140. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 690. — Rchb. Handb. I. p. 183. 431. t. 532. 3660 61. — *Xiphorhynchus procurvus* Lafr. (nec Temm.) Mon. Dendr. p. 36. 2. — *Xiphorhynchus Wiedi* „Behn.“ Hartl. —

Brasilien — ♂; Venezuela — ♀ — 2 St.

148. 2. X. procurvus Sws.

Class. B. II. p. 314. — Rchb. Handb. I. p. 182. 426. t. 604. 4061. — *Dendrocolaptes procurvus****) Temm. Pl. col. 28. — *Dendrocopus falcularius* Vieill. Enc. p. 626. — Id. Gal. II. p. 286. t. 175. — Less. Trait. p. 313. — *Xiphorhynchus trochilirostris* Lafr. (nec Licht.) Mon. Dendr. p. 35. 1. — Burm. Th. Bras. III. p. 16. — *Xiphorhynchus falcularius* Id. l. l. p. 182. 427. —

Brasilien — 2 ♂ — 2 St.

*) Dieses anscheinend jüngere Exemplar passt sonst vortrefflich auf Lafresnaye's Beschreibung a. a. O., nur fehlt demselben die dort besonders hervorgehobene „large bande sourcilière et postoculaire près blanche.“ —

**) Diese dem *P. albolineatus* Lafr. sehr ähnliche Art nähert sich in den Grössenverhältnissen am meisten dem *T. lacrymiger;* der Schnabel jedoch ist heller, die Kopfzeichnung länglicher, mehr gestrichelt, die weissen Kehlflecken sind scharf zugespitzt, an der Brust und der übrigen Unterseite im ganzen Verlaufe fast gleich breit und nur seitwärts (nicht an der Spitze) schwarz gerandet. Der Vogel wurde von dem Reisenden Warscewicz in Peru aufgefunden. —

***) Es ist zu verwundern, dass Lafresnaye Temminck's gute Abbildung nicht richtig gedeutet hat, wozu ihn die mangelhafte Abbildung und Beschreibung von Lichtenstein's *D. trochilirostris* verleitet zu haben scheint. Die Vergleichung der lichtensteinischen Original-Exemplare hat gezeigt, dass derselbe die kleinere rothschnäblige Art vor sich hatte. —

Fam. TYRANNIDÆ. Fliegenstecher.

Subfam. FLUVICOLINÆ. Fliegenstelzen.

Gen. FLUVICOLA Sws. 1827. — Fliegenstelze.

Entomophagus Wied 1827. *Myiophila* *) Rchb. 1850.

149. 1. F. climacura Gray

Gen. B. I. p. 242. 1. — *Muscicapa clymazura* (!) Vieill. — *Muscicapa nengeta* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 56. 576. — *Muscicapa mystax* Spix Av. Bras. II. t. 31a. t-2. — *Muscicapa mystacea* Id. I. I. p. 22. — *Fluvicola cursoria* Sws. Z. Ill. t. 47. — *Entomophagus mystaceus* Wied Beitr. III. p. 782. — *Oenanthe clymazura* Vieill. Gal. Ois. II. p. 255. t. 157. — *Platyrhynchus pseudogillia* Less. R. Z. 1839. p. 101. — *Fluvicola clymazura* Gray List. Gen. B. p. 40. — *Fluvicola nengeta* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 46. — *Fluvicola mystacea* Id. Th. Bras. II. p. 519. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

150. 2. F. pica **) Gray

Gen. B. I. p. 242. — Scl. B. Bogot. p. 20. 208. — *Muscicapa pica* Bodd. Tabl. pl. enl. 675. 1. & 566. 3. — *Muscicapa bicolor* Gm. S. N. p. 946. 78. — *Platyrhynchus bicolor* Vieill. N. D. XXVII. p. 13. — Id. Enc. p. 837. — *Fluvicola bicolor* Sws. Z. Ill. t. 47. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 703. 169. —

Cayenne — ♂, ♀; Guiana — ♂, ♀; Porto Cabello — 3 ♂ — 7 St.

---

*) Gray citirt zwar zu dieser reichenbach'schen Gattung (wahrscheinlich nach 'dessen Angabe) den *Todus leucocephalus* Pall. als Typus; indessen hat derselbe offenbar *Fluvicola pica* dafür angenommen, da die von ihm (im Syst. av. nat. t. 67.) gegebene Abbildung die Charaktere dieses Vogels, wie sie das Männchen in seiner verengten zweiten Schwinge zeigt, nicht angiebt. Es bleibt daher nur noch die Vermuthung übrig, dass hier vielleicht merkwürdiger Weise das Weibchen, welches die wesentlichen Gattungskennzeichen im Flügel nicht trägt, abgebildet sei, zu welcher Annahme wir uns jedoch für umsoweniger berechtigt halten, da Reichenbach ja bereits für das Männchen eine eigene neue Gattung gebildet hat. —

**) Der südliche von Azara beschriebene Vogel wird als Art abzusondern sein:

3. *F. albiventris* Scl. B. Bogot. p. 20. — *Suiriri dominico* Azar. Apunt. no. 175. — *Muscicapa albiventris* Spix Av. Bras. II. p. 21. t. 30. t. 1-2. — *Fluvicola bicolor* Orb. & Lafr. (nec Gm.) Syn. p. 58. 1. — Orb. Voy. p. 343. 264. — Burm. Th. Bras. II. p. 520. —

Gen. DIXIPHIA *) Rchb. 1850. — Schilf-Fliegenstelze.

Arundinicola (!) Orb. 1839.

151. 1. D. leucocephala Nob.

Pipra leucocephala Lin. S. N. p. 340. 8. — Vieill. Enc. p. 261. 13. — Wagl. Isis 1830. p. 942. 1. — *Todus leucocephalus* Pall. Spicil. VI. p. 19. t. 3. 2. — Gm. S. N. p. 444. 6. — Vieill. Enc. p. 268. — *Suiriri cabeza blanca* Azar. Apunt. no. 176. — *Platyrhynchus leucocephalus* Vieill. N. D. XXVII. p. 21. — Id. Enc. p. 842. — *Muscicapa dominicana* Spix Av. Bras. II. p. 21. t. 29. 2. — *Muscicapa leucocephala* Wied Beitr. III. p. 822. — *Muscicapa leucocapilla* Less. Trait. p. 385. — *Alecturus leucocephalus* Orb. & Lafr. Syn. p. 54. 3. — *Arundinicola leucocephala* Orb. Voy. p. 334. 253. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 703. 170. — Burm. Th. Bras. II. p. 512. — *Fluvicola leucocephala* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 48. — *Mionectes leucocephalus* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 148. not. 1. — *Pipra leucocilla* „Rchb." (nec Lin.) Gray Cat. Gen. & Subgen. B. p. 55. 923. —

Brasilien — ♂ — 3 St.

Gen. COPURUS **) Strickl. 1841. — Mönchs-Fliegenstelze.

152. 1. C. colonus Hartl.

Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Colon* Azar. Apunt. no. 180. — *Muscicapa colonus* Vieill. N. D. XXI. p. 448. — Id. Enc. p. 824. — *Platyrhynchus platurus* Vieill. N. D. XXVII. p. 17. — Id. Enc. p. 839. — *Muscicapa colon* Steph. — *Muscipeta leucocilla* Hahn Abbild. & Beschreib. ausl. Voeg. Lief. 9. t. 2. — *Muscicapa monacha* „Freyr." Licht. Doubl. p. 53. 550. — *Muscicapa filicauda* Spix Av. Bras. II. p. 12. t. 14. — *Muscipeta monacha* Wied Beitr. III. p. 925. — *Copurus filicauda* Strickl. Ann. N. H. 1841. p. 427. — Tsch. Consp. p. 14. 71. — Id. Faun. Per. p. 157. — Burm. Th.

---

*) Reichenbach's Abbildung seines Genus *Dixiphia* (Syst. av. nat. t. 63.), für welches Gray als Typus *Pipra leucocilla* Gm. angiebt, stellt entschieden das Männchen von *Todus leucocephalus* dar. —

**) Als vierte Art gehört hierher:

4. *C. funebris* nov. sp. — Haube und Bürzel nicht weiss, sondern wie der ganze übrige Körper einfarbig schwärzlich; die beiden mittlern Schwanzfedern nur wenig länger, als die übrigen und in ihrem ganzen Verlaufe fast gleich breit. — G. L. 5″ 9‴, Fl. 3″, Schw. 2″ 9‴, 2 mittl. Schwanzf. 3″ 7‴, Schnabelf. 4‴, Lauf 7‴, Mittelz. o. Kr. 4‴. — Aus dem südlichen Brasilien (Prov. Minas Geraës) im berliner Museum. —

Bras. II. p. 507. — *Copurus monacha* Cab. Orn. Not. p. 254. — *Copurus filicaudis* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 46. — Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

153. 2. C. poecilonotus Cab.

Schomb. Reis. Guian. III. p. 702. 168. — Guiana — ♀ — 1 St.

154. 3. C. leuconotus Lafr.

R. Z. 1842. p. 335. — Scl. B. Bogot. p. 20. 207. — Neu-Granada — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. ICTINISCUS *) Nob. — Weihen-Fliegenstelze.

Muscipipra (!) Less. 1831. *Milvulus* Rchb. 1850 & Burm. 1856 (nec Sws. 1827).

155. 1. I. vetulus Nob.

Muscicapa vetula „Olf." Licht. Doubl. p. 53. 548. — Spix Av. Bras. II. p. 15. t. 18. — *Tyrannus longipennis* Sws. Quart. Journ. XX. p. 282. — *Muscicapa pullata* Bp. Journ. Acad. Phil. p. 383. — *Milvulus longipennis* Sws. Class. B. II. p. 225. — *Muscipipra longipennis* Less. Trait. p. 387. — Id. R. Z. 1839. p. 43. — *Tyrannus vetulus* Jard. & Selb. Ill. Orn. I. t. 42. — *Milvulus vetulus* Gray Gen. B. I. p. 248. 4. — *Milvulus pullata* Id. l. l. III. App. p. 11. — *Milvulus vetula* Burm. Th. Bras. II. p. 468. — Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. CYBERNETES **) Agass. — Yiperu.

Gubernetes (!) Such. 1825. *Cybertes* (!) Gray 1855.

156. 1. C. yetapa Nob.

Yipern Azar. Apunt. no. 75. — *Muscicapa yetapa* Vieill. N. D. XXI. p. 460. — Id. Enc. p. 834. — *Tyrannus bellulus* Id. N. D. XXXV. p. 75. — Id. Enc. p. 846. — *Muscicapa yiperu* Licht. Doubl. p. 53. 547. — *Muscicapa longicauda* Spix Av. Bras. II. p. 14. t. 17. — *Gubernetes Cunninghami* Such. Z. Journ. II. t. 4. — *Gubernetes forficatus* Sws. Flycatch. p. 92. t. 5. — *Tyrannus Cunninghami* Less. Trait. p. 382. — *Gubernetes yiperu* Orb. & Lafr. Syn. p. 58. 1. —

*) Diminutivum von ἰκτίν (Weihe) = *Milvulus*. —

**) Von κυβερνάω (steuern); vom lat. *guberno* würde es *Gubernator* heissen müssen, *Gubernetes* (!) dagegen ist vorn lateinisch und hinten griechisch und desshalb wohl unstatthaft. —

Burm. Th. Bras. II. p. 509. — *Alecturus yetapa* Orb. Voy. p. 342. 263. — *Gubernetes yetapa* Gray Gen. B. I. p. 244. 1. — *Milvulus bellulus* Id. l. l. p. 248. 3. —
Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. PSALIDURA Glog. 1842. — Scheerenschwänzchen.
Yetapa (!) Less. 1831.

157. 1. P. guirayetapa Nob.

Cola rara pardo y blanca Azar. Apunt. nn. 226. — *Alecturus guirayetapa* Vieill. N. D. XII. p. 409. — Id. Enc. p. 861. — *Muscicapa psalura* Temm. Pl. col. 286 & 296. — Wied Beitr. III. p. 877. — *Muscicapa risora* Vieill. Gal. Ois. II. p. 209. t. 131. — *Yetapa psalura* Less. Trait. p. 387. — *Alecturus guirayetapa* Orb. & Lafr. Syn. p. 54. 2. — Orb. Voy. p. 342. 262. — Gould Voy. Beagl. p. 51. — *Alecturus psalurus* Burm. Th. Bras. II. p. 510. —
Montevideo — ♂ juv., ♀ ad. — 2 St.

Gen. XENURUS Boie 1826. — Hahnenschwänzchen.
Alectrurus (!) & *Gallita* (!) Vieill. 1816. *Alectorurus* (!) Glog. 1842.

158. 1. X. tricolor Nob.

Gallito Azar. Apunt. no. 225. — *Gallita tricolor* Vieill. Analys. p. 68. — *Alectrurus tricolor* Id. N. D. XII. p. 492. — Id. Enc. p. 860. — Burm. Th. Bras. II. p. 511. — *Muscicapa alector* Licht. Doubl. p. 53. 551. — Temm. Pl. col. 155. — Wied Beitr. III. p. 874. — *Alectura Azarii* Sws. Flycatch. p. 96. t. 6. — *Muscicapa alectrura* Vieill. Gal. Ois. II. p. 211. t. 132. — *Alectrurus alector* Less. Trait. p. 387. — *Alecturus tricolor* Orb. & Lafr. Syn. p. 54. 1. — Orb. Voy. p. 341. 261. — *Alectorurus gallus* Glog. Hand- & Hilfsb. Nat. Gesch. p. 325. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. HEMIPENTHICA *) Nob. — Trauer-Pepoaza.
Arundinicola **) (!) Rchb. 1850 (nec Orb. 1839).

*) Von ἡμι (halb) und πένθιχος (trauernd). —

**) Unverkennbar bildet Reichenbach als Typus seiner Gattung *Arundinicola* (auf Tab. 64 des oben erwähnten Werkes) die *Pepoaza irupero* Azara's ab; sollte er dieselbe für den *Todus leucocephalus* Pall. genommen haben? —

159. 1. H. irupero Nob.

Pepoaza irupero Azar. Apunt. no. 204. — *Tyrannus irupero* Vieill. N. D. XXXV. p. 92. — Id. Enc. p. 856. — *Muscicapa moesta* Licht. Doubl. p. 55. 557. — *Muscicapa nivea* Spix Av. Bras. II. p. 20. t. 29. 1. — *Pepoaza irupero* Orb. & Lafr. Syn. p. 62. 4. — Orb. Voy. p. 348. 271. — *Fluvicola irupero* Gray Voy. Beagl. p. 53. — *Taenioptera irupero* Hartl. Ind. Azar. p. 13. — *Taenioptera irupero & nivea* Id. Gen. B. I. p. 241. 4-5. — *Taenioptera moesta* Burm. Th. Bras. II. p. 517. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. TÆNIOPTERA Bp. 1826. — Pepoaza.

Tyrannus Vieill. 1816 (nec Cuv. 1799). *Xolmis* (!?) Boie 1826. *Nengetus* (!) Sws. 1827. *Orsipus* Nordm. 1835. *Blechropus* Sws. 1837. *Pepoaza* (!) Orb. & Lafr. 1838.

160. 1. T. velata Gray

Gen. B. I. p. 241. 8. — Burm. Th. Bras. II. p. 516. — *Muscicapa velata* Licht. Doubl. p. 54. 555. — Spix Av. Bras. II. p. 17. t. 22. — Wied Beitr. III. p. 859. — *Pepoaza velata* Orb. & Lafr. Syn. p. 62. 3. — Orb. Voy. p. 347. 270. — *Xolmis velata* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

161. 2. T. dominicana Hartl.

Ind. Azar. p. 13. — Burm. Th. Bras. II. p. 517. — *Pepoaza dominica* Azar. Apunt. no. 203. — *Tyrannus dominicanus* Vieill. N. D. XXXV. p. 92. — Id. Enc. p. 856. — *Muscicapa dominicana* Licht. Doubl. p. 54. 555. not. — *Pepoaza dominicana* Orb. & Lafr. Syn. p. 62. 2. — Orb. Voy. p. 347. 269. — *Fluvicola Azarae* Gould Voy. Beagl. p. 53. 10. —

Brasilien — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♀ juv. — 4 St.

162. 3. T. nengeta Gray

List Gen. B. p. 40. — Burm. Th. Bras. II. p. 516. — *Lanius nengeta* Lin. S. N. p. 135. 7. — Lath. Ind. Orn. I. p. 68. 7. — *Pepoaza* Azar. Apunt. no. 201. — *Tyrannus cinereus* Vieill. Analys. p. 68. — *Tyrannus pepoaza* Id. N. D. XXXV. p. 91. — Id. Enc. p. 855. — *Muscicapa polyglotta* *) Licht. Doubl. p. 54. 554. — Spix Av. Bras. II. p.

*) Lichtenstein hat bekanntlich den ächten *Lanius nengeta* Lin. auf *Muscicapa climacura* Vieill. gedeutet und desshalb der vorliegenden, für ihn neuen Art den Namen

18. t. 24. — Wied Beitr. III. p. 862. — *Tyrannus polyglottus* Cuv. — *Tyrannus nengeta* Sws. Quart. Journ. XX. p. 279. — *Muscicapa taenioptera* Bp. — *Fluvicola nengeta* Sws. Flycatch. p. 102. t. 8. — *Pepoaza polyglotta* Orb. & Lafr. Syn. p. 62. 1. — Orb. Voy. p. 346. 268. — *Xolmis nengeta* Gray Voy. Beagl. p. 54. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♂, ♀ — 3 St.

Gen. PYROPE *) nov. gen. — Feueraug-Pepoaza.

163. 1. P. Kittlitzi Nob.

Muscicapa pyrope Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 19. t. 10. — *Pepoaza pyrope* Orb. & Lafr. Syn. p. 63. 6. — Orb. Voy. p. 348. 272. — *Xolmis pyrope* Gray Voy. Beagl. p. 55. — *Taenioptera pyrope* Id. Gen. B. I. p. 241. 7. —

Araucana — ♂ jun., ♀ ad. — 2 St.

Gen. AGRIORNIS Gould 1838. — Ufer-Pepoaza.

Tamnolanius (!) Less. 1839. *Dasycephala* pt. Gray 1847.

164. 1. A. maritima Gray

Voy. Beagl. p. 57. — *Pepoaza maritima* Orb. & Lafr. Syn. p. 65. 9. — Orb. Voy. p. 352. 280. — *Agriornis leucura* Gould Voy. Beagl. t. 13. — *Dasycephala maritima* Gray Gen. B. I. p. 208. 9. —

Patagonien — ♂ — 1 St.

Gen. MACHETORNIS Gray 1841. — Streit-Fliegenstelze.

Chrysolophus Sws. 1837 (nec Gray 1833).

165. 1. M. rixosa Gray

List Gen. B. p. 41. — *Suiriri* Azar. Apunt. no. 197. — *Tyrannus rixosus* Vieill. N. D. XXXV. p. 85. — Id. Enc. p. 852. — *Muscicapa joazeiro* Spix Av. Bras. II. p. 17. t. 23. — *Muscicapa miles* Wied Beitr. III. p. 850. — *Tyrannus ambulans* Sws. Quart. Journ. XX. p. 279. 15. — *Chrysolophus ambulans* Id. Class. B. II. p. 225. — *Pepoaza rixosa* Orb. & Lafr. Syn. p. 62. 5. — Orb. Voy. p. 350.

Muscicapa polyglotta nicht ihres Gesanges halber, sondern wegen ihrer Aehnlichkeit in der Färbung mit *Mimus polyglottus* gegeben. —

*) Von πυρωπός (feueräugig). Es erinnert diese Gattung schon mehr an die kleinern Tyrannen, die Färbung ist einfarbiger, die Flügel sind ohne Binden, verhältnissmässig kürzer und mit kürzerer erster und zweiter Schwinge, als bei den eigentlichen *Taeniopterae*. —

276. — *Saurophagus rixosus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 48. — *Machetornis rixosus* Burm. Th. Bras. II. p. 514. — Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. SISOPYGIS *) Nob. — Bach-Fliegenstelze.

Suiriri (!) pt. Orb. 1839. *Suiriria* (!) Rchb. 1850.

166. 1. S. icterophrys Nob.

Suiriri obscuro y amarillo Azar. Apunt. no. 183. — *Muscicapa icterophrys* Vieill. N. D. XXI. p. 458. — Id. Enc. p. 832. — *Muscicapa chrysochloris* Wied Beitr. III. p. 793. — *Drymophila ichterophrys* Less. Trait. p. 388. — *Fluvicola icterophrys* Orb. & Lafr. Syn. p. 59. 5. — Gray Voy. Beagl. p. 53. — *Suiriri icterophrys* Orb. Voy. p. 338. 257. — Strickl. Ann. & Mag. N. H. 1844. p. 414. t. 12. — *Myiobius chrysochloris* Gray Gen. B. I. p. 249. 66. — *Elania icterophrys* Id. l. l. p. 250. 9. — *Taenioptera icterophrys* Burm. Th. Bras. II. p. 618. — *Muscicapa capistrata* Licht. in Mus. Berol. —

Rio Grande — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. CNIPOLEGUS Boie 1826. — Hauben-Ada.

167. 1. C. comatus Gray

List Gen. B. p. 40. — Kaup Journ. Orn. 1853. p. 29. — Burm. Th. Bras. II. p. 513. — Hein. Journ. Orn. Septemb. 1859. Gen. Cnipol. no. 1. — *Muscicapa comata* Licht. Doubl. p. 55. 566. — Wied Beitr. III. p. 819. — *Muscicapa galeata* Spix Av. Bras. II. p. 20. t. 27. — *Muscicapa lophotes* Temm. — *Cnipolegus lophotes* Boie Isis 1826. p. 973. not. 2. — *Blechropus cristatus* Sws. Flycatch. p. 99. t. 7. — *Fluvicola comata* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 48. —

Brasilien — ♂; Rio Grande — ♀ — 2 St.

Gen. SERICOPTILA **) „Schiff." Bp. 1854. — Ada.

Ada (!?) Less. 1831.

---

*) Von σισοπυγίς (Bachstelze). —

**) Hierher gehören noch folgende drei bolivianischen Arten:

3. *S. anthracina.* — *Cnipolegus anthracinus* „Cab." Hein. Journ. Orn. Sept. 1859. Gen. Cnip. no. 3;
4. *S. aterrima.* — *Fluvicola nigerrima* Orb. & Lafr. (nec Vieill.) Syn. p. 59. 3. — *Ada nigerrima* Orb. Voy. p. 340. 260. — *Cnipolegus aterrimus* Kaup Journ. Orn. 1853. p. 29. — Hein. l. l. Sept. 1859. Gen. Cnip. no. 4;
5. *S. unicolor.* — *Fluvicola cyanirostris* Orb. & Lafr. (nec Vieill.) Syn. p. 59. 4. — *Ada cyanirostris* Orb. Voy. p. 340. 259. — *Cnipolegus unicolor* Kaup Journ. Orn. 1853. p. 29. — Hein. l. l. Sept. 1859. Gen. Cnip. no. 6. —

168. 1. S. nigerrima Nob.

Muscicapa nigerrima Vieill. N. D. XXI. p. 453. — Id. Enc. p. 828. — *Muscicapa galeata* Spix Av. Bras. II. t. 28 (♀). — *Ada nigerrima* Less. Trait. p. 388 (♂). — *Ada rufogularis* Id. l. l. p. 388 (♀). — *Cnipolegus Lafresnayi* Kaup Journ. Orn. 1853. p. 29 (jun.). — *Cnipolegus nigerrimus* Hein. l. l. Sept. 1859. Gen. Cnipol. no. 2. — *Muscicapa carbonaria* Licht. in Mus. Berol. —

Rio Grande — ♂ — 2 St.

169. 2. S. cyanirostris Nob.

Suiriri negro peco celesto Azar. Apunt. no. 181 (♂). — *Suiriri cabeza y rabadilla de canela* Id. l. l. no. 178 (♀). — *Muscicapa cyanorostris* Vieill. N. D. XXI. p. 447. — Id. Enc. p. 823 (♂). — *Muscicapa ruficapilla* Id. N. D. XXI. p. 459. — Id. Enc. p. 833 (♀). — *Muscicapa analis* Licht. Nordm. Atl. p. 15 (♀). — *Cnipolegus cyanirostris* Boie Isis 1826. p. 973. not. 2. — Kaup Journ. Orn. 1853. p. 29. — Hein. l. l. Sept. 1859. Gen. Cnipol. no. 5. — *Muscicapa hypoleucoptera* Mén. — *Fluvicola cyanirostris* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 48. — Id. Ind. Azar. p. 12. — Gray Gen. B. I. p. 242. 2. t. 61. — *Muscicapa atra* Olf. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂, 2 ♀ — 3 St.

Gen. LICHENOPS Comm. 17??. — Brillen-Ada.

Ada (!?) pt. Less. 1831. *Perspicilla* Sws. 1837.

170. 1. L. perspicillata Gray

List Gen. B. p. 40. — *Motacilla perspicillata* Gm. S. N. p. 969. 103. — *Pico de plata* Azar. Apunt. no. 228. (♂). — *Suiriri chorreado* Id. l. l. no. 182 (♀). — *Oenanthe perspicillata* Vieill. N. D. XXI. p. 433 (♂). — *Muscicapa nigricans* Id. l. l. p. 454. — Id. Enc. p. 828 (♀). — *Sylvia perspicillata* Id. l. l. p. 490. — *Ada Commersoni* Less. Trait. p. 388. — *Perspicilla leucoptera* Sws. Flycatch. p. 109. t. 9. — *Fluvicola perspicillata* Orb. & Lafr. Syn. p. 58. 2. — Hartl. Ind. Azar. p. 12. & 15. — *Ada perspicillata* Orb. Voy. p. 339. 258. — *Lichenops perspicillatus & erythropterus* Gould Voy. Beagl. p. 51-52. t. 9 (♂ & ♀). — *Elania nigricans* Gray Gen. B. I. p. 251. 32 (♀). —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. CENTRITES Cab. 1847. — Sporn-Fliegenstelze.

Lessonia (!) Sws. 1831. *Centrophanes* Cab. 1845 (nec Kaup 1829). *Auchmalea* (!) Rchb. 1850.

171. 1. C. niger Nob.

Alauda nigra Bodd. Tabl. pl. enl. 738. 2. — *Alauda rufa* Gm. S. N. p. 792. 7. — *Alauda fulva* Lath. Ind. Orn. I. p. 42. 2. — Vieill. Enc. p. 309. — *Alondra espalda roxa* Azar. Apunt. no. 149. — *Anthus fulvus* Vieill. N. D. XXVI. p. 502. — Id. Enc. p. 328. — Orb. & Lafr. Syn. p. 16. 1. — Orb. Voy. p. 223. — *Sylvia dorsalis* King. — *Anthus sordidus* Less. — *Anthus erythronotus* Merr. Ersch. & Grub. Enc. IV. p. 289. — *Anthus variegatus* Gerv. & Eyd. Voy. Favor. p. 38. t. 15. — *Lessonia erythronotus* Sws. Class. B. II. p. 284. — *Lessonia nigra* Hartl. Ind. Azar. p. 10. — *Muscisaxicola nigra* Gould Voy. Beagl. p. 84. — *Centrophanes rufus* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 167. not. — *Muscisaxicola fulva* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 37. — *Centrites rufus* Cab. Orn. Not. p. 256. —

Araucana — ♂ — 2 St.

Gen. OCHTHOECA *) Cab. 1847. — Ufer-Fliegenstelze.

Ochthocea (!) Gray 1849. *Myiarchus* Bp. 1851 (nec Cab. 1814). *Octhoëca* (!) Scl. 1856.

172. 1. O. rufipectoralis Scl.

P. Z. S. 1856. p. 28. — *Fluvicola rufipectoralis* Orb. & Lafr. Syn. p. 60. 7. — Orb. Voy. p. 345. 267. t. 37. 2. — Bolivien — ♂ — 1 St.

---

*) Es gehören u. a. auch noch zu dieser Gattung:

2. *O. leucophrys* Scl. P. Z. S. 1856. p. 28. — *Fluvicola leucophrys* Orb. & Lafr. Syn. p. 60. 6. — Orb. Voy. p. 345. 266. t. 38. 1 (Bolivien);
3. *O. fumicolor* Scl. P. Z. S. 1856. p. 28. 9. t. 117 (Neu-Granada);
4. *O. rufipectus.* — *Tyrannula rufipectus* Lafr. R. Z. 1846. p. 207. — Scl. B. Bogot. p 21. 219 (Neu-Granada);
5. *O. setophagoides.* — *Tyrannula setophagoides* Bp. Att. Sc. It. VI. p. 405. — Scl. B. Bogot. p. 21. 220. — *Myiarchus setophagoides* Bp. Consp. I. p. 188 (vielleicht nur Weibchen oder junger Vogel der vorigen Art);
6. *O. Lessoni* Scl. P. Z. S. 1856. p. 28. — *Tyrannulus rufipectus* Less. (nec Lafr.) Descr. Mamm. & Ois. p. 296 (Neu-Granada);
7. *O. oenanthoides* Cab. Orn. Not. p. 255. — *Fluvicola oenanthoides* Orb. & Lafr. Syn. p. 60. 8. — Orb. Voy. p. 344. 265. t. 38. 2 (Bolivien).

Auch wird am besten hierher zu stellen sein das grössere mit *Ochthoeca* verwandte Formen enthaltende Genus *Ochthodiaeta* Nob. (von ὄχθη, Ufer und διαιτάω, leben), Typus:

O. fumigata. — *Tyrannula fumigata* Boiss. R. Z. 1840. p. 71. — *Myiobius fumigatus* Gray Gen. B. I. p. 249. 39. — *Tyrannus Boissoneaui* Bp Consp. I. p. 191. — *Tyrannus fumigatus* Scl. B. Bogot. p. 22. 230 (Neu-Granada).

Subfam. TODINÆ. Plattschnäbler.

Gen. TODUS Lin. 1766. — Plattschnabel.

173. 1. T. dominicensis Lafr.

R. Z. 1847. p. 331. 2. — *Todus* Briss. Av. IV. p. 528. t. 41. 2. — *Todus viridis* Vieill. (nec Lin.) Ois. Amer. Sept. I. p. 87. t. 56. — Id. Enc. p. 269. — Id. Gal. Ois. II. p. 198. t. 124. — ? *Todus subulatus* *) „Gould" Gray Gen. B. I. p. 63. 4. t. 22. —

Haiti — ♂ — 1 St.

Gen. PLATYRHYNCHUS Desm. 1805. — Breitschnabel.

174. 1. P. cancroma Temm.

Pl. col. 12. 2. — Sws. Z. Ill. t. 115. — Id. Flycatch. p. 158. t. 17. — Burm. Th. Bras. II. p. 500. — *Bigotillos* Azar. Apunt. no. 173. — *Muscicapa cancroma* Ill. in Mus. Berol. — *Platyrhynchus mystaceus* Vieill. N. D. XXVII. p. 14. — Id. Enc. p. 844. — *Todus cancroma* Licht. Doubl. p. 51. 540. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen TRICCUS **) Cab. 1845. — Bastard-Plattschnabel.

Muscipeta Temm. 1820 (nec Koch 1815). *Todirostrum* (!) Less. 1831. *Todirhamphus* (!) Kaup 1851 (nec Less. 1828).

---

*) Lafresnaye hält a. a. O. den *T. subulatus* Gould nur für eine Varietät seines *T. dominicensis* mit anderer Schnabelbildung; indessen passt Gray's Abbildung desselben viel eher zu *T. portoricensis* Less. (*T. multicolor* Gould), mit dem sie die schöne blaue Begränzung des rosenrothen Kehlfleckes gemein hat, leider jedoch die Färbung der Stirn nicht deutlich sehen lässt. —

**) Hierzu gehören noch u. a.:

4. *T. nigriceps.* — *Todirostrum nigriceps* Scl. P. Z. S. 27 March 1855 (Santa Martha);

5. *T. Illigeri.* — *Todus nigriceps* Ill. (nec Scl.) in Mus. Berol. — Oben olivengrünlich, Flügel und Schwanz schwärzlich, Steuerfedern und Schwingen schmal, Flügeldeckfedern breit gelbgrünlich gerandet; Kopfseiten lebhaft gelb, Oberkopf, Ohrendecken und Bartstreifen schwarz, wodurch die Seiten des Kopfes schwarz und gelb gestreift erscheinen, Kehle bis zum Kinn weiss; Schnabel schwarz, breiter als bei den übrigen typischen Arten und gleichsam nach *Platyrhynchus cancroma* hindeutend. — G. L. 3" 5"', Fl. 1" 7"', Schw. 1" 3"', Schnabelf. 5"', Schnabelbr. $3^1/_2$"', Lauf 7"'. — Nur ein Exemplar im berliner Museum aus Para von Sieber, dem Reisenden des Grafen von Hoffmannsegg;

175. 1. T. cinereus Cab.

Tsch. Faun. Per. p. 164. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 702. 167. — *Todus cinereus* Lin. S. N. p. 178. 2. — Desm. Hist. Nat. Tangar. Manak. & Tod. t. 68. — Vieill. Enc. p. 269. — *Muscicapa melanoxantha* Sparm. Mus. Carls. t. 97. — *Todus melanocephalus* Spix Av. Bras. II. p. 8. t. 9. 2. — Wied Beitr. III. p. 962. — Sws. Flycatch. p. 175. t. 18. — *Todirostrum cinereum* Less. Trait. p. 384. — Lafr. R. Z. 1846. p. 360. 1. — Scl. P. Z. Bogot. p. 20. 202. — *Todirostrum cinereum* ♂ *melanocephalum* Gray Gen. B. I. p. 257. 1 & 3. — *Triccus melanocephalus* Burm. Th. Bras. II. p. 495. —

Cayenne — ♂; Brasilien — ♂, 2 ♀ — 4 St.

176. 2. T. Sclateri *) nov. sp.

Similis praecedenti, sed paulo minor, rostro breviore; supra olivaceus, rectricum omnium apicibus latius albis; gutture albo, pileo nigrescente albo-mixto. — Long. al. 1″ 8‴, caud. 1″ 4‴, rostr. culm. 6‴, rostr. rict. 7‴, tars. 8‴. —

Peru — ♀ jun. — 1 St.

177. 3. T. poliocephalus Burm.

Th. Bras. II. p. 496. — *Todus poliocephalus* Wied Beitr. III. p. 964. — *Todirostrum flavifrons* Lafr. R. Z. 1846. p. 361. 3. — *Todirostrum poliocephalum* Scl. P. Z. S. 12 May 1857. sp. 6. — *Todus perspicillatus* Licht. in Mus. Berol.—

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. EUSCARTHMUS **) Wied 1831. — Tachuri.

178. 1. E. nidipendulus Wied

Beitr. III. p. 950. — *Triccus nidipendulus* Burm. Th. Bras. II. p. 498. — *Muscicapa viridula* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

---

6. *T. maculatus.* — *Todus maculatus* Desm. Hist. Nat. Tang. & Tod. t. 4.— *Platyrhynchus maculatus* Vieill. N. D. XXVII. p. 19. — Id. Enc. p. 841. — *Todus cinereus* Spix (nec Lin.) Av. Bras. II. p. 8. t. 10. 1. — *Todirostrum maculatum* Less. Trait. p. 384. — Lafr. R. Z. 1840. p. 360. 2. — *Todus adspersus* Ill. inMus. Berol. (Nord-Brasilien, Guiana). —

*) Scheint zwischen *T. cinereus* und *T. nigriceps* in der Mitte zu stehen, doch können wir nach dem einzigen vorhandenen, noch unausgefärbten Exemplare nicht mit Sicherheit bestimmen, ob es eine gute Art ist, und muss dieses spätern Untersuchungen vorbehalten bleiben. —

**) Zu der Gattung *Euscarthmus* stellte der Prinz zu Wied ursprünglich 5 Arten: *E. meloryphus*, *E. orbitatus*, *E. nidipendulus*, *E. cinereicollis* und *E. superciliaris.* Von diesen wurde zuerst *E. meloryphus* als Typus der Gattung *Lepturus* Sws.

179. 2. E. fumifrons Nob.

Todirostrum fumifrons Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 35. — *Triccus crinitus* Burm. Th. Bras. II. p. 497. — *Todus crinitus* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

180. 3. E. limbatus Nob.

Todus limbatus Licht. in Mus. Berol. —

Supra olivaceus, alis caudaque fuscis, extus olivaceo-marginatis, tectricibus maioribus externo, reliquis utroque pogonio olivaceis, remigibus omnibus, ultimis duabus exceptis, intus anguste, tribus dorso proximis extus quoque latissime albido-limbatis; subtus gutture albescente, pectore abdomineque flavescentibus; gula, jugulo, pectore densissime olivaceo-grisescente adspersis; macula inter nares et oculos palpebrisque albidis. — Long. tot. 4″ 6‴, al. 2″, caud. 2″, rostr. culm. 5‴, tars. 8‴, digit. med. exc. ung. 4‴. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. ORCHILUS Cab. 1845. — Zwerg-Tachuri.

181. 1. O. auricularis Nob.

Platyrhynchus auricularis Vieill. N. D. XXVII. p. 16. — Id. Enc. p. 838. — *Euscarthmus cinereicollis* Wied Beitr. III. p. 955. — *Vermivora melanotis* Less. Trait. p. 386. — *Todus megacephalus* Sws. Flycatch. p. 177. t. 19. — *Orchilus cinereicollis* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 164. — *Todirostrum cinereicolle* Hartl. Verz. Mus. Brem. Nachtr. p. 11. — *Todirostrum auriculare* Lafr. R. Z. 1846. p. 364. 12. — *Triccus auricularis* Burm. Th. Bras. II. p. 499. — *Muscicapa exilis* ♀ *pygmaea* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

---

abgezweigt, dann wurde *E. cinereicollis* als *Orchilus* Cab. gesondert; und es bleiben somit, da *E. superciliaris* entschieden zum Genus *Serphophaga* Gould gehört, nur noch die beiden eigentlich typischen Arten *E. orbitatus* und *E. nidipendulus*, von welchen ja auch a. a. O. die Abbildungen der Schnabelformen zur Erläuterung der Gattung gegeben sind. — Es würden desshalb von brasilianischen Arten noch hierher gestellt werden müssen:

4. *E. orbitatus* Wied Beitr. III. p. 958. — *Todirostrum orbitatum* Gray Gen. B. I. p. 257. 12. — *Todirostrum palpebrosum* Lafr. R. Z. 1846. p. 362. 11. — ? *Todirostrum striaticolle* Id. R. & Mag. Z. 1853. p. 58. — *Triccus orbitatus* Burm. Th. Bras. II. p. 497. — *Todus adspersus* Licht. in Mus. Berol.

5. *E. gularis* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 47. — *Tachuri cabeza do plomo* Azar. Apunt. no. 169. — *Muscicapa gularis* „Natt.“ Temm. Pl. col. 167. 1. — *Todirostrum gulare* Orb. & Lafr. Syn. p. 46. 2. — Orb. Voy. p. 315. 218. — ? *Euscarthmus canicapillus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 53. — *Todirostrum plumbeiceps* Lafr. R. Z. 1846. p. 361. — *Todirostrum rufilatum* Hartl. Journ. Orn. 1856. p. 98. — *Triccus gularis* Burm. Th. Bras. II. p. 496. — *Todus rufi-collis* Licht. in Mus. Berol. —

Gen. COLOPTERUS *) Cab. 1847. — Stummel-Tachuri.

Vermivora Less. 1831 (nec Meyer 1822).

182. 1. C. pilaris Cab.

Orn. Not. p. 253. t. 5. 4. — *Euscarthmus pilaris* Gray Gen. B. III. App. p. 30b. — *Todus pilaris* Licht. in Mus. Berol. —

Cartagena — ♂ — 1 St.

Gen. PHYLLOSCARTES **) nov. gen. — Laub-Tachuri.

183. 1. P. ventralis Nob.

Muscicapa ventralis „Natt." Temm. Pl. col. 275. 2. — *Tyrannulus ventralis* Id. Tabl. méth. p. 27. — *Elania ventralis* Gray Gen. B. I. p. 250. 15. — *Leptopogon ventralis* Bp. Consp. I. p. 186. — *Euscarthmus ventralis* Burm. Th. Bras. II. p. 491. —

Brasilien — ♀ — St.

---

*) Dieselbe eigenthümliche Verkürzung, jedoch nur der 3 ersten Schwingen, zeigen:

2. *C. cristatus* Cab. Orn. Not. p. 253. t. 5. 2-3. — *Euscarthmus cristatus* Gray Gen. B. III. App. p. 30b (Guiana);
3. *C. galeatus.* — *Muscicapa galeata* Bodd. Tabl. pl. enl. 391. 1. — *Motacilla cristata* Gm. S. N. p. 972. 108. — *Vermivora cristata* Less. Trait. p. 386. — *Euscarthmus galeatus* Gray Gen. B. I. p. 251. 10. — *Euscarthmus cristatus* Bp. Consp. I. p. 184. — *Todirostrum galeatum* Scl. P. Z. S. 12 May 1857. sp. 13 (Cayenne, Amazonenstrom). — Von der vorigen Art durch den Mangel der breiten olivengrünen Ränder der Deckfedern verschieden. —

**) Von φύλλον (Laub) und σκάρτης (Springer). Diese Gattung erinnert im Gefieder schon ganz an *Leptopogon*, hat aber einen breitern Schnabel mit weniger abgerundeter Firste und zeigt auch noch die für die *Todinae* characteristischen hohen Läufe. — In ihre Nähe würden zu stellen sein die Genera:

Hemitriccus Nob. (von ἡμί, halb und τρίζκος = *Todus*). *(Musciphaga* (!) Less. 1831). Von *Euscarthmus* durch längere Flügel, stärkern und breitern Schwanz und grössere Entwickelung der Bartborsten verschieden:

H. diops. — *Muscicapa diops* „Natt." Temm. Pl. col. 144. 1. — *Todirostrum diops* Lafr. R. Z. 1846. p. 365. 13. — *Euscarthmus vilis* Burm. Th. Bras. II. p. 490. — *Muscicapa vilis* Licht. in Mus. Berol. (Brasilien). —

Hapalocercus Cab. 1847. *(Lepturus* Sws. 1837, nec Moehr. 1752. *Leptocercus* Cab. 1845, nec Huebn. 1816. *Myiosympotes* Rchb. 1850):

1. *H. meloryphus.* — *Euscarthmus meloryphus* Wied Beitr. III. p. 947. — Burm. Th. Bras. II. p. 493. — *Lepturus ruficeps* Sws. Flycatch. p. 181. t. 20. — *Leptocercus ruficeps* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 164. — *Hapalocercus ruficeps* Id. Orn. Not. p. 254. — *Elania ruficeps* Gray Gen. B. App. III. p. 30b (Bahia);
2. *H. flaviventer* Cab. Orn. Not. p. 254. — *Tachuri de vientre amarillo* Azar. Apunt. no. 171. — *Alecturus flaviventris* Orb. & Lafr. Syn. p. 55. 4 — Orb. Voy. t. 36. 1. — *Arundinicola flaviventris* Id. l. l. p. 335. 245. — *Euscarthmus flaviventris* Burm. Th. Bras. II. p. 493. — *Muscicapa flaveola* Licht. in Mus. Berol. (Montevideo, Paraguay);

Gen. SERPHOPHAGA *) Gould 1837. — Scheitel-Tachuri.

Serpophaga (!) Gould 1837. *Culicivora* pt. Rchb. 1850 (nec Sws. 1827).

184. 1. S. subcristata Nob.

Contramaestre copetillo ordinario Azar. Apunt. no. 160. — *Sylvia subcristata* Vieill. N. D. XI. p. 209. — Id. Enc. p. 443. — *Muscicapa straminea* „Natt." Temm. Pl. col. 167. 2. — *Muscicapa cristata* Orb. & Lafr. Syn. p. 52. 9. — *Muscicapara subcristata* Orb. Voy. p. 326. 239. — *Serpophaga albocoronata* Gould Voy. Beagl. p. 49. — *Euscarthmus albocoronatus* Gray Gen. B. I. p. 251. 5. — *Euscarthmus subcristatus* Id. l. l. p. 251. 11. — *Helinaea subcristata* Hartl. Ind. Azar. p. 11. — *Muscicapa incompta* Licht. in Mus. Berol. —

Rio-Grande — ♂ ad.; Brasilien — ♂ juv. — 2 St.

185. 2. S. cinerea Scl.

P. Z. S. 9 Novemb. 1858. no. 55. — *Euscarthmus cinereus* Strickl. Ann. & Mag. N. H. 1844. p. 414. — Tsch. Faun. Per. p. 165. — Burm. Th. Bras. II. p. 526. — *Leptopogon cinereus* Tsch. Consp. p. 16. 79. — *Elania cinerea* Gray Gen. B. I. p. 250. 14. —

Brasilien — ♀ — 1 St.

---

3. *H. helviventer* Cab. Orn. Not. p. 351. — *Elania helviventris* Gray Gen. B. III. App. p. 30b (Antillen). —

Culicivora Sws. 1827 (*Sternura* Cuv. 1829. *Hapalura* Cab. 1847):

C. stenura Gray List Gen. B. p. 44. — *Muscicapa stenura* Temm. Pl. col. 167. 3. — *Hapalura stenura* Cab. Orn. Not. p. 252. — Burm. Th. Bras. II. p. 494. — *Muscicapa hapalura* Licht. in Mus. Berol. (Brasilien). —

Habrura Nob. (von ἁβρός, zart und οὐρα, Schwanz). (*Polystictus* Rchb. 1850, nec *Polysticte* Smith 1835):

H. minima. — *Pachyrhamphus minimus* Gould Voy. Beagl. p. 51. t. 15. — *Tityra minima* Gray Gen. B. I. p. 254. 32. — *Hapalura minima* Cab. Orn. Not. p. 252. — Burm. Th. Bras. II. p. 494 (Montevideo). —

*) Ausserdem gehören zu dieser Gattung noch u. a. folgende azara'sche Arten:

3. *S. nigricans* Gould Voy. Beagl. p. 50. — *Tachuri obscurito menor* Azar. Apunt. no. 167. — *Sylvia nigricans* Vieill. N. D. XI. p. 204. — Id. Enc. p. 458. — *Tachuris nigricans* Orb. & Lafr. Syn. p. 55. 2. — Orb. Voy. p. 334. 252. — *Euscarthmus nigricans* Hartl. Ind. Azar. p. 11. — Burm. Th. Bras. II. p. 492. — *Muscicapa obscurata* Licht. in Mus. Berol.;

4. *S. pectoralis.* — *Tachuri pecho amarillo* Azar. Apunt. no. 165. — *Sylvia pectoralis* Vieill. N. D. XI. p. 210. — Id. Enc. p. 462. — *Euscarthmus superciliaris* Wied Beitr. III. p. 953. — *Orchilus superciliaris* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 164. — *Euscarthmus pectoralis* Gray Gen. B. I. p. 251. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 492. — *Muscicapa pareola* Licht. in Mus. Berol. —

Gen. POGONOTRICCUS*) nov. gen. — Bart-Tachuri.

186. 1. P. eximius Nob.

Muscicapa eximia „Natt." Temm. Pl. col. 144. 2. — *Euscarthmus eximius* Burm. Th. Bras. II. p. 491. —

Brasilien — ♀ — 1 St.

Gen. ANÆRETES **) Rchb. 1850. — Hauben-Tachuri.

Anairetes (!) & *Culicivora* pt. Rchb. 1850.

187. 1. A. parulus Nob.

Muscicapa parulus Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 18. t. 9. — *Sylvia Bloxami* J. E. Gray Z. Misc. 1831. p. 11. — *Culicivora parulus* Orb. & Lafr. Syn. p. 57. — Orb. Voy. p. 332. 249. — *Serpophaga parulus* Gould Voy. Beagl. p. 49. — *Enscarthmus parulus* Gray Gen. B. I. p. 251. 4. — *Regulus plumulosus* Peale Unit. Stat. Explor. Exped. p. 94. t. 25. 4. —

Chile — ♂ — 2 St.

Gen. CYANOTIS Sws. 1837. — Königs-Tachuri.

Tachuris (!) Orb. & Lafr. 1837.

188. 1. C. Azarae Gray

List Gen. B p. 28. — *Tachuri rey* Azar. Apunt. no. 161. — *Sylvia rubrigastra* (!) Vieill. N. D. XI. p. 277. — Id. Enc.

---

*) Von *πώγων* (Bart) und *τρίχχος*. Die Flügel sind bei dieser Gattung ziemlich lang, der Schnabel verhältnissmässig klein und schwach, das Gesicht dicht von vielen feinen Bartborsten umgeben u. s. w. — Nahe verwandt ist das Genus;

Leptotriccus (von *λεπτός*, zart und *τρίχχος*) nov. gen. — Mit ähnlicher Schnabelbildung wie *Serphophaga*, aber mit stärker entwickelten, ziemlich langen Flügeln, breiten und langen Schwanzfedern und grünem, an *Euscarthmus* erinnernden Gefieder. Typus ist:

L. sylviolus. — *Muscicapa sylviola* Licht. in Mus. Berol. — Oben schön zeisiggrün, Flügel und Schwanz schwärzlich, Schwung-, Deck- und Steuer-Federn grünlich gerandet, Kopfseiten um das Auge herum rothbraun; unten grünlich-weiss, Kehle weisslich, von den Kopfseiten durch einen breiten hellgelblichen Strich getrennt, Unter-Schwanzdeckfedern gelblich. — G. L. 4″ 3‴, Fl. 2″, Schwz. 2″, Schnabelf. 4½‴, Lauf 8‴, Mittelz. 4‴. — Ein Exemplar aus Brasilien befindet sich im berliner Museum. —

**) Hierher gehören u. a. noch:

2. *A. albocristatus.* — *Tyrannulus albocristatus* Vig. Z. Journ. XVIII. p. 273. — *Vermivora elegans* Less. Voy. Thét. II. p. 323. — *Culicivora reguloides* (!) Orb. & Lafr. Syn. p. 57. 2. — Orb. Voy. p. 332. 250. t. 37. 1. — Tsch. Consp. p. 16. 83. — *Euscarthmus reguloides* (!) Cab. Tsch. Faun. Per. p. 166. — Gray Gen. B. I. p. 251. 8. — *Culicivora elegans* Id. l. l. p. 176. 4. — *Euscarthmus albocristatus* Id. l. l. p. 251. 6 (Peru, Chile):

3. *A. agilis.* — *Euscarthmus agilis* Scl. P. Z. S. 1856. p. 28. 10. t. 118 (Neu-Granada). —

p. 480. — *Regulus Azarae* „Licht.“ Naum. Vög. Deutschl. III. p. 966b. — *Regulus omnicolor* Vieill. Gal. Ois. II. p. 271. t. 166. — *Regulus byronensis* J. E. Gray Griff. Anim. Kingd. II. t. 42. — *Tachuris omnicolor* Orb. & Lafr. Syn. p. 55. 1. — *Tachuris rubrigastra* (!) Orb. Voy. p. 333. 251. — *Regulus superciliosus* Licht. in Mus. Berol. —

Bolivien — 2 ♂ ad.; Chile — ♂ ad., ♂ jun. — 4 St.

Subfam. ELAÏNINÆ. Fliegenstecher.

Gen. LEPTOPOGON Cab. 1845. — Flaumbärtchen.

189. 1. L. amaurocephalus Cab.

Tsch. Faun. Per. p. 162. — Id. Orn. Not. p. 251. — *Elania amaurocephala* Gray Gen. B. III. App. p. 11. — *Euscarthmus amaurocephalus* Burm. Th. Bras. II. p. 491. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

190. 2. L. poliocephalus *) nov. sp.

Supra viridis, pileo ardesiaco, capitis lateribus regioneque auriculari albido-adspersis, macula postauriculari nigrescente; alis caudaque fuscis, remigibus rectricibusque extus virescente-limbatis, tectricibus alarum externo pogonio apice late pallide flavescente-albidis; subtus flavescens, gutture albescentiore, olivaceo-substriolato, pectore olivascente. — Long. tot. 5″ 3‴, al. 2″ 9‴, caud. 2″ 6‴, rostr. culm. 7‴, tars. 7‴, dig. med. exc. ung. 4‴. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. PIPROMORPHA Schiff 1854. — Manakin-Fliegenstecher.

Muscicapara (!) pt. Orb. 1839. *Mionectes* pt. Cab. 1844.

191. 1. P. oleaginea Nob.

Muscicapa oleaginea Licht. Doubl. p. 55. 565. — *Muscicapa chloronotis* Less. Trait. p. 392. — *Muscipeta chloronotus* Orb. & Lafr. Syn. p. 51. 2. — *Muscicapara oleaginea* Orb. Voy. p. 323. 232. — *Elania oleaginea* Hartl. Verz.

*) Diese Art steht dem *Leptopogon superciliaris* Tsch. jedenfalls sehr nahe, indessen vermögen wir nach dessen Abbildung und Beschreibung allein, ohne Vergleichung der Original-Exemplare, nicht mit Sicherheit zu entscheiden, in wie fern dieser von der vorliegenden Art verschieden ist. Tschudi nennt die Haube in der Beschreibung schwarzbraun, in der Diagnose „saturate cinereus“, während sie bei unserm Exemplare lebhaft schiefergrau hin und wieder schwach olivengrünlich angeflogen ist, und beschreibt die Unterseite als weisslich-grün, während er sie gelblich abbildet; was ist nun das Richtige, Diagnose, Beschreibung oder Abbildung? —

Mus. Brem. p. 52. — *Mionectes oleagineus* Cab. Tsch. Faun. Per. p. 148. not. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 482. — Peru — ♂; Surinam — ♂; Cayenne — ♀ — 3 St.

192. 2. P. rufiventris Nob.

Mionectes rufiventer Cab. Tsch. Faun. Per. p. 148. not. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 482. — *Elania rufiventris* Gray Gen. B. III. App. p. 11. — *Muscicapa rufiventris* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — ♀ — 1 St.

Gen. CAPSIEMPIS *) nov. gen. — Halb-Tachuri.

193. 1. C. flaveola Nob.

Muscicapa flaveola Licht. Doubl. p. 56. 572. — *Tyrannula modesta* Sws. B. Braz. t. 48. — *Muscipeta flaveola* Burm. Th. Bras. II. p. 488. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. RHYNCHOCYCLUS **) Nob. — Kreisschnabel.

Cyclorhynchus Sundev. 1835 (nec Kaup 1829).

194. 1. R. flaviventer Nob.

Platyrhynchus flaviventer Spix Av. Bras. II. p. 12. t. 15. 1. — *Muscipeta flaviventris* Wied Beitr. III. p. 929. — *Tyrannula flaviventris* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Myiobius flaventer* Gray Gen. B. I. p. 294. 23. — *Cyclorhynchus flaviventer* Cab. Orn. Not. p. 549. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 700. 155. —

Bahia — ♀ — 1 St.

---

*) Von *κάπτω* (schnappen) und *ἐμπίς* (Mücke). Kleinere Form von *Rhynchocyclus* mit kleinerm, schwächerm und schmälerm Schnabel, sonst in vielen Beziehungen dem *R. flaviventer* ähnlich. —

**) Es gehören hierher noch u. a.:

3. *R. aequinoctialis.* — *Cyclorhynchus aequinoctialis* Scl. P. Z. S. 12 Jan. 1858. p. 12. 92 (Ecuador);
4. *R. olivaceus.* — *Platyrhynchus olivaceus* Temm. Pl. col. 12. 1. — Wied Beitr. III. p. 969. — *Todus olivaceus* Licht. Doubl. p. 51. 538. — *Platyrhynchus sulphurescens fem.* Spix Av. Bras. II. p. 10. t. 12. 2. — *Cyclorhynchus olivaceus* Gray List Gen. B. p. 52. — Burm. Th. Bras. II. 503 (Brasilien);
5. *R. sulphurescens.* — *Platyrhynchus sulphurescens mas.* Spix Av. Bras. II. p. 10. t. 12. 1. — *Platyrhynchus nuchalis* Wied Beitr. III. p. 971. — *Cyclorhynchus sulphurescens* Cab. Orn. Not. p. 249. — *Cyclorhynchus nuchalis* Burm. Th. Bras. II. p. 503 (Brasilien);
6. *R. megacephalus.* — *Tyrannula megacephala* Sws. B. Braz. t. 47. — *Myiobius megacephalus* Gray Gen. B. I. p. 249. 37. — *Muscipeta megacephala* Burm. Th. Bras. II. p. 487 (Brasilien). — Ein Exemplar des berliner Museums im Uebergangskleide zeigt, dass diese Art im Alter eine schwärzliche Haube bekömmt und der Unterkiefer an der Wurzel hellgefärbt wird. —

195. 2. R. brevirostris Nob.

Cyclorhynchus brevirostris Cab. Orn. Not. p. 249. — *Platyrhynchus brevirostris* Gray Gen. B. III. App. p. 11. —
Xalapa — ♂ — 1 St.

Gen. PHYLLOMYIAS *) nov. gen. — Laub-Fliegenstecher.

196. 1. P. brevirostris **) Nob.

Platyrhynchus brevirostris Spix Av. Bras. II. p. 13. t. 15. 2. — *Muscipeta asilus* Wied Beitr. III. p. 894. — *Muscicapa virescens* „Natt." Temm. Pl. col. 275. 3. — *Tyrannulus virescens* Id. Tabl. méth. p. 27. — *Muscicapa olivacea* Orb. & Lafr. Syn. p. 54. 14. — *Muscicapara boliviana* Orb. Voy. p. 328. 244. — *Myiobius asilus* Gray Gen. B. I. p. 249. 68. — *Elania virescens* Id. l. l. p. 250. 6. — *Elania olivacea* Id. l. l. p. 251. 26. — *Leptopogon olivaceus* Bp. Consp. I. p. 186. — *Muscicapa pusio* Licht. in Mus. Berol. —
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

197. 2. P. Burmeisteri ***) Nob.

Elaenea brevirostris Burm. (nec Spix) Th. Bras. II. p. 479.—
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. TYRANNISCUS ****) nov. gen. — Meisen-Fliegenstecher.

198. 1. T. nigricapillus Nob.

Tyrannulus nigricapillus Lafr. R. Z. 1843. p. 341. 12. — *Myiobius nigricapillus* Gray Gen. B. I. p. 249. 46. —
Neu-Granada — ♂ — 1 St.

---

*) Von φύλλον (Laub) und μυίας (= *Muscicapa*). Diese Gattung umfasst kleinere Formen von *Elaïnea* mit kurzem, breitem, weniger hohem Schnabel und meist olivengrünem Gefieder ohne dunklere Kappe. —

**) Am nächsten verwandt mit dieser Gattung ist das sonderbarer Weise bisher zu den *Psarinae* gestellte Genus:
Ornithium Hartl. 1853 (*Ornithion* (!) Hartl. 1853):
O. inerme Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 35. — *? Muscicapa minuta* Gm. S. N. p. 933. 29. — *? Myiobius minutus* Gray Gen. B. I. p. 249. 50. —

***) Von der vorigen Art ausser durch etwas grössere Dimensionen und lebhaftere Färbung der Oberseite hauptsächlich durch die Bildung des Schnabels verschieden, welcher schmäler, höher und seitlich stärker zusammengedrückt ist; Oberkiefer schwarzkraun, Unterkiefer weisslich. —

****) Diminutivum von τύραννος (Herrscher) = *Tyrannulus*. Von der folgenden Gattung hauptsächlich durch etwas breitern Schnabel, auffallend längere Flügel,

Gen. TYRANNULUS Vieill. 1816. — Tyrannchen.

199. 1. T. elatus Vieill.

Enc. p. 510. — Id. Gal. Ois. II. p. 93. t. 71 (♂). — Burm. Th. Bras. II. p. 483. — *Sylvia elata* Lath. Ind. Orn. II. p. 549. 153. — *Pipra elata* Spix Av. Bras. II. p. 7. t. 8a. 2 (♀). — *Elania elata* Gray Gen. B. III. App. p. 30b. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. MYIOPATIS *) nov. gen. — Mückenstecher.

200. 1. M. incanescens Nob.

Muscipeta incanescens Wied Beitr. III. p. 898. — *?Platyrhynchus murinus* **) Spix Av. Bras. II. p. 14. t. 16. 2. — *?Myiobius murinus* Gray Gen. B. I. p. 249. 75. —
Brasilien — ♀ — 1 St.

---

längern Schwanz und ungefärbte Haube verschieden. Als zweite Art gehört noch hierher:

T. flavifrons nov. sp.

Rücken und Kopf lebhaft dunkel olivengrün, Stirn, Augenrand und ein Streif unter dem Auge gelb, Flügel und Schwanz schwärzlich, Steuerfedern und Handschwingen schmal olivengrünlich, Armschwingen und Deckfedern breiter gelblich gerandet; Unterseite matt gelblich, Brust und Bauch stark olivengrünlich angeflogen. — G. L. 4'' 3''', Fl. 2'' 2''', Schwz. 2'', Schnabelf. 3''', Lauf 8''', Mittelz. o. Kr. $4^1/_2$'''. — 2 Exemplare im berliner Museum aus Neu-Granada. — Mit dieser Art stimmt ziemlich *Tyrannulus chrysops* Scl. (P. Z. S. 9 Nov. 1858. p. 10. 61.), ob aber dieser nach Fraser's Angabe Beeren und Sämereien fressende Vogel überhaupt hierher gehört, bleibt fraglich. —

*) Von μυῖα (Fliege) und πατέω (kosten, fressen). In diese Gattung stellen wir die kleinern Formen von *Elaïnea* mit verhältnissmässig gestreckterm, an der Spitzenhälfte seitlich stärker zusammengedrücktem Schnabel. — Gray citirt zum Genus *Myiaphanistes* Rchb. die uns unbekannte *Muscicapa obsoleta* Licht.; jedenfalls kann dieselbe aber nicht die kleine *M. obsoleta* Temm. sein, da die Abbildung einen Vogel von der Grösse eines *Tyrannus* vermuthen lässt.

**) Spix's Vogel passt so gut zu dieser als zu der folgenden Art, deren Synonymie nebst Beschreibung einer dritten, anscheinend neuen wir hier folgen lassen:

2. *M. obsoleta* Nob.

Muscicapa obsoleta Temm. Pl. col. 275. 1. — Orb. & Lafr. Syn. p. 52. 12. — *Tyrannulus obsoletus* Temm. Tabl. méth. p. 27. — *Muscicapara obsoleta* Orb. Voy. p. 328. 242. — *Elania obsoleta* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 53. — *Elaenea obsoleta* Burm. Th. Bras. II. p. 480. — *Elaenea murina* Id. (nec Spix) l. l. p. 481 (Brasilien);

3. *M. pusilla* nov. sp.

Oben trüb olivengrün, Oberkopf etwas dunkler, Zügel und Augenrand weisslich, Flügel und Schwanz schwärzlich, schmal grünlich-weiss gerandet, die weisslich gesäumten Flügeldeckfedern bilden zwei ziemlich breite Binden; unten blassgelblich, Brust leicht grau angeflogen, Kehle weisslich; Oberschnabel braun, Unterschnabel blassgelblich. — G. L. 3'' 8''', Fl. 1'' 10''', Schwz. 1'' 6''', Schnabelf. 4''', Lauf $6^1/_2$''', Mittelz. o. Kr. 4'''. — Ein Exemplar aus Cartagena im berliner Museum. —

Gen. ELAÏNEA *) Sundev. 1836. — Fliegenstecher.

Paroïdes (!) Less. 1831. *Elainia* (!) Sundev. 1836. *Elania* (!) Gray 1840. *Elaenia* (!) Cab. 1844. *Elaenea* (!) Cab. 1847 & Bp. 1850. *Elaïnia* (!) Rchb. 1850. *Muscipeta* Burm. 1850 (nec Koch 1815).

201. 1. E. pagana Gray

List Gen. B. p. 44. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 701. 158. — Burm. Th. Bras. II. p. 476. — *Muscicapa pagana* Licht. Doubl. p. 54. 562. — *Platyrhynchus paganus* Spix Av. Bras. II. p. 13. t. 16. 1. — *Muscicapa brevirostris* Wied (nec Spix) Beitr. III. p. 799. — *Muscipeta albiceps* Orb. & Lafr. Syn. p. 47. 5. — Orb. Voy. p. 319. 225. — *Tyrannula albiceps* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Myiobius albiceps* Gray Voy. Beagl. p. 47. — *Elania pagana & brevirostris* Id. l. l. 250. 1-2. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀; Guiana — ♂; Cayenne — ♀ — 6 St.

202. 2. E. modesta Tsch.

Consp. p. 14. 74.— Id. Faun. Per. p. 159.— *Elania sp.* Gray

---

*) Von ἐλαΐνεος = *oleagineus*. — Eine typische *Elaïnea* scheint auch eine neue, bisher noch unbeschriebene Art aus Cartagena zu sein:

5. *E. incomta* nov. sp.

Oben ziemlich klar bräunlich, ohne olivengrünen oder graulichen Anflug, Oberkopf am dunkelsten, über und hinter dem Auge ein weisslicher Streif, Flügel und Schwanz schwärzlich, die 3 letzten Armschwingen ziemlich breit weisslich, die vordern Arm- und die Hand-Schwingen schmal bräunlich-weiss gerandet, Flügeldeckfedern mit blass hellbräunlichen gleichsam 2 Binden bildenden Spitzen. Kehle weisslich, Brust stärker grau angeflogen, nach dem Bauche zu gelblicher, Bauch und Steiss gelblich überlaufen, am lebhaftesten anf der Bauchmitte. Oberkiefer braun, Unterkiefer blassgelblich, an der Spitze bräunlich. — G. L. 5″, Fl. 2″ 5‴, Schwz. 2″ 3‴, Schnabelf. 4‴, Lauf $8^1/_2$‴, Mittelz. o. Kr. $4^1/_2$‴. — Ein Exemplar im berliner Museum. —

Nahe verwandt mit *Elaïnea* ist auch die von Gould zu den *Psarinae*, von Hartlaub und Burmeister zu den *Fluvicolinae* gestellte Gattung:

Empidagra Nob. (*Suiriri* (!) Orb. 1839, von ἐμπίς (Mücke) und ἀγρέω = αἱρέω (fangen):

1. *E. suiriri* Nob.

Suiriri ordinario Azar. Apunt. no. 179. — *Muscicapa suiriri* Vieill. N. D. XXI. p. 467. — Id. Enc. p. 820. — Orb. & Lafr. Syn. p. 51. 1. — *Suiriri suiriri* Orb. Voy. p. 336. 255. — *Pachyrhynchus albescens* Gould. — *Pachyrhamphus albescens* Gray Voy. Beagl. p. 51. t. 14. — *Fluvicola suiriri* Hartl. Ind. Azar. p. 12. — *Elania suiriri* Gray Gen. B. I. p. 250. 16. — *Tityra albescens* Id. l. l. p. 254. 31. — *Elaenea albescens* Bp. Consp. I. p. 186. — *Taenioptera suiriri* Burm. Th. Bras. II. p. 519 (Paraguay, Montevideo);

2. *E. brevirostris* Nob.

Elaenia brevirostris Tch. Consp. 4. 75. — Id. Faun. Per. p. 15. 9. — *Elania sp.* Gray Gen. B. I. p. 251. 28 (Peru). —

Gen. B. I. p. 251. 27. — *Leptopogon modestus* Bp. Consp. I. p. 187. — *Tyrannula albiceps* Id. l. l. p. 190. — *Muscicapa cryptoleuca* Licht. in Mus. Berol. —

Chile *) — ♂ — 1 St.

203. 3. E. obscura Cab.

Tsch. Consp. p. 14. 73. — Id. Faun. Per. p. 158. — *Muscipeta obscura* Orb. & Lafr. Syn. p. 48. 6. — *Muscipeta Guillemini* Orb. Voy. p. 319. 226. — *Myiobius Guilleminii* Gray Gen. B. I. p. 249. 77. — *Muscicapa rustica* Licht. in Mus. Berol. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♀ — 2 St.

204. 4. E. mesoleuca nov. sp.

Supra grisescente-olivacea, alis caudaque fuscis, remigibus tribus dorso proximis extus latius albescente-limbatis, ceteris rectricibusque anguste olivascente-marginatis, tectricibus alaribus apice sordide albescentibus tres vittas plus minusve obsoletas formantibus; subtus albescens, gutture pectoreque imprimis olivaceo-grisescente densissime adspersis, ventre medio albo, hypochondriis crissoque pallide flavescentibus.— Long. tot. 5″ 6‴, al. 2″ 10‴, caud. 2″ 6‴, rostr. culm. 4‴, tars. 7‴, dig. med. exc. ung. 5‴. —

Rio Grande — ♀ — 1 St.

Gen. LEGATUS **) Scl. 1859. — Flecken-Fliegenstecher.

205. 1. L. albicollis Scl.

P. Z. S. 1859. p. 46. — *Barbichou de Cayenne* ♀ Buff. Pl. enl. 830. 2. — *Suiriri chorreado sin roxo* Azar. Apunt. no. 186. — *Tyrannus albicollis* Vieill. N. D. XXXV. p. 89. — Id. Enc. p. 854. — *Muscicapa legatus* Licht. Doubl. p. 56. 574. — *Muscipeta citrina* Wied Beitr. III. p. 917. — *Muscipeta albicollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 47. 2. — Orb. Voy. p. 318. 223. — *Tyrannus circumcinctus* Sws. B. Braz. t. 50. — *Tyrannula albicollis* Hartl. Ind. Azar. p. 12. — *Myiobius albicollis* Gray Gen. B. I. p. 249. 71. — *Pyrocephalus circumcinctus* Id. l. l. p. 250. 8. — *Elaenea albicollis* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 701. 162. — Burm. Th. Bras. II. p. 473. —

Bahia — 4 ♂ ad., ♀ ad., ♀ juv. — 6 St.

*) Das berliner Museum besitzt auch ein Exemplar dieser Art aus Neu-Granada, so dass sie sich über die ganze Westseite Südamerika's zu verbreiten scheint. —

**) Als zweite Art gehört in diese Gattung:

2. *L. variegatus* Scl. P. Z. S. 1859. p. 46. — Id. Ibis 1859. p. 123. 160. — *Elaenia variegata* Id. P. Z. S. 1856. p. 297 (Mexico und Central-America).—

Gen. MYIOZETETES *) Scl. 1859. — Kronen-Fliegenstecher.

?*Myiacleptes* (!) Rchb. 1850. *Machaetornis* **) Id. 1850 (nec Gray 1841). *Myiozeta* (!) Schiff 1854. *Tyrannula* Burm. 1856 (nec Sws. 1827).

206. 1. M. similis Nob.

Muscicapa similis Spix Av. Bras. II. p. 18. t. 25. — *Muscicapa trivirgata* Wied Beitr. III. p. 871 (juv.). — *Muscipeta cayennensis* Orb. & Lafr. (nec Lin.) Syn. p. 47. 1. — Orb. Voy. p. 317. 222. — *Tyrannula similis* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Myiobius similis* Gray Gen. B. I. p. 249. 26. — *Tyrannula superciliosa* Bp. Consp. I. p. 190. — *Elaenea similis* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 46. — *Elaenea miles* Id. Th. Bras. II. p. 474. —

Long. tot. 7″, al. 3″ 6‴, caud. 3″ 3‴, rostr. culm. 6½‴, tars. 10‴, dig. med. exc. ung. 7‴. —

Brasilien — 2 ♂ ad., 2 ♀ ad., ♀ juv. — 5 St.

207. 2. M. cayennensis Scl.

P. Z. S. 1856. p. 56. — *Muscicapa cayennensis* Lin. S. N. p. 327. 12. — *Tyrannus cayennensis* Temm. Tabl. méth. p. 24. — *Myiobius cayanensis* Gray Gen. B. I. p. 249. 25. — *Tyrannula cayennensis* Bp. Consp. I. p. 190. — *Myiozeta cayennensis* „Id.“ Scl. l. l. —

Pileo pulchre flavo. — Long. tot. 7″, al. 3″ 6‴, caud. 3″ 3‴, rostr. culm. 6‴, tars. 9‴, dig. med. exc. ung. 6½‴. —

Cayenne — ♂ — 1 St.

208. 3. M. guianensis nov. sp.

Elaenea cayanensis Cab. (nec Lin.) Schomb. Reis. Guian. III. p. 701. 159. —

Similis praecedenti, sed minor, magis brunnescens; crista laete aurantia, remigibus primariis rufescente-, secundariis tectricibusque alarum haud marginatis. — Long. tot. 6″ 3‴, al. 3″ 1‴, caud. 2″ 8‴, rostr. culm. 6‴, tars. 10‴, dig. med. exc. ung 7‴. —

Guiana — 2 ♂; Surinam — ♀ — 3 St.

---

*) Als eigene Art dürfte auch noch abzusondern sein:

6. *M. flavus.* — *Muscicapa flava mas* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 59. t. 41. — Id. Enc. p. 827. — Von Haiti; nach Vieillot's Angabe ausgezeichnet durch die dunkle Rückenfärbung und die breiten braunrothen Ränder der Schwingen. — Ausserdem stellen wir noch hierher die Riesenform der Gattung:

7. *M. sulphureus.* — *Muscicapa sulphurea* Spix Av. Bras. II. p. 16. t. 20. — *Myiobius sulphureus* Gray Gen. B. I. p. 249. 79 (Para). —

**) Durch irrthümliche Hinzufügung des Synonym's *Muscicapa similis* Spix zu seiner *M. miles* hat der Prinz zu Wied wahrscheinlich bewirkt, dass Reichenbach (Syst. av. nat. t. 66.) erstere als Typus des Genus *Machetornis* abbildet. —

209. 4. M. columbianus nov. sp.

?*Elaenia cayennensis* Scl. (nec Lin.) P. Bogot. p. 22. 227.— Similis insequenti, sed minor, rostro paulo longiore, productiore; supra magis virescens, crista laetiore aurantio-rubra, remigibus primariis extus virescente - flavido -, secundariis virescente - albido - marginatis. — Long. tot. 6″ 6‴, al. 3″ 3‴, caud. 2″ 9‴, rostr. culm. 7‴, tars. 9‴, dig. med. exc. ung. 6‴. —

Porto Cabello — ♂, ♀; Cartagena — ♂ — 3 St.

210. 5. M. texensis Scl.

P. Z. S. 1859. p. 56. — Id. Ibis 1859. p. 123. 161. — *Tyrannula cayennensis* Sws. (nec Lin.) Syn. B. Mexic. p. 367. 14. — *Muscicapa texensis* Giraud Descript. sixt. new spec. N.-Am. B. coll. in Texas t. 1. — Scl. P. Z. S. 27 March. 1855. — *Elaenia texensis* Id. l. l. 1856. p. 296. 111. — *Elaenia mexicana* Kaup in Mus. Berol. & Heinean. — Long. tot. 7″ 6‴, al. 4″, caud. 3″ 6‴, rostr. culm. 5½‴, tars. 10‴, dig. med. exc. ung. 7‴. —

Xalapa — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. SAUROPHAGUS *) Sws. 1831. — Bentavi.

Tyrannus Vieill. 1816 (nec Cuv. 1799-1800). *Muscicapa* Temm. 1820 (nec Lin. 1735). *Pitangus* (!) Sws. 1827. *Apolites* Sundev. 1836.

211. 1. S. lictor Gray

Gen. B. I. p. 246. 3. t. 62. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 698. 148. — Bp. Consp. I. p. 193. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 44. — Burm. Th. Bras. II. p. 462. — *Lanius lictor* Licht. Doubl. p. 49. 524. — *Megarhynchus flavus* Thunb. (nec Gm.) Dissert. p. Schaerstroem 1824. no. 3. — Hein. Journ. Orn. 1859. p. 341. 3. — *Muscicapa cayennensis* Wied (nec Lin.) Beitr. III. p. 846. — *Saurophagus pusillus* Sws. Two Cent. p. 284. 12. — *Saurophagus Swainsonii* Gould. — *Saurophagus cayennensis* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 47. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

212. 2. S. Derbianus Kaup

P. Z. S. 1851. p. 44. t. 36. — *Tyrannus sulphuratus* Sws.

---

*) Zwischen den Gattungen *Myiozetetes* und *Saurophagus* steht gleichsam vermittelnd das Genus:

Conopias nov. gen (von κώνωψ (Mücke), wie μυίας von μυῖα gebildet):

C. superciliosus. — *Tyrannula superciliosa* Sws. B. Bras. t. 46. — Burm. Th Bras. II. p. 475. Anm. — *Muscicapa pitangula* Licht. in Mus. Berol (Brasilien). —

(nec Lin.) Syn. B. Mexic. p. 368. 23. — *Saurophagus sulphuratus* Gambel (nec Lin.) Journ. Acad. Phil. 1847. p. 39. — *Saurophagus guatimalensis* Lafr. R. & Mag. Z. 1852. p. 462. — *Pitangus derbianus* Scl. P. Z. S. 1856. p. 297. 118. — Id. Ibis 1859. p. 120. 139. — ?*Saurophagus eximius* Herz. Würtemb. —

Mexico — ♂ — 1 St.

213. 3. S. rufipennis Lafr.

R. & Mag. Z. 1851. p. 471. — *Saurophagus erythropterus* Kaup in Mus. Berol. & Heinean. —

Porto Cabello — ♂ ad., ♂ juv.; Caracas — ♀ — 3 St.

214. 4. S. sulphuratus Sws.

Class. B. II. p. 225. — Gray Gen. B. I. p. 246. 1. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 698. 147. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 44. — Lafr. R. & Mag. Z. 1851. p. 476. — *Lanius sulphuratus* Lin. S. N. p. 137. 19 (ad.). — *Garlu ou Geay à ventre jaune de Cayenne* Buff. Pl. enl. 249 (ad.). — *Bécarde à ventre jaune* Id. I. I. 296 (juv.). — *Corvus leucogaster* (!) Bodd. Tabl. pl. enl. 296 (juv.). — *Corvus flavus* Gm. S. N. p. 373. 38 (juv.). — *Corvus flavigaster* (!) Lath. Ind. Orn. I. p. 162. 31 (juv.). — *Tyrannus sulphuratus* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 77. t. 47. — *Tyrannus magnanimus* Id. Enc. p. 850. — *Megarhynchus sulphuratus* Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 2. — Hein. Journ. Orn. 1859. p. 340. 2. — *Pitangus sulphuratus* Gray List Gen. B. p. 41. — *Saurophagus flavus* Id. Gen. B. I. p. 246. 2 (juv.). —

Minor: rostro latiore, breviore; dorso olivaceo-brunnescente, pileo angustius albo-circumcincto, remigibus latius rufo-marginatis. — Long. tot. 9″, al. 4″, caud. 3″ 3‴, rostr. culm. 10‴, rostr. latit. 5‴, tars. 1″ 1‴, digit. med. exc. ung. 8½‴, ung. med. 5½‴. —

Guiana — ♀ — 1 St.

215. 5. S. Maximiliani Nob.

Muscicapa pitangua Wied (nec Lin.) Beitr. III. p. 838. — *Saurophagus sulphuratus* Burm. (nec Lin.) Verz. Mus. Hal. p. 47. — Id. Th. Bras. II. p. 451. —

Medius: rostre angustiore, productiore; dorso olivaceo-brunnescente, pileo latius albo-circumcincto, remigibus tectricibusque alaribus latius rufo-marginatis. — Long. tot 9″ 3‴, al. 4‴ 3‴, caud. 3″ 6‴, rostr. culm. 1″, rostr. latit. 4‴, tars. 1″, digit. med. exc. ung. 7½‴, ung. med. 4‴. —

Brasilien — ♂, 2 ♀ — 3 St.

216. 6. S. bellicosus Nob.

Bienteveo o Pitangua Azar. Apunt. no. 200. — *Tyrannus bellicosus* Vieill. N. D. XXXV. p. 47. — Id. Enc. p. 846.— *Tyrannus sulphuratus* Orb. & Lafr. (nec Lin.) Syn. no. 1.— Orb. Voy. p. 304. 202. — Hartl. Ind. Azar. p. 13. — *Saurophagus flavus* Kaup (nec Gm.) P. Z. S. 1851. p. 44. — *Saurophagus bolivianus* Lafr. R. & Mag. Z. 1852. p. 462.— Maior: rostro latissimo; dorso grisescente - olivaceo, pileo latius albo - circumcincto, remigibus tectricibusque alaribus anguste pallide rufescente - marginatis. — Long. tot. 11″, al. 5″, caud. 4″, rostr. culm. 1″ 2‴, rostr. latit. 6½‴, tars. 1″ 2‴, dig. med. exc. ung. 9½‴, ung. med. 5‴. —

Rio Grande — ♂; Montevideo — ♂, ♀ — 3 St.

Gen. MEGARHYNCHUS *) Thunb. 1824. — Bauchschnabel.

Tyrannus Cuv. 1817 (nec 1799-1800). *Platyrhynchus* Temm. 1820 (nec Desm. 1805). *Scaphorhynchus* Wied 1831. *Megastoma* Sws. 1837.

217. 1. M. pitangua Thunb.

Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 1. — Hein. Journ. Orn. 1859. p. 345. 1. — *Lanius pitangua* Lin. S. N. p. 136. 15. — *Bentaveo ou Cuiriri* Buff. Pl. enl. 212. — *Neinei* Azar. Apunt. no. 199. — *Tyrannus pitangua* Sws. Quart. Journ. XX. p. 570. 2. — *Tyrannus carnivorus* Vieill. Enc. p. 847. — *Muscicapa pitangua* Licht. Doubl. p. 54. 567.— *Scaphorhynchus sulphuratus* Wied Beitr. III. p. 983. — *Megastoma flaviceps* Sws. Two Cent. p. 285. 13 (♂). — *Megastoma ruficeps* Id. l. l. p. 285. 14 (♀). — *Megastoma atriceps* Id. l. l. p. 285. 15 (juv.). — *Platyrhynchus pitangua* Temm. Tabl. méth. p. 23. — *Scaphorhynchus pitangua* Strickl. Aun. & Mag. N. H. 1841. VII. p. 28. — Gray List Gen. B. p. 41. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 44. — Lafr. Mag. & R. Z. 1851. p. 474-476. — Burm. Th. Bras. II. p. 458. — *Scaphorhynchus ruficeps* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49 (♀). — *Scaphorhynchus flaviceps* Gray Gen. B. I. p. 246. 2 (♂). — *Scaphorhynchus atriceps* Id. l. l. p. 246. 3 (juv.). —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ ad. — 3 St.

*) Als dritte Art gehört hierher:

3. *M. mexicanus* Hein. Journ. Orn. 1859. p. 346. 3. — *Scaphorhynchus mexicanus* Lafr. R. & Mag. Z. 1851. p. 473. — Scl. Ibis 1859. p. 120. 138 (Mexico und Central-America). —

218. 2. M. chrysocephalus Heine

Journ. Orn. 1859. p. 342. 2. — *Scaphorhynchus chrysocephalus* Tsch. Consp. p. 12. 60. — Id. Faun. Per. p. 150. t. 8. 1. — Lafr. R. Z. 1848. p. 5. — *Pitangus* (!) *chrysocephalus* Scl. P. Bogot. p. 22. 234. — *Myiodynastes chrysocephalus* Id. P. Z. S. 1859. p. 43. —

Venezuela — ♂, ♀ — 2 St.

Subfam. TYRANNINÆ. Tyrannen.

Gen. MUSCIVORA Cuv. 1799-1800. — Königs-Tyrann.

Todus Bonn. 1790 (nec Lin. 1766). *Onychorhynchus* Fisch. 1814. *Muscipeta* Cuv. 1817. *Megalophus* Sws. 1837. *Trepsiphone* Gray 1840 (nec Glog. 1827).

219. 1. M. regia Gray

List Gen. B. p. 42. — Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Cl. Kais. Acad. Wissensch. Wien 1858. p. 326. 1. — *Roi des gobe-mouches* Buff. Pl. enl. 289. — *Todus regius* Gm. S. N. p. 445. 10. — Lath. Ind. Orn. I. p. 267. 10. — Vieill. Enc. p. 267. — *Platyrhynchus regius* Id. l. l. p. 843. — *Megalophus regius* Bp. (nec Sws.) Consp. I. p. 183. gen. 358. —

Guiana — ♂ — 1 St.

220. 2. M. Swainsoni Pelzeln

Sitzungsber. math.-naturw. Cl. Kais. Acad. Wissensch. Wien 1858. p. 362. 2. — *Muscipeta regia* Wied (nec Gm.) Beitr. III. p. 944. — Orb. Voy. p. 317. 221. — ?*Muscicapa regia* Eydoux & Gervais (nec Gm.) Voy. Favor. Mag. Z. 1836. t. 73. — *Megalophus regius* Sws. Flycatch. p. 145. t. 15. — Id. B. Braz. t. 54-55. — Burm. Th. Bras. II. p. 504. — *Muscivora regia* Id. (nec Gray) Journ. Orn. 1853. p. 165. 6.—

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. PHONEUTRIA Rchb. 1850. — Schwalben-Tyrann.

Hirundinea (!) Orb. & Lafr. 1837.

221. 1. P. ferruginea Nob.

Todus ferrugineus Gm. S. N. p. 446. 12. — *Suiriri obscuro roxo* Azar. Apunt. no. 189. — *Tyrannus bellicosus* Vieill. N. D. XXXV. p. 74. — Id. Enc. p. 846. — *Platyrhynchus*

hirundinaceus Spix Av. Bras. II. p. 11. t. 13. 1. — *Platyrhynchus rupestris* Wied Beitr. III. p. 997. — *Hirundinea bellicosa* Orb. & Lafr. Syn. p. 46. 1. — Orb. Voy. p. 314. 216. — *Myiarchus ferrugineus* Cab. Tsch. Consp. p. 13. 66. — Id. Faun. Per. p. 154. — *Platyrhynchus ferrugineus* Gray Gen B. I. p. 256. 8. — *Muscivora rupestris* Id. l. l. p. 258. 3. — *Muscivora ferruginea* Cab. Orn. Not. p. 250. — Burm. Th. Bras. II. p. 505. — *Hirundinea ferruginea* Scl. B. Bogot p. 22. 229. —

Brasilien — ♂ ad., ♀ ad., ♂ juv. — 3 St.

Gen. PYRRHOMYIAS *) nov. gen. — Kronen-Tyrann.

222. 1 P. Heinei Nob.

Myiobius Heinei Cab. in Mus. Heinean. —

Ferrugineus, pileo fuscescente, crista pulchre flava, fasciola uropygiali pallide rufescente; alis caudaque nigrescentibus, rectricibus omnibus ferrugineo - terminatis, extimae utrinque utroque, reliquis - duabus mediis exceptis - interno pogonio late ferrugineo - limbatis; remigum primariarum (quae sunt rufo et terminatae et extus marginatae) interni, secundariarum utriusque pogonii dimidio basali ferrugineo; subtus ferrugineus, abdomine medio ochrascente. — Long. tot. 5″ 3‴, al. 2″ 8‴, caud. 2″ 8‴, rostr. culm. 5‴, tars. 6‴, dig. med. exc. ung. 4‴. —

Caracas — ♂ — 1 St.

223 2. P. cinnamomeus Nob.

Muscipeta cinnamomea Orb. & Lafr. Syn. p. 49. 11. — Orb. Voy. t. 34. 1. — *Muscipeta Vieillotii* Id. l. l. p. 321. 229. — *Myiobius pyrrhopterus* **) Hartl. R. Z. 1843. p. 289. — *Myiobius Vieillotii* Gray Gen. B. I. p. 249. 21. — *Myiobius cinnamomeus* Id. l. l. p. 249. 42. — *Tyrannula Vieillotii* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Tyrannula pyrrhoptera* Bp. Consp. I. p. 191. — *Tyrannula cinnamomea* Scl. B. Bogot. p. 21. 214. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

---

*) Von πύῤῥος (röthlich) und μυίας (Fliegenfänger). Dieses Genus unterscheidet sich von *Myiobius* durch den kürzern, weniger gestreckten, an der Wurzeln breitern Schnabel, schwächere Bartborsten, entwickeltere und mehr zugespitzte Flügel, etwas ausgerandetem Schwanz u. s. w. —

**) Hartlaubs Vogel ist mit der Abbildung von Orbigny jedenfalls identisch, jedoch stimmen dessen Diagnose und Beschreibung, welche den grünlichen Anflug des Rückens unerwähnt lassen, nicht ganz mit der Abbildung überein. —

Gen. MYIOBIUS *) Gray 1838. — Bart-Tyrann.

Platyrhynchus Spix 1824 (nec Desm. 1805). *Tyrannula* Sws. 1827 (nec *Tyrannulus* Vieill. 1816).

224. 1. M. xanthopygus **) Nob.

Platyrhynchus xanthopygus Spix Av. Bras. II. p. 9. t. 9. 1.— *Muscipeta barbata* Sws. (nec Gm.) Z. Ill. t. 116. — Wied Beitr. III. p. 934. — *Tyrannula barbata* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Myiobius barbatus* Burm. Th. Bras. II. p. 501.— *Muscicapa eupogon* Licht. in Mus. Berol. —

Bahia — ♂, 2 ♀ — 3 St.

Gen. PYROCEPHALUS Gould 1838. — Rubinköpfchen.

225. 1. P. parvirostris Gould

Voy. Beagl. p. 44. t. 6.— *Churrinche* Azar. Apunt. no. 177.— *Muscicapa coronata* Wied (nec Gm.) Beitr. III. p. 880 (♂). — Orb. & Lafr. Syn. p. 47. 3. — *Muscipeta strigilata* Wied Beitr. III. p. 900 (♀). — *Suiriri coronata* Orb. Voy. p. 336. 256. — *Tyrannula coronata* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 80. — *Pyrocephalus coronatus* Id. Ind. Azar. p. 12. — *Myiobius strigilatus* Gray Gen. B. I. p. 249. 69 (♀). — *Elaenea coronata* Burm. Th. Bras. II. p. 476. —

Rio Grande — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 4 St.

226. 2. P. rubineus Gray

Gen. B. I. p. 250. — Scl. B. Bogot. p. 21. 224. — *Muscicapa rubinea* Bodd. Tabl. Pl. enl. 675. 1. — *Muscicapa coronata* Gm. S. N. p. 932. 25. — *Platyrhynchus coronatus* Vieill. Enc. p. 840. — *Tyrannula coronata* Bp. P. Z. S. 1837. p. 112. 25. — *Myiarchus coronatus* Cab. Tsch. Consp. p. 13. 67. — Id. Faun. Per. p. 155. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 700. 154. — *Pyrocephalus coronatus* Bp. Consp. I. p. 188. —

Peru — ♂ ad.; Venezuela — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 4 St.

---

*) Die beiden andern klimatischen Abarten dieser Art sind:

2. *M. barbatus* Gray List Gen B. p. 41. — *Le barbichou de Cayenne mas* Buff. Pl. enl. 830. 1. — *Muscicapa barbata* Gm. S. N. p. 933. 30 (Guiana);

3. *M. citrinopygius.* — *Tyrannula sulphurcipygia* (!) Scl. P. Z. S. 1856. p. 296. 103. — *Myiobius mexicanus* Cab. in Mus. Berol. (Mexico). —

**) Brasilianische Exemplare sind in allen Dimensionen kleiner, als die von Guiana, Columbien, Peru u. s. w., auch sind sie oben mehr bräunlich und zeigen einen weniger grünlichen Anflug. —

227. 3. P. mexicanus *) Scl.

P. Z. S. 1859. p. 43. — *Tyrannula coronata* Sws. (nec Gm.) Syn. B. Mexic. p. 367. 13. — *Pyrocephalus rubineus* Lawr. (nec Bodd.) Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York 28 Apr. 1851. B. Tex. no. 3. — Cass. B. Calif. p. 127. t. 18. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 102. —

Xalapa — ♂ ad., ♂ juv., ♀ juv. — 3 St.

Gen. AULANAX **) Cab. 1856. — Hofkönig.

228. 1. A. nigricans Cab.

Journ. Orn. 1856. p. 2. — *Tyrannula nigricans* Sws. Syn. B. Mexic. p. 367. 12. — Id. B. Braz. t. 69. — *Muscicapa nigricans* Aud. B. N.-Am. V. p. 302. t. 434. 6.— *Myiobius nigricans* Gray Gen. B. I. p. 249. 14. — *Sayornis nigricans* Bp. Not. Orn. p. 87. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 296. 109. — Id. P. Z. S. 9 June 1857. List B. coll. by Bridg. in Calif. no. 15. — *Muscicapa atrata* Licht. in Mus. Berol. —

Mexico — ♂ — 1 St.

Gen. THEROMYIAS ***) Nob. — Jagd-Tyrann.

Sayornis (!) Bp. 1854.

229. 1. T. Sayi Nob.

Muscicapa saya (!) Bp. Am. Orn. I. p. 20. t. 2. 3.— Id. Syn. p. 67. — Aud. B. N.-Am. IV. p. 428. t. 459. 4-5. — *Tyrannula pallida* Sws. Syn. B. Mex. p. 367. 15. — *Tyrannula saya* Sws. & Rich. Faun. Bor. Am. II. p. 142. t. 45.—

---

*) Von den beiden südamericanischen Arten leicht zu unterscheiden durch grössere Dimensionen, längere Flügel, verhältnissmässig schmälern und gestrecktern Schnabel und helleres weniger schönes Roth, welches besonders bei jüngern Vögeln im Uebergangskleide am deutlichsten hervortritt, wo es fast einen gelblichen Anflug zeigt. — G. L. 5'' 9''', Fl. 3'' 4''', Schwz. 2'' 8''', Schnabelf. 5''', Lauf 9''', Mittelz. o. Kr. 6'''. —

**) Zu dieser Gattung stellen wir noch:

2. *A. aquaticus.* — *Sayornis aquatica* Scl. Ibis 1859. p. 119. 136 (Guatemala);

3. *A. latirostris* nov. sp. — *? Myiarchus nigricans* Cab. Tsch. Consp. p. 13. 65. — Id. Faun. Per. p. 153. — ? *Sayornis nigricans* Scl. B. Bogot. p. 21 222. — Da bereits der in Central-America vorkommende Vogel als eigene Art abgesondert ist, so wird wahrscheinlich auch der südamerikanische gleiche Ansprüche geltend machen können. Derselbe scheint etwas grösser zu sein, als die beiden vorhergehenden Arten, namentlich fällt der viel breitere Schnabel auf; ferner hat er viel breitere weisse Ränder an den Schwingen und den grossen Flügeldeckfedern, und zeigen auch die kleinen röthliche Ränder, was jedoch noch Jugendzustand sein könnte. In der Färbung des übrigen Gefieders gleicht das uns vorliegende bolivianische Exemplar des berliner Museums am meisten den mexicanischen. —

***) Von *θηράω* (jagen) und *μυίας* (Fliegenfänger). —

Tyrannula Sayii Sws. B. Braz. t. 70. — *Myiobius sayus* Gray Gen. B. I. p. 249. 12. — *Ochthoeca saya* Cab. Orn. Not. p. 255. — *Aulanax sayus* Id. Journ. Orn. 1856. p. 2. — *Sayornis pallida* Scl. P. Z. S. 9 June 1857. l. l. no. 14. — *Tyrannus Sayii* Wied Journ. Orn. 1858. p. 183. —

Mexico — ♂ — 1 St.

Gen. EMPIDIAS *) nov. gen. — Mückenjäger.

230. 1. E. fuscus Nob.

Muscicapa carolinensis fusca Briss. Av. IV. p. 367. 6. — *Muscicapa fusca* Gm. S. N. p. 931. 8. — Vieill. Ois. Am. Sept. p. 68. t. 40. — Id. Enc. p. 829. — Aud. B. N.-Am. II. p. 122. t. 120. — *Muscicapa nunciola* Wils. Am. Orn. II. p. 78. t. 13. 4. — *Tyrannula fusca* Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 24. 149. — *Myiobius nunciola* Gray Gen. B. I. p. 248. 6. — *Myiarchus fuscus* Cab. Orn. Not. p. 248. — *Tyrannula nunciola* Bp. Consp. I. p. 189. — *Aulanax fuscus* Cab. Journ. Orn. 1856. p. 1. 74. —

Nord-America — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. MYIOPHOBUS Rchb. 1850. — Fliegenscheucher.

231. 1. M. olivus Nob.

Muscicapa oliva Bodd. Tabl. Pl. enl. 574. 2. — *Muscicapa agilis* Gm. S. N. p. 948. 90. — Vieill. Enc. p. 817. — *Muscipeta fuscata* Wied Beitr. III. p. 902. — Burm. Th. Bras. II. p. 487. — *Muscipeta bimaculata* Orb. & Lafr. Syn. p. 48. 7. — Orb. Voy. p. 329. 227. — *Tyrannula fuscata* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 58. — *Myiobius olivus* Gray Gen. B. I. p. 249. 29. — *Myiobius fuscatus* Id. l. l. p. 249. 32. — *Myiobius bimaculatus* Id. l. l. p. 249. 72. — *Myiobius fuscatus* ♀ *agilis* Bp. Consp. I. p. 188. — *Elaenea fuscata* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 46. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — ♀; — Surinam — ♀ — 5 St.

232. 2. M. naevius Nob.

Muscicapa naevia Bodd. Tabl. Pl. enl. 574. 3 (♀). — *Muscicapa virgata* Gm. S. N. p. 918. 8?. — Vieill. Enc. p.

*) Von ἐμπίς (Mücke) wie μυίας von μυῖα gebildet. Es nähert sich dieses Genus durch den schmalen Schnabelbau der Gattung *Aulanax*, unterscheidet sich jedoch von derselben durch den etwas ausgerandeten, seitlich nicht abgerundeten Schwanz; auch ist die Schnabelfirste immer gewölbter, die Zehen sind mehr entwickelt und das Gefieder nicht einfarbig schwarz, wie bei jener. —

820 (♀). — *Platyrhynchus chrysoceps* Spix Av. Bras. II. p. 10. t. 11. 2 (♂). — *Muscipeta chrysoceps* Wied Beitr. III. p. 940. — *Muscicapa flammiceps* Temm. Pl. col. 144. 3 (♀). — *Tyrannula auriceps* Gould & *Myiobius auriceps* Gray Voy. Beagl. p. 47 (♀). — Id. Gen. B. I. p. 249. 15. — *Muscipeta virgata* Orb. & Lafr. Syn. p. 49. 10. — Orb. Voy. p. 320. 228. — Burm. Th. Bras. II. p. 486. — *Tyrannula ferruginea* Sws. B. Braz. t. 53 (♀). — *Tyrannula chrysoceps* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Myiobius naevius* Gray Gen. B. I. p. 249. 20. — *Myiobius chrysoceps* Id. l. l. p. 249. 22. — *Myiarchus virgatus* Cab. Orn. Not. p. 248. — *Pyrocephalus virgatus* Bp. Consp. I. p. 188. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. EMPIDONAX *) Cab. 1855. — Mückenherrscher.

233. 1. E. pusillus Cab.

Journ. Orn. 1855. p. 480. 74. — *Tyrannula pusilla* Sws. & Rich. Faun. Bor. Am. II. p. 144. t. 46. — *Muscicapa pusilla* Aud. B. N.-Am. V. p. 228. t. 434. 1. — *Myiobius pusillus* Gray Gen. B. I. p. 249. 11. —

Mexico — ♂, ♀ — 2 St.

234. 2. E. Trailli Nob.

Muscicapa virens Aud. (nec Lin.) B. N.-Am. I. p. 235. t. 45. — *Muscicapa Traillii* Id. Syn. B. N.-Am. p. 42. 12. — *Myiobius Traillii* Gray Gen. B. I. p. 249. 9. — *Tyrannula Trailli* Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 24. 146. —

Nord-America — ♂ — 2 St.

---

*) Dahin würden u. a. noch zu stellen sein:

3. *E. acadicus.* — *Muscicapa acadica* Gm. S. N. p. 947. 82. — Aud. B. N.-Am. II. p. 256. 141. — *Muscicapa querula* Wils. Am. Orn. p. 77. t. 13. — *Platyrhynchus virescens* Vieill. N. D. XXVII. p. 22. — Id. Enc. p. 844. — *Tyrannula acadica* Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 24. 145. — *Myiobius acadicus* Gray Gen. B. I. p. 249. 8. — *Myiarchus acadicus* Cab. Orn. Not. p. 248 (Nord-America);

4. *E. rubicundus.* — *Muscicapa rubicunda* Licht. in Mus. Berol. — Oben hellbraun, Kopf dunkler braun, Flügel und der leicht gegabelte Schwanz schwärzlich, Aussenfahne der äussersten Steuerfedern weisslich, Handschwingen braun, Armschwingen deutlich hellbräunlich gerandet, Flügeldeckfedern mit breiten, rostbräunlichen, zwei Binden bildenden Säumen; Unterseite und Kopfseiten lebhaft rostbräunlich, Kehle und Bauch heller, mehr weisslich, Oberschnabel braun, Unterschnabel weisslich. — G. L. 4″ 6‴, Fl. 2″ 3‴, Schwz. 2″, Schnabelf. 5‴, Lauf 7‴, Mittelz. o. Kr. 4‴. — 3 Exemplare aus Mexico im berliner Museum. —

Gen. MYIOCHANES *) Nob. — Fliegenhascher.

Syrichtha Bp. 1854 (nec *Syrichthus* Hope).

235. 1. M. cinereus Nob.

Platyrhynchus cinereus Spix Av. Bras. II. p. 11. t. 13. 2 — *Tyrannula curtipes* Sws. B. Braz. t. 54. — *Myiobius curtipes* Gray Gen. B. I. p. 249. 24. — *Myiarchus cinereus* Cab. Orn. Not. p. 248. — Burm. Th. Bras. II. p. 473. — *Tyrannula cinerea* Bp. Consp. I. p. 190. — *Contopus cinereus* Cab. Journ. Orn. 1855. p. 479. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. CONTOPUS Cab. 1855. — Kurzfuss-Tyrann.

236. 1. C. virens Cab.

Journ. Orn. 1855. p. 479. 70. — *Muscicapa virens* Lin. S. N. p. 327. 11. — Aud. B. N.-Am. II. p. 93. t. 115. — *Muscicapa querula* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 68. t. 39. — *Muscicapa rapax* Wils. Am. Orn. II. p. 81. t. 13. 5. — *Tyrannula virens* Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 24. 147. — *Myiobius virens* Gray Gen. B. I. p. 249. 10. — *Myiarchus virens* Cab. Orn. Not. p. 248. —

Nord-America — ♂, ♀ — 2 St.

237. 2. C. plebeius nov. sp.

Simillimus statura picturaque *C. virenti*, sed minor, ubique obscurius tinctus; supra sordide fuscescens, pileo, alis caudaque fuscis; subtus dilutior, obsolete fuscescente lavatus, gula, ventre medio crissoque vix pallidioribus. — Long. tot. 5″ 4‴, al. 3″, caud. 2″ 6‴, rostr. culm. 5‴, tars. 6‴, dig. med. exc. ung. 4‴. —

Mexico **) — ♂, ♀ — 2 St.

*) Von μυῖα (Fliege) und χαίνω (schnappen). Diese Gruppe enthält die tropischen Repräsentanten des nordamerikanischen Genus *Contopus*, mit gleichfalls kurzen Läufen, aber weniger kräftig entwickelter Flügel- und Schwanz-Bildung, weicherm, dunkler gefärbtem Gefieder u. s. w. — Ausser dem oben erwähnten Typus der Gattung gehören noch wahrscheinlich hierher:

2. *M. ardesiacus.* — *Tyrannula ardesiaca* Lafr. R. Z. 1844. p. 80. — *Myiobius ardesiacus* Gray Gen. B. I. p. 249. 43. — *Sayornis ardesiaca* Scl. B. Bogot. p. 21. 223. — *Contopus ardesiacus* Cab. Journ. Orn. 1855. p. 479 (Columbien);

3. *M. cineraceus.* — *Tyrannula cineracea* Lafr. R. Z. 1848. p. 8. — *Myiobius cineraceus* Gray Gen. B III. App. p. 11. — *Sayornis cineracea* Scl. P. Z. S. 9 Nov. 1858. no. 53 (Ecuador). —

**) Das berliner Museum besitzt ein Exemplar dieser anscheinend noch unbeschriebenen Art aus Costa Rica. —

238. 3. C. pertinax Nob.

Muscicapa pertinax Licht. in Mus. Berol. —
Supra griseo - olivaceus, pileo obscuriore, alis caudaque emarginata fuscescentibus, remigibus secundariis tectricibusque pallide tantum grisescente, rectricibus remigibusque primariis minime marginatis; subtus sordide olivaceo-grisescens, gula pallidiore, abdomine medio flavescente; rostro depresso, apice subuncinato, maxilla fusca, mandibula flavescente. — Long. tot. 8″, al. 4″ 2‴, caud. 3″ 8‴, rostr. culm. 9‴, tars. 8‴, dig. med. exc. ung. 5‴. —
Xalapa — ♂, ♀ — 2 St.

239. 4. C. Cooperi Cab.

Journ. Orn. 1855. p. 479. — *Muscicapa Cooperi* Natt. Man. I. p. 282. — Aud. B. N.-Am. II. p. 422. 179. — *Tyrannus borealis* Sws. & Rich. Faun. Bor. Am. II. p. 141. t. 35. — *Tyrannus Cooperi* Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 24. 152. — *Myiobius Cooperi* Gray Gen. B. I. p. 248. 3. — *Tyrannula Cooperi* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Contopus borealis* Scl. P. Z. 1858. p. 301. 49. — Id. l. l. 1859. p. 43. — Id. Ibis 1859. p. 122. 150. — *Muscicapa villica* Licht. in Mus. Berol. —
Nord-America — ♂ — 1 St.

Gen. MYIARCHUS Cab. 1844. — Fliegenjäger.

Onychopterus *) Rchb. 1850. *Despotina* Kaup 1851. *Kaupornis* *) (!) Bp. 1854.

240. 1. M. Swainsoni **) Nob.

Suiriri pardo amarillo menor Azar. Apunt. no. 193. — *Tyrannus ferox* Sws. (nec Vieill.) Quart. Journ. XX. p. 276. 12. — Orb. & Lafr. Syn. p. 43. 4. — Orb. Voy. p. 306. 205. — *Muscicapa ferox* Wied (nec Gm.) Beitr. III. p. 855. — *Myiarchus ferox* Burm. (nec Cab.) Th. Bras. II. p. 470. —
Brasilien — ♂ — 2 St.

*) Wir halten die von Reichenbach vorgenommene generische Trennung des *Tyrannus tuberculifer* Orb. & Lafr. ebenso wenig für gerechtfertigt, als die Aufstellung der Gattung *Kaupornis* (!) für den *Myiobius stolidus* Gosse. —

**) Der Schnabel ist hier schwächer und gestreckter, als bei *M. ferox*, die Färbung des Rückens olivenbräunlich, die der Haube nur wenig dunkler, während bei *M. ferox* der Rücken dunkel olivengrün und die Haube mehr schwärzlich erscheint. —

241. 2. C. ferox Cab.

Orn. Not. p. 248. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 700. 153. — ?*) Id. Tsch. Consp. p. 13. 64. — ?Id. Faun. Per. p. 153. — ?*) Scl. B. Bogot. p. 22. 226.— *Muscicapa ferox* Gm. S. N. p. 934. 32. — *Tyrannus ferox* Vieill. Enc. p. 848. — *Tyrannula ferox* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Myiobius ferox* Gray Gen. B. I. p. 248. 4. —

Venezuela — ♀ — 1 St.

242. 3. M. rufomarginatus nov. sp.

Supra rufescente-olivaceus, pileo magis brunnescente, uropygio rufescente, alis caudaque fuscis, remigibus rectricibusque extus rufo-, intus rufescente-marginatis, tectricibus alaribus rufo-limbatis; subtus flavescens, gutture cinerascente, pectoris lateribus sordide olivascentibus; maxilla fusca, mandibula fuscescente. — Long. tot. 5″ 6‴, al. 3″, caud. 3″, rostr. culm. 8‴, tars. 9‴, dig. med. exc. ung. 5‴. —

Mexico — ♂, ♀ — 2 St.

243. 4. M. stolidus Cab.

Journ. Orn. 1855. p. 479. 71. — *Tyrannus Phoebe* Orb. Sagra (nec Lath.). — *Myiobius stolidus* Gosse B. Jam. p. 168. — *Tyrannula stolida* Kaup P. Z. S. 1851. p. 51. 5. — *Tyrannus Sagrae* Gundl. —

Cuba — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. MYIONAX **) nov. gen. — Despot.

244. 1. M. crinitus Nob

Muscicapa crinita Lin. S. N. p. 325. 6. — Wils. Am. Orn. II. p. 75. — Aud. B. N.-Am. II. p. 176. t. 129. — *Muscicapa ludoviciana* Gm. S. N. p. 934. 33. — *Tyrannus ludovicianus* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 75. t. 45. — *Tyrannus irritabilis* Id. Enc. p. 847. — *Tyrannus crinitus* Sws.

---

*) Ob die in Peru und Neu-Granada vorkommenden Vögel zu der nördlichen oder zu der südlichen Form gehören, vermögen wir nicht zu entscheiden, da uns noch keine Exemplare von der Westküste Südamerica's zu Gesicht gekommen sind. —

**) Von μυῖα (Fliege) und ἄναξ (Herrscher). Diese Gattung umfasst die grössern nördlichern Formen von *Myiarchus* mit weniger niedergedrücktem, an der Firste mehr gewölbtem Schnabel, kräftigerm Flügelbau und stärker entwickeltem, geradem, weniger abgerundetem Schwanze. — Auch gehört noch u. a. hierher:

3. *M. validus.* — *Myiarchus validus* Cab. Orn. Not. p. 351. — *Tyrannus crinitus* Gosse (nec Lin.) B. Jam. p. 186. — *Myiobius sp.* Gray Gen. B. III. App. p. 11. — *Pyrocephalus validus* Bp. Consp. I. p. 188. — *Tyrannula Gossii* Id. l. l. p. 189. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 53. 3 (Jamaica). —

Quart. Journ. XX. p. 271. 4. — Bp. B. Eur. & N.-Am. p. 25. 156. — Wied Journ. Orn. 1858. p. 182. — *Myiobius crinitus* Gray Gm. B. I. p. 249. 1. — *Tyrannula crinita* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 51. 2. — *Myiarchus crinitus* Cab. Journ. Orn. 1855. p. 479. 72. —

Nord-America — 2 ♂, ♀ — 3 St.

245. 2. M. mexicanus Nob.

Tyrannula mexicana Kaup P. Z. S. 1851. p. 51. 4. — *Tyrannula cinerascens* Lawr. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York 8 Sept. 1851. — *Myiarchus mexicanus* Baird Rep. p. 179. — *Myiarchus cinerascens* Scl. Ibis 1859. p. 121. 148. —

Mexico — ♂ — 1 St.

Gen. MYIODYNASTES *) Bp. 1854. — Flecken-Bentavi.

246. 1. M. solitarius Scl.

P. Z. S. 1859. p. 43. — *Suiriri chorreado todo* Azar. Apunt. no. 196. — *Tyrannus solitarius* Vieill. N. D. p. 88. Id. Enc. p. 853. — *Tyrannus audax* Sws. (nec Gm.) Quart. Journ. XX. p. 270. 3. — Wied Beitr. III. p. 889. — Orb. Voy. p. 305. 203. — *Tyrannula audax* Hartl. (nec Gm.) Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Scaphorhynchus audax* Tsch. (nec Cab.) Consp. p. 12. 59. — Id. Faun. Per. p. 149. — Hartl. Ind. Azar. p. 13. — Burm. Th. Bras. II. p. 459. —

Maior: supra nigro-fuscus, dorsi maculis sordide albescentibus, mastace nigricante, rectricibus supra fuscis tenuissime rufescente-marginatis, subtus fuscis marginibus pallidissime tantum rufescentibus, remigibus secundariis tectricibusque maioribus pallide albescentibus; subtus albidus, striis fuscis permultis latis. — Long. tot. 8″ 6‴, al. 4″ 6‴, caud. 3″ 6‴, rostr. culm. 10‴, tars. 8‴, dig. med. exc. ung. 5½‴. —

Brasilien — ♂ ad., 2 ♀ ad., ♀ juv. — 4 St.

247. 2. M. audax „Bp.“

Scl. P. Z. S. 1859. p. 43. — *Gobe-mouche tachetée de Cayenne* Buff. Pl. enl. 453. 2. — *Muscicapa audax* Gm. S. N. p. 934. 34. — *Tyrannus audax* Vieill. Enc. p. 846. — *Megarhynchus regius* Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 4. — Heine Journ. Orn. 1859. p. 341. 4. — *Scaphorhyn-*

*) Diese wegen ihres starken und breiten Schnabels früher zu *Scaphorhynchus* gestellte Form, wird sich besser als eigene Gattung an *Myionax* anschliessen. —

chus audax Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 699. 149. — Burm. Verz. Mus. Hal. p. 47. — *Megarhynchus audax* Heine Journ. Orn. 1859. p. 341. —

Minor: supra olivaceo - fuscus, dorsi maculis obsolete rufescentibus, mastace nullo, rectricibus supra subtusque fuscis utrinque latissime rufis, remigibus primariis tectricibusque minoribus late rufescente-, remigibus secundariis tectricibusque maioribus late albescente - marginatis; subtus albidus striis fuscis rarioribus angustioribus. — Long. tot. 8‴, al. 4″ 3‴, caud. 3″ 3‴, rostr. culm. 11‴, tars. 9‴, dig. med. exc. ung. $6^1/_2$‴. —

Cayenne *) — ♀ — 1 St.

248. 3. **M. luteiventer** Bp.

Compt. Rend. XXVIII. p. 659. — Id. Orn. Not. p. 87. — Scl. P. Z. S. 1859. p. 42. — Id. Ibis 1859. p. 120. 146. — *Tyrannus audax* Id. (nec Gm.) P. Z. S. 1856. p. 297. 16.— Similior praecedenti, quam *M. solitario*; maior: supra olivaceo - fuscus, dorsi maculis obsolete rufescentibus, mastace nigricante latissimo, rectricibus supra subtusque rufis, mediis circa rachidem latius, exteriorum rachidibus ipsis tantum nigricantibus, remigibus primariis tectricibusque minoribus late albescente - limbatis; subtus flavidus, striis fuscis rarioribus angustioribus. — Long. tot. 8″ 6‴, al. 4″ 6‴, caud. 3″ 6‴, rostr. culm. 9‴, tars. 10‴, dig. med. exc. ung. 7‴. —

Xalapa — 2 ♂ ad., ♂ juv., ♀ ad. — 4 St.

Gen. **Sirystes** **) nov. gen. — Pitador.

249. 1. **M. sibilator** ***) Nob.

Pitador Azar. Apunt. no. 191. — *Muscicapa sibilator* Vieill. N. D. XXI. p. 457. — Id. Enc. p. 831. — *Muscicapa sibilans* Licht. Doubl. p. 54. 556. — *Tyrannula sibilans* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — Id. Ind. Azar. p. 13. — Bp.

---

*) Exemplare aus Porto Cabello und Caracas scheinen zu der cayennischen Art zu gehören, während Santa Martha eine andere Art, den *M. nobilis* Scl., aufzuweisen hat. —

**) Σιρύστης = *sibilator*, von σιρίζω (zischen). Während bei dieser eigenthümlichen Form die mässig langen, unverengten Schwingen noch an die kleineren Arten von *Myiarchus* erinnern, deutet der weniger breit gedrückte, gewölbtere Schnabel schon mehr auf die echten Tyrannen hin. Characteristisch ist besonders für diese Gattung die haubenartige Verlängerung der Kopffedern. —

***) Nach Gray's Vorgang citiren sowohl Hartlaub als Bonaparte hierzu die *Tyrannula curtipes* Sws. (B. Braz. t. 54), welche indessen ganz entschieden mit unserm *Myiochanes cinereus* (*Platyrhynchus cinereus* Spix) identisch ist. —

Consp. I. p. 190. — *Myiobius sibilator* Gray Gen. B. I. p. 249. 24. — *Myiarchus sibilans* Burm. Th. Bras. II. p. 472. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. EMPIDONOMUS *) nov. gen. — Fleckentyrann.

Tyrannus Rchb. 1850 (nec Cuv. 1799-1800).

250. 1. E. varius Nob.

Suiriri chorreado debaxo Azar. Apunt. no. 187. — *Muscicapa varia* Vieill. N. D. XXI. p. 459. — Id. Enc. p. 832. — *Muscicapa rufina* Spix Av. Bras. II. p. p. 22. t. 31. — *Muscipeta ruficauda* Wied Beitr. III. p. 920. — *Tyrannus leucotis* Sws. Quart Journ. XX. p. 276. 11. — *Tyrannula Tschudii* Hartl. R. Z. 1844. p 369.—*Tyrannus rufinus* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 700. 152. — Scl. B. Bogot. p. 22. 233. — Burm. Th. Bras. II. p. 466. — *Myiobius leucotis* Gray Gen. B. I. p. 249. 19. — *Myiobius Tschudii* Id. l. l. p. 249. 44. — *Myiobius rufinus* Id. l. l. p. 249. 78. — *Tityra ruficauda* Id. l. l. p. 254. 43. — *Myiobius varius* Id. l. l. III. App. p. 11. — *Muscicapa dux* Licht. in Mus. Berol. —

Rio Grande — ♂, ♀; Brasilien — ♀ — 3 St.

Gen. LAPHYCTES **) Rchb. 1850. — Satrap.

Satellus (!) Rchb. 1850. *Tyrannus* Burm. 1850 (nec Cuv. 1799-1800).

251. 1. L. melancholicus Nob.

Suiriri guazu Azar. Apunt. no. 198. — *Tyrannus melancholicus* Vieill. N. D. XXXV. p. 48. — Id. Enc. p. 851. — Orb. & Lafr. Syn. p. 44. 11. — Orb. Voy. p. 311. 212. — Tsch. Consp. p. 12. 61. — Id. Faun. Per. p. 131. — Burm. Th. Bras. II. p. 464. — *Muscicapa despotes* Licht. Doubl. p. 55. 567a. — *Muscicapa furcata* Spix Av. Bras. II. p. 15. t. 19. — *Tyrannus furcatus* Wied Beitr. III. p. 884. —

*) Von ἐμπίς (Mücke) und νέμω (herrschen). Diese Gruppe, welche sich deutlich durch den kleinen Schnabel und die eigenthümliche, an *Myiodynastes* erinnernde Fleckenzeichnung von den eigentlichen typischen Tyrannen absondert, hat schon Reichenbach von derselben unter den ihr nicht gebührenden Namen *Tyrannus* generisch getrennt. —

**) Wir halten die von Reichenbach vorgenommene, nur auf die stärkere oder geringere Gabelung des Schwanzes gegründete generische Trennung der *Muscicapa satelles* und *M. despotes* Licht., dadurch allein noch nicht für hinlänglich gerechtfertigt. —

Tyrannus crudelis Sws. Quart. Journ. XX. p. 275. 10. — *Tyrannus albogularis* *) Burm. Th. Bras. II. p. 465. —
Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

252. 2. L. satrapa **) Nob.

Tyrannus melancholicus Cab. (nec Vieill.) Schomb. Reis. Guian. III. p. 700. 151. — Scl. P. Togot. p. 22. 231. — Id. P. Z. S. 1856. p. 297. 115. — Id. Ibis 1859. p. 121. 143. — *Muscicapa satrapa* Licht. in Mus. Berol. —
Guiana — ♂ ad.; Caracas — ♀ juv. — 2 St.

253. 3. L. apolites ***) nov. sp.

Supra plumis dorsalibus fuscis late olivascente - griseo - limbatis, itaque dorso quasi obsolete maculato; capite cinereo, pilei plumis basi splendide luteis, apice nigris, loris striaque postoculari nigrescentibus; alis caudaque fuscis, remigibus primariis minime, secundariis tectricibusque alaribus albescente-, rectricibus extus anguste rufescente - marginatis, tectricibus caudae superioribus fuscis latius rufescente - limbatis; subtus gula cinerascente, pectore abdomineque sulphurescentibus, illo densissime cinerascente-adsperso; rostro nigro; pedibus fuscis. — Long. tot. 7″ 6‴, al. 4″, caud. 3″ 8‴, rostr. culm. 8‴, tars. 7‴, dig. med. exc. ung. 6‴. —
? — ♂ — 1 St.

254. 4. L. vociferans ****) Nob.

Tyrannus vociferans Sws. Quart. Journ. XX. p. 273. 7. —

---

*) Im berliner Museum befindet sich eine ganze Reihe brasilianischer *Tyrannus melancholicus*, welche deutlich den allmähligen Uebergang von dem hellen *Tyrannus albogularis* Burm. zu den dunklern gewöhnlichern Exemplaren dieses Vogels zeigen. —

**) Lichtenstein hat die mexicanischen Exemplare dieser Art im berliner Museum als *Muscicapa satrapa* von den brasilianischen specifisch getrennt. Dieselben sind auch in der That grösser, haben einen weniger stark gegabelten Schwanz u. s. w., will man indessen hier zwei climatische Abarten unterscheiden, so wird man auch die an der Nordküste Südamerica's vorkommenden Vögel zu der nördlichen Varietät rechnen müssen. —

***) Ein ganz typischer *Laphyctes* mit stark gegabeltem Schwanze und der characteristischen Verengung der Spitzen der 5 ersten Handschwingen; kleiner als *L. melancholicus* und *L. satrapa*, mithin die kleinste bekannte Art der Gattung, die sich durch den schwächern und kürzern Schnabel, die dunkle Einfassung der lebhaft dottergelben Krone, den dunklern, eigenthümlich fleckig erscheinenden Rücken und die hellere mattschwefelgelbliche Färbung der Unterseite auszeichnet. Leider ist uns das einzige Exemplar ohne alle Angabe des Vaterlandes zugekommen. —

****) Noch gehört hierher der mehr nördliche, dem *L. vociferans* sehr nahe verwandte und desshalb lange Zeit mit ihm identificirte:

5. *L. verticalis.* — *Tyrannus verticalis* Say Long's Exped. II. p. 60. —

Id. Syn. B. Mexic. p. 368. 25. — Scl. Ibis 1859. p. 121. 142. — *Tyrannus Cassinii* Lawr. Ann. Lyc. Nat. Hist. New-York 3 June 1850. Descript. new spec. gen. Tyrann. t. 3. 2. — *Muscicapa satelles* Licht. in Mus. Berol. —
Mexico — ♂ — 1 St.

Gen. MILVULUS Sws. 1827. — Gabeltyrann.

Tyrannus Vieill. 1807 (nec Cuv. 1799-1800). *Muscivora* Gray 1840 (nec Cuv. 1799-1800). *Despotes* Rchb. 1850 & Bp. 1853.

255. 1. M. violentus Bp.

Consp. I. p. 191. — *Tixereta* Azar. Apunt. no. 190 (♂ ad.). — *Suiriri pardo y blanco* Id. l. l. no. 192 (♀ jun.).— *Muscicapa phaenoleuca* Id. N. D. XXI. p. 448.— Id. Enc. p. 824 (♀ juv.). — *Tyrannus violentus* Vieill. N. D. XXXV. p. 89.— Id. Enc. p. 853 (♂ ad.).— Burm. Th. Bras. II. p. 467. — *Tyrannus nunciolus* Steph. — *Muscicapa tyrannus* Wied (nec Lin.) Beitr. III. p. 834. — *Tyrannus savana* Sws. (nec Vieill.) Quart. Journ. XX. p. 282. 17.— Orb. & Lafr. Syn. no. 10. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 49. — Id. Ind. Azar. p. 12. — *Tyrannus tyrannus* (!) Orb. Voy. p. 310. 211. — *Milvulus tyrannus* Burm. (nec Bp.) Verz. Mus. Hal. p. 46.—
Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

257. 2. M. tyrannus Bp.

B. Eur. & N.-Am. p. 25. 158. — Aud. Syn. B. N.-Am. p. 38. 52. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 699. 150. — Scl. B. Bogot. p. 22. 228. — Id. P. Z. S. 1856. p. 297. 114. — *Tyrannus cauda bifurca* Briss. Av. II. p. 395. t. 39. 3. — *Muscicapa tyrannus* Lin. S. N. p. 325. 4. — *Savana ou Tyran à queue fourchue* Buff. Pl. enl. 571. 2.— *Tyrannus savana* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 72. t. 43. — Id. Enc. p. 853. — *Muscicapa savana* Bp. Am. Orn. I. p. 1. — Nutt. Man. I. p. 274. — Aud. B. N.-Am. II. p. 387. t. 168. — *Tyrannus (Milvulus) monachus* *) Hartl.

Muscicapa verticalis Bp. Am. Orn. I. p. 18.— Nutt. Man. I. p. 273.— Aud. B. N.-Am. IV. p. 422. t. 359. 1-2 (Nord-America).

Derselbe unterscheidet sich, wie bereits Lawrence a. a. O. bei der Beschreibung seines mit *L. vociferans* identischen *Tyrannus Cassinii* richtig hervorgehoben hat, vorzüglich durch merklich geringere Grösse, weit hellere Färbung, schwächern Schnabel und die weisse, bei *L. vociferans* wie der übrige Schwanz grau gefärbte Aussenfahne der jederseits äussersten Steuerfeder.

*) Will man hier, da die brasilianischen Exemplare dieses Vogels u. a. eine weit dunklere Rückenfärbung zeigen u. s. w., zwei climatische Rassen annehmen, so

R. Z. 1844. p. 214. 3. — *Tyrannus monachus* Id. Verz. Mus. Brem. p. 49. — *Despotes tyrannus* Bp. Not. Orn. p. 87. — *Milvulus monachus* Gray Gen. B. I. p. 248. 5. — Scl. Ibis 1859. p. 121. 144. —

Surinam — ♂ ad.; Venezuela — ♂ ad., ♀ ad., ♂ juv., variet. albesc. — 5 St.

257. 3. M. forficatus Sws.

Class. B. II. p. 225. — Aud. Syn. B. N.-Am. p. 38. 53. — Bp. Not. Orn. p. 87. — Scl. Ibis 1859. p. 121. 145. — *Moucherolle à queue fourchue de Mexique* Bnff. Pl. enl. 677. — *Muscicapa forficata* Gm. S. N. p. 931. 22. — Bp. Am. Orn. I. p. 15. — Nutt. Man. I. p. 275. — Aud. B. N.-Am. IV. p. 426. t. 359. 3. — *Tyrannus mexicanus* Steph. — *Tyrannus forficatus* Temm. Tabl. méth. p. 24. — *Muscicapa spectabilis* Licht. in Mus. Berol. —

Mexico — ♂ — 1 St.

Gen. TYRANNUS Cuv. 1799-1800. — Tyrann.

Drymonax Glog. 1827. *Tyrannus* Sws. 1827. *Myiarchus* Burm. 1850 (nec Cab. 1844). ?*Dioctes**) Rchb. 1850.

258. 1. T. carolinensis Temm.

Tabl. méth. p. 24. — *Muscicapa corona rubra* Catesb. Carolin. I. p. 55. t. 55. — *Lanius tyrannus* Lin. S. N. ed. X. no. 4. — Id. S. N. ed. XII. p. 136. 13. — *Tyrannus* Briss. Av. II. p. 391. — *Gobe-mouche de la Caroline* Bnff. Pl. enl. 676. — *Lanius tyrannus var. carolinensis* Gm. S. N. p. 302. 13. var. γ. — *Tyrannus pipiri* Vieill. Ois. Am. Sept. p. 73. t. 44. — Cab. Journ. Orn. 1855. p. 478. 67. — *Muscicapa tyrannus* Wils. (nec Lin.) Am. Orn. I. p. 66. t. 13. 1. — Nutt. Man. I. p. 265. — Aud. B. N.-Am. I. p. 403. t. 79. — *Tyrannus intrepidus* Vieill. Enc. p. 849. — Id. Gal. Ois. II. p. 214. t. 133. — Sws. Quart.

---

darf nur die nördliche derselben als die eigentliche *Muscicapa tyrannus* Linné's betrachtet werden, während der südlichen der vieillot'sche auf Azara's *Tixereta* gegründete Namen *Tyrannus violentus* verbleiben muss. Somit würde also Hartlaub's *Tyrannus monachus*, wie auch bereits von Bonaparte im Conspectus a. a. O. richtig geschehen ist, jedenfalls nur als Synonym zu der nördlichen Art *Milvulus tyrannus* Bp. gestellt werden dürfen. —

*) Gray citirt in seiner „List of Genera and Subgenera of Birds" zu dieser ohne Angabe des Typus publicirten Gattung Reichenbach's als Typus den *Dioctes pyrrholaemus* Rchb. eine, so viel wir wissen, bisjetzt unpublicirt gebliebene Art; indessen wird dieser, nach der Abbildung von Kopf, Flügel und Schwanz zu urtheilen, jedenfalls ein ganz echter *Tyrannus* sein. —

Journ. XX. p. 274. 8. — *Muscicapa animosa* Licht. Doubl. p. 54. 558. — *Myiarchus* (!) *intrepidus* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 46. —
Nord-America — 3 ♂, ♀ — 4 St.

259. 2. T. caudifasciatus Orb.

Voy. Cub. t. 12. — Gosse B. Jamaic. p. 177. — Id. Ill. Jam. t. 44. — Cab. Journ. Orn. 1855. p. 478. 68. —
Cuba — ♀ — 1 St.

Gen. MELITTARCHUS *) Cab. 1855. — Dictator.

260. 1. M. magnirostris Cab.

Journ. Orn. 1855. p. 477. 65. — *Tyrannus matutinus* pt. Vieill. Enc. p. 850. — *Tyrannus magnirostris* Orb. Voy. Cub. t. 13. — *Muscicapa dictator* Licht. in Mus. Berol. —
Cuba — ♂ — 1 St.

---

*) Zu dieser Gattung sind noch zu stellen:

2. *M. crassirostris* Cab. Journ. Orn. 1855. p. 478. — *Tyrannus crassirostris* Sws. Quart. Journ. XX. p. 278. 6. — Id. Syn. B. Mexic. p. 368. 24. — *Muscicapa gnatho* Licht. in Mus. Berol. (Mexico);
3. *M. dominicensis* Cab. Journ. Orn. 1855. p. 478. — *Tyrannus dominicensis* Briss. Av. II. p. 394. 19. t. 18. 2. — *Tyran tiriri* Buff. Pl. enl. 537. — *Lanius tyrannus var. dominicensis* Gm. S. N. p. 302. 13. var. β. — *Tyrannus griseus* Vieill. Ois. Am. Sept. I. p. 76. t. 46. — Sws. Quart. Journ. XX. p. 274. 8. — *Tyrannus matutinus* pt. Vieill. Enc. p. 850. — *Tyrannus tiriri* Temm. Tabl. méth. p. 24. — *Muscicapa dominicensis* Aud. B. N.-Am. II. p. 392. t. 172. — *Tyrannus matutinus* Orb. Voy. Cub. t. 14. — *Tyrannus matutinus* ♂ *griseus* Gray Gen. B. I. p. 247. 2-3 (Haiti & Cuba). —

Fam. AMPELIDÆ. Schmuckvögel.

Subfam. PSARINÆ. Becarden.

Gen. TITYRA Vieill. 1816. — Becarde.

?*Becardia* (!) Rafinq. 1815. *Psaris* Cuv. 1817. *Pachyrhynchus* Wagl. 1822.

261. 1. T. cayana Jard. & Selby

Ill. Orn. I. Syn. no. 1. — Cab. Orn. Not. p. 238. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 697. 144. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 353. 1. — Scl. B. Bogot. p. 22. 237. — Id. P. Z. S. 28 Apr. 1857. Rev. S.-Amer. Subfam. Tityr. p. 5. 1. — *Lanius cayanus* Lin. S. N. p. 137. 20. — Licht. Doubl. p. 50. 528-529 (♂ & ♀). — Burm. Th. Bras. II. p. 457. Anm. 1. — *Pie-grièche grise de Cayenne* Buff. Pl. enl. 304 (♂). — *Pie-grièche tachetée de Cayenne* Id. l. l. 377 (♀). — *Lanius cayanus var. naevius* Gm. S. N. p. 304. 20. var. β (♀). — *Pachyrhynchus melanocephalus* „Wagl." Hahn Abbild. u. Beschreib. ausländ. Vög. Lief. 13. t. 6 (♀). — *Tityra cinerea* Vieill. Enc. p. 859. 1. — Id. Gal. Ois. II. p. 217. t. 134. — *Megarhynchus cayanus* var. α. Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 6. — Heine Journ. Orn. 1859. p. 343. 6. — *Psaris cayanus* „Cuv." Less. Trait. p. 378. 1. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. App. no. 1. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 46. 8. — *Psaris naevius* Less. Trait. p. 379. 4 (♀). — *Psaris virgata* „H. Smith" Griff. Anim. Kingd. VI. p. 488 (♀). — *Psaris cayanensis* Sws. Class. B. II. p. 255. — *Psaris guianensis* Id. Two Cent. p. 286. 17. — *Tityra cayana & guianensis* Gray Gen. B. I. p. 253. 1 & 4. —

Cayenne — 2 ♂ ad.; Surinam ♂ ad., 2 ♂ jun.; Guiana — ♂ ad., ♀ ad. — 7 St.

262. 2. T. intermedia *) nov. sp.

?*Pachyrhynchus cayanus* Spix (nec Lin.) Av. Bras. II. p. 32. 2. t. 44. 1. —

Media quasi inter *T. cayanam* et *T. brasiliensem*, si-

*) Diese neue Art kommt der *Tityra cayana* äusserst nahe, stammt aber aus Nord-Brasilien und steht so gleichsam nicht nur in der Färbung, sondern auch geo-

milior vero *T. cayanae*, a qua differt rostro latiore, pallidiore, apice minus nigrescente, plumis circa rostri basin albis, pileo feminae sicut in *T. brasiliensis* feminis nigro albidostriato. — Long. tot. 8″ 6‴, al. 4″ 6‴, caud. 2″ 9‴, rostr. culm. 1″, tars. 11‴, dig. med. exc. ung. 7‴. —

Para — ♀ — 1 St.

263. 3. T. brasiliensis Gray

Gen. B. I. p. 253. 4. — Cab. Orn. Not. p. 239. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 353. 2. — Scl. Rev. Tityr. p. 6. 2. — *Caracterizado blanco cabos negros* Azar. Apunt. no. 207. — *Megarhynchus cayanus* var. β. Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 6. — Heine Journ. Orn. 1859. p. 343. 6 (♂). — *Megarhynchus striatus* Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 7. — Heine Journ. Orn. 1859. p. 343. 7 (♀). — *Psaris brasiliensis* Sws. Two Cent. p. 286. 18. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 46. 9. — Burm. Th. Bras. II. p. 457. — *Psaris cayanus* Orb. & Lafr. (nec Cuv.) Syn. p. 41. 1. — Orb. Voy. p. 301. 197. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — Id. Ind. Azar. p. 14. — *Psaris cayanus var. brasiliensis* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 48. — *Psaris maximus* Kaup P. Z. S. 1851. p. 46. 11. —

Brasilien — 5 ♂, 3 ♀ — 8 St.

---

graphisch zwischen dieser und der *T. brasiliensis* in der Mitte. Leider sind uns bis jetzt nur Weibchen zu Gesicht gekommen, und können wir desshalb diese Art nur nach dem uns vorliegenden und einem 2ten ebenfalls weiblichen Exemplare des berliner Museums aus Para beschreiben. Dieselben unterscheiden sich von den Weibchen der *T. cayana* hauptsächlich durch folgende Kennzeichen: der Schnabel ist breiter geformt und besonders an der Spitzenhälfte viel weniger zusammengedrückt, auch ist er überhaupt weit heller gefärbt, die dunkle Färbung ist vorzüglich auf dem Unterschnabel noch mehr nach der Spitze hingedrängt, lässt aber diese selbst wieder hell, so dass man die Schnabelfärbung fast mit der von *T. semifasciata* oder *T. personata* vergleichen könnte. Ferner sind die Federn der Stirn besonders über den Nasenlöchern und dicht um die Schnabelwurzel weisslich, nicht schwarz, und ebenso ist die Gegend des Bartstreifes heller, weisslicher und mit weniger Schwarz untermischt. Die Federn der Haube sind am Grunde und an den Rändern weisslich, wodurch dieselben gleichsam wie bei dem Weibchen von *T. brasiliensis* gestrichelt erscheint, während alle uns bekannten Weibchen von *T. cayana* stets einen einfarbig schwarze ungestreifte Haube zeigen. — Wir vermuthen, dass der soeben beschriebene Vogel das Weibchen des *Pachyrhynchus cayanus* Spix ist, doch wagen wir dieses nicht zu entscheiden, da wir, wie gesagt, noch keine Männchen unserer *T. intermedia* gesehen haben, der Fundort scheint für diese Annahme zu sprechen. Spix's Männchen seines *P. cayanus* ist noch kein alter Vogel, denn es heisst von ihm: *„remige primaria secunda nec tenui, nec falcata“* d. h. ohne verkümmerte zweite Handschwinge. Der Kopf kann desshalb noch nicht ganz einfarbig schwarz sein, sondern Spix sagt nur: *„Caput maris nigrum, plumis basi plumbeis, feminae plumbescens nigro striatum“*. Die Beschreibung, welche er vom Schnabel giebt, stimmt ebenfalls vortrefflich auf unsern Vogel, nämlich: *„Rostrum maxime crassum, basi subtusque albescens; apice nigro fasciatum.“* —

264. 4. T. semifasciata Cab.

Orn. Not. p. 239. — Bp. Consp. p. 180. gen. 353. 3. — Scl. Rev. Tityr. p. 6. 3. — *Pachyrhynchus semifasciatus* Spix Av. Bras. II. p. 32. 3. t. 44. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 457. Anm. 2. — *Psaris semifasciatus* Jard. & Selby Ill. Orn. IV. Syn. no. 3. — Orb. & Lafr. Syn. p. 41. 2. — Orb. Voy. p. 301. 198. — Tsch. Consp. p. 12. 58. — Id. Faun. Per. p. 146. —

Para — ♀ — 1 St.

265. 5. T. personata Jard. & Selby

Ill. Orn. I. t. 24. — Scl. Rev. Tityr. p. 6. 4. — Id. Ibis 1859. p. 124. 166. — *Psaris mexicanus* Less. R. Z. 1839. p. 41. — *Psaris tityroides* Id. l. l. 1842. p. 210. — *Tityra personata & tityroides* Gray Gen. B. I. p. 243. 6 & 254. 38. — *Tityra mexicana* Scl. P. Z. S. 1856. p. 41. 23. — Id. l. l. p. 297. 119. —

Xalapa — ♂, ♀; Columbien *) — ♂, ♀ — 4 St.

Gen. EXETASTES Bp. 1854. — Späh-Becarde.

Erator (!?) Kaup 1851. *Exetastus* (!) Bp. 1854.

266. 1. E. albinuchus **) nov. sp.

Similis insequenti, sed minor, rostro breviore angustiore; pileo minus longo, non tam alte, in cervicem descendente, occipite regioneque tota inter strias auriculares nigras albis. — Long. tot. 7″, al. 3″ 10‴, caud. 3″, rostr. culm. 10‴, rostr. latit. 4″ 8‴, pilei longit. 1″ 4‴. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

---

*) Diese beiden auf dem Wege des Naturalienhandels angeblich aus Columbien, also aus einer Gegend, woher, so viel wir wissen, bisher noch keine Exemplare dieser Art kamen, erhaltenen Vögel zeigen bei merklich kleinern Dimensionen in allen Körperverhältnissen einen weit kleinern, gestrecktern, schmälern Schnabel mit viel stärker entwickelten Haken als die nördlichen grössern Bälge. Eine Vergleichung ihrer Maassen wird dazu dienen, diesen Unterschied zu veranschaulichen. Die beiden uns vorliegenden Exemplare aus Xalapa messen: G. L. 9″, Fl. 5″, Schwz. 3″ 3‴, Schnabelf. 1″, 1‴, Schnabelhöhe $6^1/_2$‴, Lauf 1″; während bei den columbischen die G. L. 8″ 4‴, Fl. 4″ 3‴, Schwz. 2″ 9‴, Schnabelf. 11‴, Schnabelhöhe 4‴, Lauf 10‴ beträgt. —

**) Diese neue bisher, wie es scheint, meistens mit der folgenden identificirte Art unterscheidet sich von derselben auf den ersten Blick durch die beträchtlich kürzere Kappe, welche fast das ganze Hinterhaupt weiss lässt, so dass nur in der Ohrgegend für einen schmalen schwarzen etwas weiter sich auf den Nacken erstreckenden Ohrenstreif Raum bleibt. Ausserdem scheint auch *E. albinuchus* etwas kleiner und schmalschnäbliger zu sein als *E. inquisitor*. — Wir messen an mehreren Exemplaren des Letztern G. L. 7″ 6‴, Fl. 4″ 5‴, Schwanz 3″, Schnabelf. 1″, Schnabelbr. 5‴, Lauf 9‴, Länge der Haube 1″ 9‴. —

267. ♀. E. inquisitor Nob.

Lanius inquisitor „Olf.“ Licht. Doubl. p. 50. 530—531 (♂ & ♀). — *Megarhynchus cayanus var. γ & δ* Thunb. Dissert. p. Schaerstr. 1824. no. 6. — Heine Journ. Orn. 1859. p. 343. 6 (♂ & ♀). — *Psaris erythrogenys* Selby Z. Journ. II. p. 483. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. App. no. 2. — Sws. Flycatch. p. 82. t. 3. — Less. Trait. p. 379. 2 (♀). — *Tityra erythrogenys* Jard. & Selby Ill. Orn. I. Syn. no. 2 (♀). — *Psaris Jardinii* Sws. Z. Ill. II. t. 35. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. App. no. 4 (♂ juv.). — *Psaris Natterii* Sws. Two Cent. p. 286. 19 (♂ jun.). — *Psaris Selbii* Id. l. l. p. 286. 20. — Jard. & Selby Ill. Orn. App. no. 5 (♂ ad.) — *Psaris inquisitor* Orb. & Lafr. Syn. p. 41. 3. — Orb. Voy. p. 302. 199. — Kaup P. Z. S. 1851. p. 47. 12. — Burm. Th. Bras. II. p. 456. — *Tityra inquisitrix, Nattererii, Jardinii & Selbii* Gray Gen. B. I. p. 353. 2, 5, 7 & 8. — *Tityra inquisitrix* Cab. Orn. Not. p. 239. — Bp. Consp. I. p. 180. gen. 353. 4. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 4. 30. — Id. Rev. Tityr. p. 7. 5. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ juv., 3 ♀; Para — ♀; Angostura ♂ jun. — 7 St.

268. ♂. E. albitorques Nob.

Tityra albitorques Dubus Bull. Acad. Brux. 1847. XIV. 2. p. 104.* — Id. R. Z. 1848. p. 244. — Gray Gen. B. III. App. p. 11. — Scl. B. Bogot. p. 22. 238. — Id. Rev. Tityr. p. 7. 6. — *Psaris Fraserii* Kaup P. Z. S. 1851. p. 47. 13. t. 37—38. —

Peru — ♂ ad. — 1 St.

Gen. HADROSTOMUS *) Nob. — Mittel-Becarde.

Pachyrhamphus Kaup 1851 (nec Gray 1833). *Platypsaris* (!) Scl. 1857 (nec Bp. 1854).

---

*) Von ἀδρός (dick, gedrungen) und στόμα (Mund, Schnabel). — Die hierher gehörigen Arten bilden in Grösse und Gestalt gleichsam ein Bindeglied zwischen den grossen *Tityrae* und den kleinen *Pachyrhamphi*. Der Schnabel erscheint bei ihnen noch weniger breit und plattgedrückt, als bei der folgenden Gruppe, während sie sich derselben durch die schon breitere verkümmerte 2te Handschwinge und die verschiedene Färbung der beiden Geschlechter mehr zu nähern beginnen; das Gefieder ist bei sämmtlichen Arten ohne helle Farbenzeichnung an Flügel und Schwanz, dunkelschwarz oder grün bei den Männchen, vorherrschend rothbraun bei den Weibchen. Sclater vermuthet, dass *Platypsaris (!) latirostris* Bp. als Typus dieser Gruppe anzunehmen sei; wir möchten indessen diese Vermuthung nicht theilen, da gerade diese Arten Nichts weniger als einen platten Schnabel zeigen, den Bonaparte sowohl durch den Genus-, als durch den Species-Namen als charakteristisch bezeichnen zu wollen scheint. —

269. 1. H. atricapillus Nob.

Caracterizado canela y cabeza negra Azar. Apunt. no. 209 (♂). — *Caracterizado canela corona de pizarra* Id. I. I. no. 208 (♀). — *Tityra atricapilla* Vieill. N. D. III. p. 348. — Id. Enc. p. 859. 3 (♂). — *Tityra rufa* Id. N. D. III. p. 347. — Id. Enc. p. 859. 2 (♀). — *Lanius validus* Licht. Doubl. p. 50. 534—535 (♂ ad. & jun.). — *Pachyrhynchus cinerascens* Spix Av. Bras. II. p. 34. t. 46. 1 (♂ jun.). — *Psaris cristatus* Sws. Z. Journ. II. p. 355. — Id. Z. Ill. II. t. 41. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. App. no. 6 (♂ ad.). — *Tityra cristata* Iid. I. I. I. Syn. no. 3 (♂ ad.). — *Tityra pileata* Iid. I. I. I. Syn. no. 4. t. 17 (♀). — *Pachyrhynchus pileatus* Iid. I. I. II. App. no. 5 (♀). — *Psaris strigatus* Sws. Two Cent. p. 287. 21 (♂ juv.). — *Pachyrhynchus megacephalus* Id. I. I. p. 287. 2 (♂ juv.). — *Psaris atricapillus* Orb. & Lafr. Syn. p. 42. 4. — *Psaris roseicollis fem. & juv.* Orb. Voy. p. 302. 200 (♂ & ♀). — *Psaris affinis* Less. R. Z. 1840 p. 354 (♂). — *Pachyrhamphus cristatus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50. — *Psaris validus* Id. Ind. Azar. p. 14. — Kaup P. Z. S. 1851. 46. 4 — *Tityra strigata, cristata, cinerascens, pileata, rufa, megacephala & affinis* Gray Gen. B. I. p. 253—254. 9, 10, 11, 17, 22, 24 & 27. — *Pachyrhamphus validus* Cab. Orn. Not. p. 240. — Bp. Consp. I. p. 180. gen. 354. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 455. — Scl. Rev. Tityr. p. 8. 2. — *Lanius rufescens* Licht. in Mus. Berol. (♀). —

Brasilien — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 5 St.

270. 2. H. Aglaiae *) Nob.

Pachyrhynchus Aglaiae Lafr. R. Z. 1839. p. 98. — *Tityra*

*) In Südamerica wird diese Art von zwei andern vertreten, nämlich von dem bolivianischen *H. roseicollis* und dem columbischen und cayennensischen *H. minor*, deren Synonymie nach Sclater folgendermassen zu ordnen sein wird:

3. *H. roseicollis.* — *Psaris roseicollis* Orb. & Lafr. Syn. p. 42. 5. — *Psaris roseicollis mas* Orb. Voy. p. 302. 200. — *Pachyrhamphus roseicollis* Scl. Rev. Tityr. p. 9. 4 (Bolivien);

4. *H. minor.* — *Querula minor* Less. Trait. p. 363. 4 (*mas jun.*). — *Psaris roseicollis* Jard. & Selby (nec Orb. & Lafr.) Ill. Orn. IV. t. 28 (*mas*). — *Pachyrhamphus pectoralis* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 51. — Scl. B. Bogot. Add. II. p. 4. 31. — *Pachyrhamphus pectoralis* Sws. Two Cent. p. 288. 25 (*mas jun.*). — Id. Rev. Tityr. p. 9. 3. — *Tityra pectoralis* Gray Gen. B. I. p. 254. 29. — *Pachyrhamphus minor pt.* Cab. Orn. Not. p. 241. — Bp. Consp. I. p. 180. gen. 354. 3. — *Psaris pectoralis* Kaup P. Z. S. 1851. p. 46. 6 (Cayenne, Neugranada u. s. w.). —

Ausserdem wird noch am besten zu dieser Gattung zu stellen sein:

5. *H. niger.* — *Lanius niger* Gm. S. N. p. 301. 30. — *Pachyrhynchus aterrimus* Lafr. R. Z. 1846. p. 320. — *Tityra leuconotus* Gray Gen. B. I. p. 36. — Gosse B. Jamaic. p. 187. — *Pachyrhamphus nigrescens* Cab. Orn. Not. p. 241. — Bp. Consp. I. p. 180. gen. 354. 2. — *Tityra nigra* Gray Gen. B. III. App. p. 11. — *Pachyrhamphus niger* Scl. Rev. Tityr. p. 8. 1. (Jamaica). —

Aglaiae Gray Gen. B. I. p. 254. 30. — *Pachyrhynchus minor* Burm. (nec Less) Verz. Mus. Hal. p. 47.— *Psaris Aglaiae* Kaup P. Z. S. 1851. p. 46. 7. — *Pachyrhamphus Aglaiae* Scl. P. Z. S. 1856. p. 297. 120. — Id. Rev. Tityr. p. 10. 5. — Id. Ibis 1859. p. 124. 167. — *Lanius rhodosternus* ♀ *cinnamomeus* Licht. in Mus. Berol. (♂ & ♀). —

Xalapa — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

Gen. PACHYRHAMPHUS Gray 1838. — Kappen-Becarde.

Pachyrhynchus Sws. 1837 (nec Wagl. 1822). *Chloropsaris* Kaup 1851.

271. 1. P. viridis Scl.

Rev. Tityr. p. 11. 8. — *Characterizado verde y corona negra* Azar. Apunt. no. 210 (♂). — *Tityra viridis* Vieill. N. D. III. p. 348. — Id. Enc. p. 860. 4. (♂). — *Psaris Cuvieri* Sws. Z. Ill. I. t. 32 (♂). — Kaup P. Z. S. 1851. p. 45. 1. — *Platyrhynchus Dupontii* Vieill. Enc. p. 843. 30 (♂). — *Muscicapa nigriceps* Licht. Doubl. p. 56. 570 & 571 (♂ & ♀). — *Pachyrhynchus Cuvieri* Spix Av. Bras. II. p. 33. 4. t. 45. 2. — Sws. Flycatch. p. 85. t. 4. — Jard. & Selby Ill. Orn. App. II. no. 2 (♂). — *Muscipeta nigriceps* Wied Beitr. III. p. 914. 8 (♂ & ♀). — *Tityra Vieillotii* Jard. & Selby Ill. Orn. I. no. 7. t. 10. 1 (♀). — *Tityra Cuvieri* Iid. l. l. I. Syn. no. 5 (♂). — *Pachyrhynchus viridis* Orb. & Lafr. Dict. Hist. Nat. II. p. 520. — *Pachyrhamphus Cuvieri* Gray List Gen. B. p. 41. — Cab. Orn. Not. p. 242. — Bp. Consp. I. p. 180. gen. 354. 4. — *Pachyrhamphus nigriceps* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50 (♂). — Burm. Th. Bras. II. p. 454. — *Pachyrhamphus Vieillotii* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 51 (♀). — *Psaris viridis* Id. Ind. Azar. p. 14 (♂). — *Tityra Cuvieri, viridis* ♀ *Vieillotii* Gray Gen. B. I. p. 253—254. 13—15. —

Riogrande — ♂ ad.; Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 6 St.

272. 2. P. cinereus Scl.

Rev. Tityr. p. 11. 9. — *Manakin cendré de Cayenne* Buff. Pl. enl. 687. 1 (♂). — *Gobe-mouche roux à poitrine orangée de Cayenne* Id. l. l. 831. 1 (♀). — *Pipra cinerea* Bodd. Tabl. Pl. enl. 687. 1. — Gray Gen. B. I. p. 274. 8 (♂). — *Muscicapa eques* Bodd. Tabl. Pl. enl. 831. 1 (♀). — *Muscicapa aurantia* Gm. S. N. p. 932. 24 (♀). — *Pipra atricapilla* Id. l. l. p. 1003. 20 (♂). — *Lanius mitratus* Licht. Doubl. p. 50—51. 534—535 (♂ & ♀). — *Pachyrhynchus rufescens* Spix Av. Bras. II. p. 34. 7. t. 46. 2 (♀). — *Pachyrhynchus leucogaster* Sws. Two Cent. p.

289. 26 (♂ jun.). — *Psaris atricapillus* Temm. Tabl. méth. p. 19 (♂). — Kaup P. Z. S. 1851. p. 45. 2. — *Psaris aurantius* Temm. Tabl. méth. p. 19 (♀). — *Pachyrhynchus simplex* Less. Ech. Mond. sav. 1844. p. 231. — Hartl. R. Z. 1846. p. 2. 13. — *Pachyrhamphus mitratus* Id. Verz. Mus. Brem. p. 51 (♂). — Burm. Th. Bras. II. p. 454. — *Tityra rufescens, eques, leucogaster & mitrata* Gray Gen. B. I. p. 254. 19, 21, 28 & 35. — *Pachyrhamphus atricapillus* Cab. Orn. Not. p. 242. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 698. 145. — Bp. Consp. I. p. 181.gen. 354. 5. — *Psaris parinus* Kaup P.Z.S. 1851. p.48. 15. — *Pachyrhamphus griseus* (!) Scl. B. Bogot. Add. II. p. 4. 32. —
Caracas — ♂ ad.; Cayenne — 2 ♀ — 3 St.

Gen. ZETETES *) Nob. — Rundschwanz-Becarde.

Pachyrhynchus Spix 1824 (nec Wagl. 1822). *Psaris* Bp. 1850 (nec Cuv. 1817).

273. 1. Z. niger Nob.

Pachyrhamphus niger Spix Av. Bras. II. p. 33. 5. t. 45. 1. — Jard & Selby Ill. Orn. II. App. no. 1. — Sws. Two Cent. p. 290. 29. — Burm. Th. Bras. II. p. 453 Anm. — *Psaris niger* Sws. Z. Journ. II. p. 356. — Bp. Consp. I. p. 181. gen. 355. 1. — *Tityra nigra* Jard. & Selby Ill. Orn. I. Syn. no. 8. — Gray Gen. B. I. p. 254. 25. — *Bathmidurus niger* Cab. Orn. Not. 243. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 698. 146. — *Pachyrhamphus niger* Scl. B. Bogot. p. 22. 239. — *Pachyrhamphus nigriventris* Id. Rev. Tityr. p. 12. 11. — *Lanius luridus* Licht. in Mus. Berol. —
Cayenne — ♂ ad.; Caracas — ♂ juv. — 2 St.

274. 2. Z. polychropterus Nob.

Platyrhynchus polychropterus Vieill N. D. XXVII. p. 10. —

*) Bei Begründung der Gattung *Bathmidurus* Cab. (1847) ist ausdrücklich *Lanius atricapillus* Gm. als Typus angegeben worden, nicht *Pachyrhynchus variegatus* Spix, wie Gray in seiner „List of Genera and Subgenera of Birds" (p.50. 831) angiebt. Es verbleiben desshalb als typisch bei derselben die Formen, welche unter allen *Psarinae* den am meisten glatt gedrückten und verhältnissmässig breitesten Schnabel zeigen, dessen abgerundete Form, freilich nur entfernt, gewissermaassen an *Rhynchocyclus* erinnert. Dagegen haben die als *Zetetes* abzusondernden Arten einen höhern, weniger breiten Schnabel und einen schon weniger stufigen Schwanz und bilden durch die dunkle schwarzgraue Färbung der Männchen und die vorherrschend roströthliche der Weibchen, abgesehen von der Schwanzformation, gleichsam eine Wiederholung der Gattung *Hadrostomus* im Kleinen, während wir bei den eigentlich typischen Formen von *Bathmidurus* die Weibchen überwiegend grünlich gefärbt finden werden. Uebrigens ist ζητήτης (von ζητέω, durchsuchen) = *Inquisitor*. —

Id. Enc. p. 835. — Pucher Arch. Mus. VII. p. 357 (♂ ad.). *Pachyrhynchus variegatus* Spix Av. Bras. II. p. 31. 1. t. 43. 2 (♂ jun.). — *Tityra castanea* Jard. & Selby Ill. Orn. I. Syn. no. 6. t. 10. 2 (♀). — *Pachyrhynchus castaneus* Iid. l. l. II. App. no. 3 (♀). — *Muscipeta splendens* Wied Beitr. III. p. 906 (♂ ad.). — *Muscipeta aurantia* Id. (nec Gm.) l. l. p. 911 (♂ juv. & ♀). — *Pachyrhynchus ruficeps* Sws. Two Cent. p. 288. 24 (♀). — *Pachyrhynchus Spixii* Id. l. l. p. 289. 28 (♂ ad. & ♀ jun.). — *Pachyrhamphus splendens* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 51 (♂). — *Pachyrhamphus aurantius* Id. ibid. (♀) — *Tityra ruficeps, castanea, splendens & variegata* Gray Gen. B. I. p. 254. 18, 20, 26 & 27. — *Bathmidurus variegatus* Cab. Orn. Not. p. 244. — Burm. Th. Bras. II. p. 453 (♀ ad.). — *Bathmidurus melanoleucus fem.* *) Cab. Orn. Not. p. 244 (♀). — Burm. Th. Bras. II. p. 451 (♂ juv. & ♀). — *Psaris variegatus* Bp. Consp. I. p. 181. gen. 355. 3 (♂ ad.). — *Psaris melanoleucus fem.* Id. l. l. p. 181. gen. 355. 4 (♀). — *Psaris marginatus tristis* Kaup P. Z. S. 1851. p. 48. 14 var. *γ*. — *Pachyrhamphus polychropterus* Scl.

---

*) Während einerseits die a. a. O. als Weibchen von *B. melanoleucus* betrachteten Exemplare sich als solche von *Z. polychropterus* herausgestellt haben, hat sich andererseits jetzt ergeben, dass der als Männchen beschriebene Vogel Nichts als ein jüngeres Männchen der *Muscicapa surinama* Lin. ist. Als Vaterland des Letztern ist damals irrthümlich Brasilien angegeben worden, dasselbe ist indessen jedenfalls Cayenne oder Guiana, da er sich unter einer von dort dem berliner Museum zugekommenen Sendung zugleich mit mehrern andern nur dort vorkommenden Arten befand. Der Umstand, dass dieser entschieden noch jüngere männliche Vogel im Uebergangskleide rostrothe Ränder auf den Flügeln zeigt, lässt mit ziemlicher Gewissheit auf ein oben mehr oder weniger rostroth gefärbtes Weibchen schliessen, wie es Sclater a. a. O. beschreibt. Aus diesem Grunde haben wir die auf rothgefärbte Vögel deutenden Synonymen Boddaert's und Gmelin's ebenfalls zu den *Muscicapa surinama* Lin. gestellt. Sclater betrachtet diese letztere, die buffon'sche *Gobe-mouche roux de Cayenne* als eigene Art, obgleich er zur Rettung derselben die unerhörte Ausnahme annehmen muss, dass Männchen und Weibchen hier rostroth gefärbt seien; uns scheint jedoch diese Ansicht noch durch Nichts hinlänglich erwiesen zu sein, und glauben wir vorläufig noch, dass alle Weibchen dieser Gattung ein von den schwärzlich gefärbten Männchen verschiedenes rostrothes Gefieder haben, bis Untersuchungen an Ort und Stelle die Sache aufgeklärt haben werden. Die Synonymie der *M. surinama* würde sich somit vielleicht folgendermaassen ordnen lassen:

3. *Z. surinamus.* — *Muscicapa surinama* Lin. S. N. p. 325. 5. — Gm. S. N. 932. 5. (*mas. ad.*). — *Gobe-mouche roux de Cayenne* Buff. Pl. enl. 453. 1 (*fem.*). — *Muscicapa rufa* Bodd. Tabl. Pl. enl. 453. 1 (*fem.*). — *Muscicapa rufescens* Gm. S. N. p. 936. 26 (*fem.*). — *Tyrannus rufescens* Temm. Tabl. méth. p. 24 (*fem.*). — *Bathmidurus melanoleucus mas* (*excl. synonym.*) Cab. Orn. Not. p. 241 (*mas jun.*) — *Pachyrhamphus dimidiatus* Filippi Cat. Mus. Mediol. p. 31. — *Tityra surinama* Strickl. Contrib. Ornith. 1848. p. 62. t. 11 (*mas ad.*). — *Psaris surinamus* Bp. Consp. I. p. 181. gen. 355. 2 (*mas ad.*). — *Psaris melanoneucus mas* (*excl. synonym.*) Id. l. l. p. 181. gen. 355. 4 (*mas juv.*). — *Pachyrhamphus surinamus* Scl. Rev. Tityr. p. 10. 7 (*mas & fem.*). —

Rev. Tityr. p. 13. 12 (♂). — *Pachyrhamphus rufescens* Id. l. l. p. 15. 16 (♂ juv. & ♀). —

Rio grande — ♂ juv.; Brasilien — 2 ♂ ad., 4 ♂ jnn., 2 ♀ — 9 St.

Gen. BATHMIDURUS*) Cab. 1847. — Stufschwanz-Becarde.

275. 1. B. maior Cab.

Orn. Not. p. 246. — *Psaris maior* Bp. Consp. I. p. 181. gen. 355. 6. — *Psaris marginatus maior* Kaup P. Z. S. 1851. p. 48. 14 var. β. — *Pachyrhamphus marginatus* Scl. (nec Licht.) l. l. 1856. p. 298. 121. — *Pachyrhamphus maior* Id. Rev. Tityr. p. 14. 14. —

Xalapa — ♀ — 1 St.

276. 2. B. albogriseus Nob.

Pachyrhamphus albogriseus Scl. Rev. Tityr. p. 14. 15. —

Caracas — ♂ juv. — 1 St.

277. 3. B. atricapillus Cab.

Orn. Not. p. 245. — *Lanius atricapillus* Gm. S. N. p. 302. 32 (♂). — *Todus marginatus* Licht. Doubl. p. 51. 539 (♀). — *Muscipeta marginata* Wied Beitr. III. p. 909. 6. — *Pachyrhynchus Swainsonii* Jard. & Selby Ill. Orn. II. App. no. 6. — Sws. Two Cent. p. 288. 23 (♀ & ♂ juv.). — *Pachyrhynchus albifrons* Sws. Two Cent. p. 289. 27. — *Pachyrhynchus marginatus* Orb. & Lafr. Syn. p. 42. 1. — Orb. Voy. p. 303. 201. t. 31. 2-4. — *Pachyrhamphus marginatus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 50 (♀). — Scl. Rev. Tityr. p. 13. 13. — *Tityra Swainsonii, albifrons, marginata* & *spec.* Gray Gen. B. I. p. 254. 16, 23, 33 & 34. — *Platyrhynchus marginatus* Id. l. l. p. 256. 3 (♀). — *Psaris marginatus* Bp. Consp. I. p. 181. gen. 355. 5. — *Psaris marginatus tristis* Kaup P. Z. S. 1851. p. 48. 14 var. α. — *Bathmidurus marginatus* Burm. Th. Bras. II. p. 451. —

Brasilien — 3 ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., 2 ♀ — 7 St.

---

*) Hierher gehört auch noch die kleine, gleichsam an *Pipra* erinnernde Gattung: Gen. *Callopsaris* Bp. 1854:

1. *C. versicolor.* — *Vireo versicolor* Hartl. R. Z. 1843. p. 289 *(mas jun.).* — *Pachyrhamphus squamatus* Lafr. l. l. p. 219 *(mas ad.).* — *Tityra versicolor* Gray Gen. B. I. p. 254. 40. — *Pachyrhamphus versicolor* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 51. — Cab. Orn. Not. p. 243. — Bp. Consp. I. p. 181. gen. 354. 6 *(mas & fem.).* — Scl. B. Bogot. p. 22. 240. — Id. Rev. Tityr. p. 12. 10. — *Psaris versicolor* Kaup P. Z. S. 1851. p. 45. 3. — *Psaris sulphureicollis* Licht. in Mus. Berol. (Neugranada). —

Subfam. PIPRINÆ. Schnurrenvögel.

Gen. IODOPLEURA *) Less. 1839. — Veilchenträger.

Iodopleurus Parzudaki 1847.

278. 1. I. pipra Less.

Gray List Gen. B. p. 45. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 697. 140. — Desmurs Iconogr. Orn. t. 68. 2. — Bp. Consp. I. p. 171. gen. 331. 1. — Burm. Th. Bras. III. p. 465. — *Pardalotus pipra* Less. Cent. Z. t. 26. — Id. Trait. p. 455. 5. — *Euphone aurora* Sundev. Sv. Acad. 1853. t. 11. 5. — Gray Gen. B. II. p. 367. 23. — *Euphone pipra* Id. l. l. III. App. p. 17. — *Euphone modesta* Licht. in Mus. Berol. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. CALYPTURA Sws. 1831. — Schmuckhähnchen.

Calypturus Bp. 1854.

279. 1. C. cristata Sws.

B. Braz. t. 24. — Id. Class. B. II. p. 254. — Gray Gen. B. I. p. 271. — Bp. Consp. I. p. 175. gen. 338. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 448. — *Pardalotus cristatus* Vieill. N. D. XXIV. p. 528. — Id. Enc. p. 511. 1. — Less. Trait. p. 455. 2. — *Regulus tyrannulus* Licht. in Mus. Berol. — *Pipra tyrannulus* Wagl. Isis 1830. p. 940. 27. — *Calypturus cristatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 75. 162. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. ANTICORYS **) Nob. — Doppelschöpfchen.

Masius (!) Bp. 1850.

280. 1. A. chrysoptera Nob.

Pipra chrysoptera Lafr. R. Z. 1843. p. 97. — Id. Mag. Z. 1843. t. 44. — Gray Gen. B. I. p. 274. 25. t. 67. 1. — *Ma-*

---

*) Dahin gehören noch zwei andere Arten, nämlich:

2. *I. fusca* „Hartl." Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 54. 107. — *Ampelis fusca* Vieill. N. D. VIII. p. 262. — *Pipra Laplacei* Eyd. & Gerv. Mag. Z. 1837. t. 68.—Burm. Th. Bras. II. p. 439. Anm. 2.— *Euphone Laplacei* Gray Gen. B. III. App. p. 17.— *Iodopleura Laplacii* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 331. 3 (Para);
3. *I. Isabellae* Parzud. R. Z. 1847. p. 186. — Desmurs Iconogr. Orn. livr. 12. 2. — Bp. Consp. I. p. 171. gen. 331. 2. — *Iodopleura Emiliae* Desmurs Iconogr. Orn. t. 68. 1. — *Euphone Isabellinae* (!) Gray Gen. B. III. App. p. 17 (Venezuela). —

**) Von ἀντί (einander gegenüber stehend) und κόρυς (Haube, Schopf). — Hierher ist auch noch zu stellen die Gattung *Chloropipo* Nob. (von χλωρός, grünlichgelb und πιπώ = πίπρα), welche von den typischen

sius chrysopterus Bp. Consp. I. p. 175. gen. 337. 1. — Scl. B. Bogot. p. 24. 254. —
Neugranada — ♂ — 1 St.

Gen. TELEONEMA *) Rchb. 1850. — Fadenschwänzchen.
Cirrhipipra (!) Bp. 1850. *Cirripipra* (!) Id. 1854.

281. 1. T. filicaudum Nob.

Pipra filicauda Spix Av. Bras. II. p. 5. 3. t. 8. 1—2. — Wagl. Isis 1830. p. 936. 21. — Küster Atl. ausl. Vög. Lief. 13. t. 6—7. — Tsch. Consp. p. 11. 54. — Id. Faun. Per. p. p. 123. — Gray Gen. B. I. p. 274. 5. — Scl. B. Bogot. p. 24. 249. — Burm. Th. Bras. II. p. 446. — *Pipra filifera* Less. — *Cirrhipipra filicauda* Bp. Consp. I. p. 172. gen. 334. 1. —
Porto Cabello — 2 ♂; Peru — 2 ♂ — 4 St.

Gen. PIPRA Lin. 1766. — Schnurrenvogel.
Manacus (!) Briss. 1760. *Pipra* Cab. 1847. *Dixiphia* (!) Bp. 1854 (nec Rchb. 1850). *Ceratopipra* Bp. 1854. *Lepidothrix* & *Dasyncetopa* Schiff 1854.

282. 1. P. aureola Lin.

S. N. p. 339. 7. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 54-56. — Vieill. Enc. p. 262. 14. — Hahn Abbild. & Beschreib. ausländ. Vög. Lief. 2. t. 5. — Wagl. Isis 1830. p. 933. 11. — Less. Trait. p. 258. 3. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 15. t. 8. — Cab. Orn. Not. p. 325. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 696. 136. — Gray Gen. B. I. p. 274. 20. — Bp. Consp. I. p. 173 gen. 335. 3. — *Manakin rouge* Buff. Pl. enl. 34. 3. —
Cayenne — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Formen der Gattung *Pipra* durch weit gestrecktere Gestalt, viel längere Flügel und bedeutend kürzere Läufe wesentlich abweicht; auch characterisirt sie ihr glanzloses, vorherrschend grünlichgelbes Gefieder. Typus derselben ist:
C. flavicollis. — *Pipra flavicollis* Scl. R. & Mag. Z. 1852. p. 9. — Id. Contrib. Orn. 1852. p. 132. — Id. B. Bogot p. 24. 253. — *Pipra plumosa* Licht. in Mus. Berol. (Neugranada). —

*) Bonaparte und Reichenbach haben diese Gattung fast gleichzeitig aufgestellt, jedenfalls aber würde der Name Bonaparte's den Vorzug verdienen, wäre er nicht, wie so viele andere von ihm gegebene, leider regelwidrig gebildet, vorn lateinisch und hinten griechisch. Denn Reichenbach hat nur eine bildliche Darstellung einzelner Charactere gegeben, zu denen erst 1855 von Gray die Typen genannt wurden, ein Umstand, der, wie wir oben öfter gesehen haben, leicht zu mancherlei Irrungen Anlass giebt, während Bonaparte's gute Diagnose der Gattung Nichts zu wünschen übrig lässt. —

283. 2. P. fasciata Orb. & Lafr.

Syn. p. 38. 2. — Orb. Voy. p. 295. 190. t. 30. 1. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 4. —

Peru — 2 ♂ — 2 St.

284. 3. P. cornuta Spix

Av. Bras. II. p. 5. 1. t. 7. 2. — Wagl. Isis 1830. p. 933. 12. — Gray Gen. B. I. p. 274. 18. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 697. 138. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 7. — Burm. Th. Bras. II. p. 444. — *Ceratopipra cornuta* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 69. 152. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

285. 4. P. auricapilla Licht.

Doubl. p. 29. 302. — Hahn Abbild. & Beschreib. ausländ. Vög. Lief. 15. t. 3. 1. — Wagl. Isis 1830. p. 934. 14. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 15. t. 6. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 696. 137. — Burm. Th. Bras. II. p. 444. — Scl. P. Z. S. 9 Novemb. 1858. List B. coll. by Fraser in Ecuad. p. 9. 51. — *Parus auricapillus* Klein Av. p. 86. 13. — *Manacus aurocapillus* Briss. Av. IV. p. 448. 4. t. 34. 2. — *Pipra erythrocephala* (!) *) Lin. S. N. p. 339. 6. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 60—61. — Vieill. Enc. p. 261. 11. — Less. Trait. p. 258. 10. — Temm. Tabl. méth. p. 22. — Gray Gen. B. I. p. 274. 15. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 6. — ? *Pipra cristata* Lin. S. N. p. 339. 3. — Wagl. Isis 1830. p. 942. 13. — Gray Gen. B. I. p. 274. 31. — *Manakin à tête d'or* Buff. Pl. enl. 34. 1. — ? *Pipra purpurea* Vieill. Enc. p. 263. 19. — *Dixiphia erythrocephala* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 67. 145. —

Cayenne — 2 ♂ — 2 St.

286. 5. P. rubricapilla Temm.

Pl. col. 54. 3. — Less. Trait. p. 258. 10 var. — Orb. & Lafr. Syn. p. 38. 1. — Orb. Voy. p. 294. 189. — Gray Gen. B. I. p. 274. 15. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 5. — *Manacus rubrocapillus* Briss. Av. IV. p. 450. 5. — *Pipra erythrocephala* var. β Lin. S. N. p. 339. 6. — ? *Pipra torquata* Gm. S. N. p. 1000. 15. — Vieill. Enc. p. 263. 18. — Wagl. Isis 1830. p. 942. 11. — Gray Gen. B. I. p. 274. 30. — *Pipra erythrocephala* Licht. Doubl. p. 29. 300—301. — Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 15. t. 3. —

*) Linné hat diese zuerst von Klein unter dem guten Namen *Parus auricapillus* beschriebene Species mit Brisson's *Manacus rubrocapillus* vereinigt und *Pipra erythrocephala* genannt; indessen widerspricht diese Benennung geradezu der Färbung unseres Vogels und passt weit eher auf die folgende Art, wesshalb wir den characteristischern Namen *P. auricapilla* vorziehen. —

Wied Beitr. III. p. 422. — Wagl. Isis 1830. p. 933. 13. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 15. t. 5. — Burm. Th. Bras. II. p. 443. — *Dixiphia rubricapilla* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 67. 147. —

Brasilien — 3 ♂, ♀ — 4 St.

287. 6. P. leucocilla Lin.

S. N. p. 340. 9. — Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 10. t. 2. — Gray Gen. B. I. p. 274. 22. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 697. 139. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 11. — Burm. Th. Bras. II. p. 444. — *Manakin à tête blanche* Buff. Pl. enl. 34. 2. — *Pipra leucocapilla* Gm. S. N. p. 1002. 9. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 59. — Vieill. Enc. p. 261. 12. — Wied Beitr. III. p. 427. — Wagl. Isis 1830. p. 934. 16. — *Dixiphia leucocapilla* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 67. 148. —

Bahia — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

288. 7. P. coracina „Verr."

Scl. P. Z. S. 1856. B. Bogot. Add. I. p. 29. 11. — *Pipra leucocilla* Id. (nec Lin.) B. Bogot. p. 24. 250. —

Peru — ♂ — 1 St.

289. 8. P. cyaneocapilla *) Hahn

Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 15. t. 3. 2. — Wagl. Isis 1830. p. 934. 15. — Gray Gen. B. I. p. 274. 23. — Bp. Consp. I. p. 174. gen. 335. 14. — Burm. Th. Bras. II. p. 445. — *Pipra coronata* Spix Av. Bras. II. p. 5. 2. t. 7. 1. — Lafr. R. Z. 1847. p. 70. 5. — *Lepidothrix cyaneocephala* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 68. 150. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

290. 9. P. serena Lin.

S. N. p. 340. 11. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 62 & 64. — Vieill. Enc. p. 260. 8. — Id. Gal. Ois. II. p. 95. t. 72. — Wagl. Isis 1830. p. 935. 17. — Less. Trait. p. 358. 8. — Gray Gen. B. I. p. 274. 13. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 697. 140. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 10. — Burm. Th. Bras. II. p. 445 Anm. — *Manakin à front blanc* Buff. Pl. enl. 324. 2. — *Euphone serena* Licht. Doubl. p. 29. 308—309. — *Dasyncetopa serena* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 71. 154. —

Cayenne — ♂, ♀; Brasilien — ♂ — 3 St.

---

*) Bonaparte stellt die *Pipra herbacea* Spix (Av. Bras. II. p. 6. 3. t. 8a. 1) als Weibchen zu dieser Art, dieselbe gehört aber ganz entschieden zu den *Tanagrinae*. —

Gen. COROPIPO *) Schiff 1854. — Glanz-Manakin.
Corapipo (!) Schiff 1854.

291. 1. C. gutturalis Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 70. 153. — *Pipra gutturalis* Lin. S. N. p. 340. 10. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 63 & 65. — Vieill. Enc. p. 260. 9. — Wagl. Isis 1830. p. 935. 17. — Less. Trait. p. 258. 7. — Gray Gen. B. I. p. 274. 14. — Bp. Consp. I. p. 174. gen. 335. 12. — Burm. Th. Bras. II. p. 445 Anm. — *Manakin à gorge blanche* Buff. Pl. enl. 324. 1. — *Pipra perspicillata* Wagl. Isis 1830. p. 935. — Gray Gen. B. III. App. p. 13. — Bp. Consp. I. p. 274. gen. 335. 13. — Burm. Th. Bras. II. p. 445 Anm. (♀). —

Cayenne — ♂ — 1 St.

Gen. MACHÆROPTERUS **) Schiff 1854. — Schwertfittig.

292. 1. M. regulus Nob.

Pipra regulus Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 4. t. 4. 1—2. — *Pipra strigilata* Wied Reis. Bras. I. p. 187. — Id. Beitr. III. p. 430. — Temm. Pl. col. 54. 1—2. — Licht. Doubl. p. 29. 303—304. — Less. Trait. p. 258. 11. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 15. t. 7. — Sws. B. Braz. t. 25. — Gray Gen. B. I. p. 274. 27. — Bp. Consp. I. p. 174. gen. 335. 16. — Burm. Th. Bras. II. p. 445. — *Pipra lineata* Thunb. Mém. Acad. Petersb. 1822. p. 284. t. 8. 1. — *Machaeropterus strigilatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 72. 155. —

Brasilien — 2 ♂, 2 ♀ — 4 St.

293. 2. M. striolatus Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 72. 156. — *Pipra striolata* Id. P. Z. S. 1837. p. 122. 20. — Gray Gen. B. I. p. 274. 28. t. 67. 2. — Bp. Consp. I. p. 174. gen. 335. 17. — Scl. B. Bogot. p. 24. 252. — *Pipra strigilata* Wagl. (nec Wied) Isis 1830. p. 936. 20. —

Neugranada — ♂ — 1 St.

---

*) Von κόρη (Pupille d. h. glänzend schwarz) und πιπώ = πίπρα. —

**) Hierher als dritte Art:

3. *M. pyrocephalus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 72. 157. — *Pipra pyrocephala* Scl. R. & Mag. Z. 1852. p. 9. 6. — Id. Contrib. Orn. 1852. p. 132. — Id. B. Bogot. p. 24. 253 (Neugranada). —

Gen. ILICURA Rchb. 1850. — Spitzschwanz-Manakin.
Ilicura (!) Bp. 1854.

294. 1. **I. militaris** Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 64. 139. — *Pipra militaris* Shaw Nat. Misc. XX. t. 849. — Wagl. Isis 1830. p. 931. 8. — Less. Trait. p. 259. 5. — Gray Gen. B. I. p. 274. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 441. — *Pipra rubrifrons* Vieill. N. D. XIX. p. 161. — Id. Enc. p. 388. 27. — *Pipra oxyura* „Olf." Erm. Reis. Atl. p. 12. 87. t. 9. 7. — *Chiroxiphia oxyura* Cab. Orn. Not. p. 235. — *Chiroxiphia militaris* Id. l. l. p. 235. — Bp. Consp. I. p. 172. gen. 333. 6. —

Brasilien — **2** ♂, 2 ♀ — 4 St.

Gen. CHIROXIPHIA *) Cab. 1847. — Degenflügel.
Cheiroxiphia (!) Rchb. 1850. *Chiroprion* **) & *Cercophaena* Schiff 1854.

295. 1. **C. caudata** Cab.

Orn. Not. p. 235. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 695. 134. — Bp. Consp. I. p. 171. gen. 333. 1. — *Pipra caudata* Shaw Nat. Misc. V. t. 153. — Thunb. Mém. Acad. Petersb. 1822. t. 7. 1. — Spix Av. Bras. II. p. 5. 3. t. 6. 1—2. — Wagl. Isis 1830. p. 930. 5. — Less. Trait. p. 257. 2. — Sws. B. Braz. t. 45. — Gray Gen. B. I. p. 274. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 441. — *Pico de puncon cola de pala* Azar. Apunt. no. 112. — *Pipra longicauda* Vieill. N. D. XIX. p. 162. — Id. Enc. p. 388. 20. — Kittl. Kupf. Vög. t. 18. 2. — Wied Beitr. III. p. 413. — Bp. P. Z. S. 1837.

---

*) Hierher gehören noch folgende 3 Arten:

4. *C. ignicapilla* Cab. Orn. Not. p. 235. — Bp. Consp. I. p. 172. gen. 333. 5. — *Pipra ignicapilla* Wagl. Isis 1830. p. 931. 6. — Gray Gen. B. III. App. p. 13. — Burm. Th. Bras. II. p. 442 Anm. 2 (Brasilien);

5. *C. linearis* Bp. Consp. I. p. 172. gen. 333. 3. — Id. Not. Orn. p. 88. — Scl. Ibis 1859. p. 124. 169. — *Pipra linearis* Bp. P. Z. S. 1837. p. 113. 29. — Gould Voy. Sulph. B. p. 40. t. 20. — Gray Gen. B. I. p. 274. 4. — *Pipra fastuosa* Less. R. Z. 1842. p. 174. — *Cercophaena linearis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 63. 138 (Central-America);

6. *C. regina* Scl. Ann. & Mag. Nat. Hist. June 1856. Descript. eight new spec. S.-Amer. B. p. 3. 7. — *Pipra regina* Natt. in Mus. Vindob. (Brasilien). —

**) Will man für *Pipra pareola* eine eigene Gattung *Chiroxiphia* aufstellen, so sind jedenfalls auch *P. lanceolata* Wagl., *P. regina* Natt. und *P. linearis* Bp. in dieselbe zu stellen und darf das Genus *Chiroxiphia* Cab. nicht, wie es von Bonaparte in seinem „Conspectus Volucrum Anisodactylorum" geschehen ist, nur nach der Länge oder Kürze der beiden verlängerten Schwanzfedern in 3 Untergattungen zerfällt werden, deren jede dann eine jener drei so äusserst nahe verwandten Arten enthalten würde. —

p. 113. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 13. t. 8. — Hartl. Ind. Azar. p. 8. — Gray Gen. B. III. App. p. 13. — Burm. Th. Bras. II. p. 442 Anm. 1. — *Chiroxiphia longicauda* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 333. 2. —

Rio Grande — ♂; Brasilien — 3 ♂ — 4 St.

296. 2. C. lanceolata Nob.

Pipra pareola Hahn (nec Lin.) Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 16. t. 4. — Less. Trait. p. 257. 1. t. 51. 1. — *Pipra lanceolata* Wagl. Isis 1830. p. 931. 7. — *Pipra pareolides* Orb. & Lafr. R. Z. 1838. p. 165. 5. — Gray Gen. B. I. p. 274. 7. — *Pipra melanocephala* Bp. (nec Vieill. *) P. Z. S. 1837. p. 113. — *Chiroxiphia melanocephala* Id. Consp. I. p. 172. gen. 333. 4. — Scl. B. Bogot. p. 23. 248. —

Cartagena — ♂; Caracas — ♂ — 2 St.

297. 3. C. pareola Cab.

Orn. Not. p. 235. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 695. 133. — *Pipra pareola* Lin. S. N. p. 339. 2. — Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 50—53. — Vieill. Enc. p. 258. 1. — Wied Beitr. III. p. 418. — Wagl. Isis 1830. p. 932. 9. — Swns. B. Braz. t. 44. — Gray Gen. B. I. p. 274. 6. — Bp. Consp. I. p. 172. gen. 335. 1. — *Manakin vert huppé de Cayenne* Buff. Pl. enl. 303. 2 (♂ juv.). — *Manakin noir huppé* Id. l. l. 687. 2 (♂ ad.). — *Manacus superbus* Pall. Spicil. Z. I. p. 8. t. 3. 4. — *Pipra superba* Gm. S. N. p. 999. 14. — Lath. Ind. Orn. II. p. 556. 4. — Vieill. Enc. p. 259. 3. — *Chiroprion pareola* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 61. 133. —

Bahia — 3 ♂ adult., 4 ♂ adolesc., 4 ♂ jun., ♂ juv. — 12 St.

Gen. CHIROMACHÆRIS Cab. 1847. — Manakin.

Manacus **) (!) Bp. 1850.

298. 1. C. manacus Cab.

Orn. Not. p. 235. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 696.

---

*) Vieillot's *Pipra melanocephala* (N. D. XIX. p. 163. — Enc. p. 389. 34), welche Bonaparte und nach ihm Sclater mit Wagler's *P. lanceolata* vereinigt haben, ist der Beschreibung nach von derselben gänzlich verschieden, und könnte weit eher zu *Iticura militaris* Bp., als zu unserer *Chiroxiphia lanceolata* gestellt werden. Sie scheint sich von ersterer nur durch den Mangel der rothen Stirn zu unterscheiden, und würde somit vielleicht als *Iticura melanocephala* eine eigene auf Trinidad die brasilianische *I. militaris* repräsentirende Art bilden. —

**) Brisson's Gattung *Manacus* umfasst ausser *Rupicola* alle von Linné unter *Pipra* begriffenen Arten und ist völlig mit *Pipra* Lin. synonym. Daher verfährt Bonaparte ganz willkührlich, wenn er darauf, dass Brisson zufällig den *Manacus*, Linné aber eine andere Art voranstellt, eine Verschiedenheit beider Gattungen begründen will. —

135. — *Manacus niger* Edw. Glean. p. 107. t. 260. 1. — *Manacus* Briss. Av. IV. p. 442. 1.— *Pipra manacus* Lin. S. N. 340. 12. — Vieill. Enc. p. 264. 21. — Gray Gen. B. I. p. 274. 10. — *Manakin du Brésil* (!) Buff. Pl. enl. 302. 1.—*Pipra manacus var.* Wagl. Isis 1830. p. 939. 26 not. — *Manacus Edwardsi* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 332. 2. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 299. 128. — Id. Ibis 1859. p. 124. 170. — *Manacus Edwardsi* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 332. 2. — Scl. B. Bogot. p. 23. 246. — *Pipra Edwardsi* Burm. Th. Bras. II. p. 447 Anm. —

Guiana — ♂ jun. — 1 St.

299. 2. C. gutturosa Nob.

Manakin à tête noire de Cayenne (!) Buff. Pl. enl. 303. 1. — *Pipra manacus var. β* Gm. S. N. p. 1002. 12. — Vieill. Enc. p. 264. 21.— *Pipra gutturosa* Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. t. 58. — Vieill. N. D. XIX. p. 161. — Id. Enc. p. 387. 26. — Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 16. t. 5. — Less. Trait. p. 258. 6. — *Pipra manacus* Wied (nec Lin.) Beitr. III. p. 432. — Wagl. Isis 1830. p. 939. 26. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 13. t. 5. — Sws. B. Braz. t. 26. — Burm. Th. Bras. II. p. 446. — *Manacus gutturosus* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 332. 1. —

Bahia — 4 ♂, 3 ♀ — 7 St.

300. 3. C. flaveola Nob.

Manacus flaveolus Cassin Proc. Acad. Sc. Phil. 1851. p. 349. — Scl. B. Bogot. p. 23. 247. — *Pipra flavilincta* Id. P. Z. S. 1852. p. 34. t. 48. — *Manacus flaveolus* & *flavilinctus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 59. 128 & 131. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

301. 4. C. Candei Nob.

Pipra Candei Parzud. B. Z. 1841. p. 306. — Id. Mag. Z. 1843. t. 45. — Gray Gen. B. I. p. 274. 11. — *Manacus Candei* Bp. Consp. I. p. 171. gen. 332. 3. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 299. 128. — Id. Ibis 1859. p. 124. 170. —

Honduras — ♂ — 1 St.

302. 5. C. vitellina Nob.

Pipra vitellina Gould P. Z. S. 1843. p. 103. — Id. Voy. Sulph. B. t. 21. — Gray Gen. B. I. p. 274. 12. — Lafr. R. Z. 1847. p. 69. 4. — Bp. Consp. I. p. 173. gen. 335. 9. — *Manacus vitellinus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 59. 130. —

Central-America — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. METOPIA Sws. 1831. — Helm-Manakin

Antilophia Rchb. 1850.

303. 1. M. galeata Sws.

Class. B. II. p. 254. — Bp. Consp. I. p. 170. gen. 329. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 440. — *Pipra galeata mas* Licht. Doubl. p. 28. 294. — Wagl. Isis 1830. p. 939. 25. — Sws. B. Braz. t. 23. — Gray Gen. B. I. p. 274. 29. — *Pipra Wiedii* Less. Trait. p. 258. 4. — *Antilophia galeata* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 57. 124. —

Guiana — ♂ ad.; Brasilien — ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

Gen. PHOENICOCERCUS Sws. 1831. — Henker-Manakin.

Cotinga (!) Merr. 1784 (nec Briss. 1760). *Phoenicircus* (!) Sws. 1831. *Carnifex* Sundev. 1836. *Phoenicercus* (!) Strickl. 1841.

304. 1. C. carnifex Sws.

Class. B. II. p. 254. — Gray Gen. B. I. p. 273. 1. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 695. 132. — Bp. Consp. I. p. 170. gen. 328. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 439 Anm. 1. — *Ampelis carnifex* Lin. S. N. p. 298. 3. — Vieill. Enc. p. 763. 13. — Less. Trait. p. 363. 3. — *Rother Cotinga* Merr. Beitr. bes. Gesch. Vög. 1784. I. p. 1. 1. t. 1. 1 (♂). — *Schillernder Cotinga* Id. l. l. p. 6. 2. t. 1. 2 (♀?). — *Cotinga rouge de Cayenne* Buff. Pl. enl. 278. — *Ampelis coccinea* Gm. S. N. p. 839. 3. — *Pipra coccinea pt. (ex Cayenna)* Wagl. Isis 1850. p. 938. 24. — *Le Cotinga ouette ou l'Apira* Levaill. Hist. Nat. Ois. nouv. ou rar. Amér. & Ind. p. 81. t. 37 & p. 83. t. 38. (♂ & ♀). — *Ampelis cuprea* Vieill. N. D. VII. p. 163. — Id. Enc. p. 761. 6. —

Surinam — 2 ♂, ♀ — 3 St.

305. 2. P. nigricollis Sws.

Faun. Bor. Amer. p. 491. — Id. Class. B. II. p. 254. — Gray Gen. B. I. p. 273. 2. — Bp. Consp. I. p. 170. gen. 328. 2. — *Ampelis carnifex* Spix (nec Lin.) Av. Bras. II. p. 4. t. 1. — *Pipra coccinea* Wagl. (nec Gm.) Isis 1830. p. 938. 24. — *Phoenicircus atrococcineus* Lafr. R. Z. 1838. p. 263. — *Ampelis Merremmii* Less. l. l. 1839. p. 104. 7. — *Phoenicocercus coccineus* Burm. Th. Bras. II. p. 438. —

Peru — ♂; Para — ♀ — 2 St.

Gen. RUPICOLA Briss. 1760. — Felsenhahn.

Pipra Lin. 1766 & Ill. 1811. *Orinus* Nitzsch 1840.

306. 1. R. crocea Vieill.

Enc. p. 266. 1. — Gray Gen. B. I. p. 275. 1. — Cab.

Schomb. Reis. Guian. III. p. 694. 131. — Bp. Consp. I. p. 170. gen. 327. 1. — Schomb. Naumannia 1850. p. 34. — Burm. Th. Bras. II. p. 437. — *Upupa crocea* Lin. S. N. ed. VI. — *Pipra rupicola* Id. S. N. ed. XII. p. 338. 1. — Wagl. Isis 1830. p. 925. 1. — *Coq de roche* Buff. Pl. enl. 39 & 747 (♂ & ♀). — Levaill. Hist. Nat. Ois. Par., Roll., Touc. & Barb. I. p. 144. t. 51—53 (♂, ♀ & juv.). — *Rupicola elegans* Steph. — *Rupicola aurantia* Vieill. Gal. Ois. II. p. 316. t. 189. — Less. Trait. p. 259. 1. t. 51. 1. — *Rupicola cayana* Sws. Class. B. II. p. 253. —

Angostura — ♂ ad.; Guiana — ♂ ad., ♀; Brasilien — ♂ juv. — 4 St.

307. 2. R. saturata *) nov. sp.

Similis insequenti, sed minor, rostro paulo longiore: mas saturate rubro-aurantiacus; femina obscurius rufo-brunneo tincta, dorso uropygioque rufescentioribus, pileo brunnescentiore. — Maris long. tot. 1′, al. 7″, caud. 4″ 9‴, rostr. culm. 1″ 2‴, tars. 1″ 2‴, dig. med. exc. ung. 1″ 1‴; feminae long. tot. 11″ 6‴, al. 6″ 9‴, caud. 4″ 4‴, rostr. culm. 1″ 2‴, tars. 1″ 2‴, dig. med. exc. ung. 11 ‴. —

Bolivien — 2 ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 4 St.

308. 3. R. peruviana Dumont

Dict. Sc. Nat. XLVI. p. 455. — Vieill. Enc. p. 266. 2. — Less. Trait. p. 259. 2. — Orb. Voy. p. 294. 188. — Tsch. Consp. p. 11. 53. — Gray Gen. B. I. p. 275. 2. — Bp. Consp. I. p. 171. gen. 327. 2. — Scl. B. Bogot. p. 24. 256. — *Coq de roche du Pérou* Buff. Pl. enl. 745. — Levaill. Hist. Nat. Ois. Par., Roll., Touc. & Barb. I. p. 147. t. 54. — *Pipra rupicola var. β* Gm. S. N. p. 998. 1. — *Pipra peruviana* Lath. Ind. Orn. II. p. 555. 2. — Wagl. Isis 1830. p. 926. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 438 Anm. — *Rupicola peruana* Tsch. F. Per. p. 142. —

Maior, rostro paulo breviore: mas aurantius; femina rufescente-brunnea, pileo cinerascentiore. — Maris long.

*) Es unterscheidet sich diese Art von der gewöhnlichen *R. peruviana* ausser durrh den bei geringern Dimensionen etwas längern Schnabel, auf den ersten Blick durch die viel gesättigtere prachtvoll orangenrothe Färbung des Männchens. Das Weibchen ist ebenfalls dunkler rothbraun gefärbt, Rücken und Steiss erscheinen röthlicher, die bei *R. peruviana* in's Grauliche spielende Hanbe mehr bräunlich. Unsere Exemplare sind uns aus zwei verschiedenen Quellen als bolivianisch zugegangen, und sind wir desshalb sehr zu der Annahme geneigt, dass dieselben vielleicht vom westlichen Abhange der Anden stammen und dort die nur östlich von denselben bis nach Neugranada hinauf vorkommende *R. peruviana* repräsentiren. —

tot. 1′1″, al. 7″ 6‴, caud. 5″ 3‴, rostr. culm. 1″, tars. 1″4‴, dig. med. exc. ung. 1″ 3‴; feminae long. tot. 1′, al. 7″, caud. 5″ 3‴, rostr. culm. 1″, tars. 1″ 4‴, dig. med. exc. ung. 1″ 3‴. —

Peru — ♂, ♀ — 2 St.

Subfam. AMPELINÆ. Zuser.

Gen. HETEROPELMA *) Schiff 1854. — Manakin-Zuser.

309. 1. H. unicolor Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 35. 78. — *Pipra galeata fem.* Licht. Doubl. p. 29. 295. — *Pipra unicolor* „Langds.“ Ménétr. — *Gobe-mouche verte* Less. Trait. p. 391. 75. — *Ptilochloris virescens* Lafr. R. Z. 1838. p. 238. 4. — Gray Gen. B. I. p. 272. 4. — Bp. Consp. I. p. 177. gen. 344. 4. — Burm. Th. Bras. II. p. 436 Anm. 5. —

Brasilien — ♂ jun., ♀ — 2 St.

Gen. LATHRIA **) Sws. 1831. — Grau-Zuser.

Lipaujus (!) Burm. 1850. *?Poliochrus* Rchb. 1850. *Lipaugus* Bp. 1854 (nec Boie 1828).

310. 1. L. cinerascea Nob.

Le cotinga cendré Levaill. Hist. Nat. Ois. nouv. ou rar. Amér. & Ind. p. 98. t. 44. — *Ampelis cinerascea* Vieill. N. D. VIII. p. 162. — Id. Enc. p. 761. 4. — *Muscicapa plumbea* Licht. Doubl. p. 53. 553. — Wied Beitr. III. p. 806. — *Muscicapa vociferans* Id. Reis. Bras. I. p. 242 & II. p. 118. — *Lathria cinerea* Sws. Flycatch. p. 78. t. 2. —

---

*) Als zweite Art stellt Bonaparte a. a. O. ganz richtig hierher:

2. *H. rufoolivaceum.* — *Ptilochloris rufoolivaceus* Lafr. R. Z. 1838. p. 238. 3. — Id. l. l. 1847. p. 155. — Gray Gen. B. I. p. 272. 3. — Bp. Consp. I. p. 177. gen. 344. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 436 Anm. 4. — *Heteropelma viridis* Bp. (nec Less.) Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 35. 77 (Brasilien). —

**) Nahe verwandt ist die Gattung:

Lipaugus Boie 1828. *Lipangus* (!) Boie 1828. *Rhytipterna* Rchb. 1850. *Lathria* Bp. 1854 (nec Sws. 1831), deren Typus:

L. simplex Hartl. R. Z. 1846. p. 3. no. 35. 2. — Gray Gen. B. I. p. 240. 2. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 694. 130. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 422. — *Muscicapa simplex* Licht. Doubl. p. 53. 552. — *Muscicapa cinerascens* Spix Av. Bras. II. p. 16. 5. t. 21. — *Tyrannus calcaratus* Sws. Quart. Journ. XX. p. 271. 5. — Jard. & Selby Ill. Orn. I. t. 37. — *Muscicapa rustica* Wied (nec Licht.) Beitr. III. p. 866. — *Tyrannus rusticus* Gray Gen. B. I. p. 247. 10. — Bp. Consp. I. p. 192. gen. 377. 11. — *Myiarchus* (!) *rusticus* Burm. Th. Bras. II. p. 470. — *Lathria simplex* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 32. 71 (Brasilien). —

Id. Class. B. II. p. 255. — *Querula cinerea* Orb. & Lafr. Syn. p. 39. 1. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 47. — *Querula cineracea* Orb. Voy. p. 296. 192. — *Lipangus plumbeus* Gray List Gen. B. p. 40. — Hartl. R. Z. 1846. p. 3. no. 35. 1. — Gray Gen. B. I. p. 240. 1. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 1. — *Lipangus cineraceus* Cab. Orn. Not. p. 234. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 693.129.— Burm. Th. Bras. II. p. 421. — *Lipanjus cineraceus* Id. Verz. Mus. Hal. p. 48. — *Turdus ampelinus* Ill. in Mus. Berolin. —

Guiana — ♂; Brasilien — ♂ — 2 St.

311. 2. L. fuscocinerea Nob.

Querula fuscocinerea Lafr. R. Z. 1843. p. 291. — *Lipangus fuscocinereus* Hartl. l. l. 1846. p. 3. no. 35. 3.— Gray Gen. B. I. p. 240. 3. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 3. — Scl. B. Bogot. p. 25. 264. —

Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. AULIA *) Schiff 1854. — Pfeif-Zuser.

Laniocera (!) Less. 1840. *Turdampelis* (!) Less. 1844. *Aulea* (!) Schiff 1854. *Lathriosoma* Bp. 1857. *Aulea* Scl. 1857.

312. 1. A. hypopyrrha Nob.

Ampelis hypopyrrha Vieill. N. D. VIII. p. 161. — Id. Enc. p. 762. 9.— *Muscicapa sibilatrix* Wied Beitr. III. p. 810.— *Laniocera sanguinaria* Less. R. Z. 1840. p. 353 (juv.). — *Querula sibilatrix* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 47. — *Turdampelis lanioides* (!) Less. Ech. Mond. sav. 1844. p. 156. — Hartl. R. Z. 1846. p. 3. 35. — *Lipangus hypopyrrhus* Id. l. l. p. 3. no. 35. 4.— Gray Gen. B. I. p. 240. 4.— Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 4. — *Ptilochloris hypopyrrhus* Lafr. R. Z. 1846. p. 43 & 238—40. — Id. l. l. 1847 p. 185. — *Lipangus sanguinarius* Hartl. l. l. 1846. p. 3. no. 35. 5. — Gray Gen. B. I. p. 240. 5. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 5 (juv.). — ? *Lipangus lanioides* Hartl. R. Z. 1846. p. 3. no. 35. 6. — Gray Gen. B. I. p. 240. 6.— Bp. Consp. I. p. 179. gen. 352. 6. — *Laniocera hypopyrrha* Hartl. R. Z. 1846. p. 112.— *Lipangus latera-*

*) Als zweite Art stellt Sclater hierher:

2. *A. rufescens.* — *Lipangus rufescens* Scl. P. Z. S. 1857. p. 296. 10. — Id. Ibis 1859. p. 124. 165. — *Lathriosoma typicum* Bp. in Mus. Brit. (Guatemala). —

lis Gray Gen. B. I. t. 60. — *Aulea hypopyrrha* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 33. 72. — ?*Aulea lanioides* Id. l. l. p. 4. gen. 33. 73. — *Lipaugus sibilatrix* Burm. Th. Bras. II. p. 422. — *Turdus Maximiliani* Licht. in Mus. Berol. — Neu-Granada *) — ♀ — 1 St.

Gen. PTILOCHLORIS Sws. 1837. — Grün-Zuser.

Laniisoma (!) Sws. 1831. *Collurampelis* (!) Less. 1839. ?*Tricophorus* J. E. Gray 18??

313. 1. P. squamata Burm.

Th. Bras. II. p. 435. — *Lanius squamatus* Licht. in Mus. Berol. — *Muscicapa squamata* Wied Beitr. III. p. 814. — *Lanius arcuatus* „Cuv." Geoffr. Mag. Z. 1833. t. 12. — Lafr. R. Z. 1833. p. 7. — *Ptilochloris lunatus* Sws. Class. B. II. p. 250. — *Ptilochloris arcuatus* Lafr. R. Z. 1838. p. 237. 1. — Gray Gen. B. I. p. 272. 1. — Bp. Consp. I. p. 177. gen. 344. 1. — „*Tricophorus lunatus* J. E. Gray" Gray List Gen. B. p. 45. —
Brasilien — ♀ — 1 St.

314. 2. P. remigialis Lafr.

R. Z. 1838. p. 237. 2. — Gray Gen. B. I. p. 272. 2. — Bp. Consp. I. p. 177. gen. 344. 2. — Burm. Th. Bras. II p. 436 Anm. 3. —
Brasilien — ♂ — 1 St.

Gen. CHRYSOPTERYX Sws 1831. — Tijuca.

Tijuca (!) Less. 1830.

315. 1. C. nigra Nob.

Tijuca nigra Less. Cent. Z. t. 6. — Id. Trait. p. 326. — Bp. Consp. I. p. 177. gen. 343. 1. — *Chrysopteryx erythrorhynchus* Sws. Faun. Bor. Amer. p. 492. — Id. Class. B. II. p. 252. — *Ampelis chrysoptera* „Licht." Nordm. Erm. Reis. Atl. t. 10. 1. — *Carpornis nigra* Gray Gen. B. I. p. 279. 5. — *Ptilochloris chrysoptera* Burm. Th. Bras. II. p. 435. —
Brasilien — 2 ♂ — 2 St.

*) Dieses jedenfalls bogotensische Exemplar scheint sich von den brasilianischen, wie sie im berliner Museum stehen, durch etwas geringere Grösse und mehr roströthliche Färbung des sonst gelblichen Flügelbuges zu unterscheiden, doch fehlt es uns zu einer genauen Feststellung jener Unterschiede an einer genügenden Anzahl von Exemplaren dieser Art. —

Gen. AMPHIBOLURA Cab. 1847. — Schwalben-Zuser.

Phibalura (!) Vieill. 1816. *Chelidis* Glog. 1827 (nec *Chelidon* Boie 1822).

316. 1. A. flavirostris Cab.

Orn. Not. p. 233. — *Phibalura flavirostris* Vieill. Anal. p. 68. D. — Id. N. D. XXV. p. 211. — Id. Enc. p. 784. — Id. Gal. Ois. II. p. 97. t. 74. — Temm. Pl. col. 118. — Less. Trait. p. 367. — Gray Gen. B. I. p. 277. — Bp. Consp. I. p. 175. gen. 339. — Burm. Th. Bras. II. p. 433. — *Phibalura cristata* Sws. Z. Ill. t. 31. — Id. Class. B. II. p. 251. — *Pipra chrysopogon* „Licht." Wagl. Isis 1830. p. 930. 4. —

Brasilien — ♂ ad., 2 ♂ jun., ♀ — 4 St.

Gen. EUCHLORORNIS *) Filippi 1846. — Schild-Zuser.

Pipreola (!) Sws. 1838. *Euchlornis* (!) *) Filippi 1846. *Pyrrhorhynchus* Bp. 1850. *Pyrorhynchus* Id. 1854.

317. 1. E. Riefferi Nob.

Ampelis Riefferi Boiss. R. Z. 1840. p. 3. — *Pyrrhorhynchus Riefferi* Bp. Consp. I. p. 177. gen. 345. 2. — *Pipreola Riefferi* Scl. B. Bogot. p. 25. 252. — *Pyrorhynchus Riefferi* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 44. 13. —

Neu-Granada — ♂, ♀ — 2 St.

318. 2. E. melanolaema Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 45. 99. — *Pipreola melanolaema* Scl. Ann. & Mag. Nat. Hist. June 1856. Descr. eight new sp. S.-Amer. B. p. 3. 7. —

Venezuela — ♂, ♀ — 2 St.

319. 3. E. formosa Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 45. 96. — *Ampelis formosa* Hartl. R. & Mag. Z. 1849. p. 493. t. 14. 1. — *Pyrrhorhynchus formosus* Bp. Consp. I. p. 177. gen. 345. 5. —

Porto Cabello — 2 ♂ ad., ♂ juv., ♀ — 4 St.

320. 4. E. aureipectus Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 45. 95. — *Ampelis aurei-*

*) Wir haben uns vergeblich bemüht, eine bessere Etymologie des Namens *Euchlornis* (!) aufzufinden, als die von εὖ, χλωρός und ὄρνις, und berichtigen desshalb denselben in diesem Sinne. —

pectus Lafr. R. Z. 1843. p. 68.— Id. Mag. Z. 1843. t. 39.— *Pyrrhorhynchus aureipectus* Bp. Consp. I. p. 177. gen. 345. 4. — *Pipreola aureipectus* Scl. P. Bogot. p. 25. 263. —

Porto Cabello — ♂ ad., ♂ juv.; Caracas — ♂ juv., 2 ♀ — 5 St.

Gen. AMPELIO Cab. 1845. — Kappen-Zuser.

Ampelion (!) Cab. 1845. *Carpornis* Gray 1846.

321. 1. A. cucullatus Cab.

Tsch. Faun. Per. p. 137. — Burm. Th. Bras. II. p. 432. — *Procnias cucullata* Sws. Z. Ill. I. p. 37. — *Ampelis cucullata* Temm. Pl. col. 363. — Less. Trait. p. 363. 1. — *Carpornis cucullata* Gray Gen. B. I. p. 279. 2. — Bp. Consp. I. p. 176. gen. 342. 2. —

Rio Grande — ♂ ad., ♂ jun.; Brasilien — ♂ ad. — 3 St.

322. 2. A. melanocephalus Cab.

Tsch. Faun. Per. p. 137. — Burm. Th. Bras. II. p. 432. — *Procnias melanocephala* Sws. Z. Ill. t. 25. — Wied Reis. Bras. I. p. 168. — *Ampelis melanocephala* Id. Beitr. III. p. 401. — „*Cotinga speciosa* Thunb." Griff. Anim. Kingd. I. p. 507. — *Carpornis melanocephala* Gray Gen. B. I. p. 279. 1. — Bp. Consp. I. p. 176. gen. 342. 1. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ — 4 St.

Gen. HELIOCHERA *) Filippi 1846. — Schopf-Zuser.

323. 1. H. rubrocristata Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 49. 105. — *Ampelis rubrocristata* Orb. & Lafr. Syn. p. 39. 1. — Orb. Voy. p. 297. 194. t. 31. 1. — *Ampelis rufocristata* Boiss. R. Z. 1840. p. 3. — *Ampelion rubrocristatus* Cab. Tsch. Faun. Per.

*) Auch hier ist es uns nur nach langem Nachsinnen geglückt eine wenigstens einigermaassen denkbare Etymologie dieses Namens aufzufinden; sollte derselbe nämlich vielleicht von ἥλιος (Sonne, Glanz) und χήρα (Wittwe, entbehrend) herkommen und somit mit *Lipaugus* ungefähr gleichbedeutend sein? — Als zweite Art stellt Bonaparte a. a. O. hierher:

2. *H. rufaxilla* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 5. gen. 49. 106. — *Ampelis rufaxilla* Tsch. Consp. p. 10. 48. — *Ampelion rufaxillus* Id. Faun. Per. p. 137. t. 7. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 433 Anm. 3. — *Cotinga rufaxilla* Gray Gen. B. I. p. 279. 11 (Peru). —

p. 137. — Scl. B. Bogot. p. 24. 258. — *Carpornis rubra cristata* Gray Gen. B. I. p. 279. 4. — Bp. Consp. I. p. 176. gen. 341. 3. — *Ampelion rufocristatus* Burm. Th. Bras. II. p. 433 Anm. 4. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

Gen. AMPELIS *) Lin. 1735. — Cotinga.

Cotinga (!) Briss. 1760. *Ampelis* Ill. 1811 & Vieill. 1816.

324. 1. A. cotinga Lin.

S. N. p. 298. 4. — Less. Trait. p. 364. 4. — Burm. Th. Bras. II. p. 430 Anm. 2. — *Cotinga* Briss. Av. II. p. 340. 1.—*Cotinga bleu* Buff. Pl. enl. 186.—Levaill. Hist. Nat. Ois. nouv. & rar. Amér. & Ind. p. 74. t. 34, p. 76. t. 35 & p. 78. t. 36 (♂ ad., ♀ & ♂ juv.).— *Ampelis caerulea* Vieill. Enc. p. 760. 2. — Id. Gal. Ois. II. p. 183. t. 116. — Temm. Tabl. méth. p. 21. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 55. — *Cotinga caelestis* Gray List Gen. B. p. 46. — Bp. Consp. I. p. 175. gen. 340. 1. — *Cotinga caerulea* Gray Gen. B. I. p. 279. 1. — *Ampelis cotinga* ♀ *caerulea* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 693. 127-128. —

Guiana — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

325. 2. A. cincta Bodd.

Tabl. Pl. enl. 188. — Burm. Th. Bras. II. p. 430. — *Cotingae var.* Briss. Av. II. t. 34. 1. — *Cotinga cordon-bleu* Buff. Pl. enl. 188. — Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p.

*) Nach Gray's Vorgang wird in neuerer Zeit häufig *Ampelis* Lin. auf *Bombycilla* Vieill. angewandt, während für *Ampelis* Auct. der brisson'sche Name *Cotinga* (!) gebraucht wird. Indessen verfährt Gray hier, wie öfter, zu ängstlich nach dem durchaus nicht immer richtigen Gesetze, die erste Art einer Gattung als deren Typus zu betrachten, wodurch oft Gattungen eine ganz andere Bedeutung erhalten würden, als die ihnen ursprünglich beigelegte. Wollte Gray z. B. bei allen linnéischen Gattungen immer die erste Art als Typus ansehen, so würde er, um eonsequent zu sein, *Pipra* für *Rupicola* Vieill. nehmen müssen, da *Pipra rupicola* dann Typus des Genus *Pipra* Lin. wäre, und manche ähnliche Fälle würden sich noch finden lassen. Unserer Ansicht nach kann vielmehr derjenige, welcher von einer bestehenden Gattung eine neue abzweigt, falls nicht ausdrücklich ein Typus angegeben ist, von den darin enthaltenen Arten die, welche er gerade will, herausnehmen, wird jedoch gut thun, das Gros der Species bei dem alten Genus zu lassen und nur auf allen Seiten die abweichenden einzelnen Formen generisch zu sondern. Nach diesem Grundsatze scheinen auch Illiger, Vieillot, Temminck u. A. verfahren zu sein, wenn sie für die nur einzeln dastehende *Ampelis garrula* Lin. den brisson'schen Namen *Bombycilla* adoptirten und bei *Ampelis* alle von Brisson *Cotinga* genannten Arten liessen, da dieselben die grosse Mehrzahl des Genus *Ampelis* Lin. bildeten und somit als typische, characteristische Formen desselben zu betrachten waren. —

91. t. 41-42. — *Ampelis superba* Shaw Nat. Misc. t. 817 & 821. — *Ampelis cotinga* Vieill. (nec Lin.) Enc. p. 761. 5.— Wied Beitr. III. p. 391.— Temm. Tabl. méth. p. 21.— Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 56. — *Ampelis cotinga var.* Less. Trait. p. 364. 4. t. 56. 1. — *Cotinga cincta* Gray Gen. B. I. p. 279. 2. — *Cotinga caerulea* Bp. (nec Vieill.) Consp. I. p. 175. gen. 340. 2. —

Brasilien — ♂, ♀ — 2 St.

326. 3. A. cayana Lin.

S. N. p. 298. 6. — Vieill. Enc. p. 764. 16. — Less. Trait. p. 364. 6. — Orb. & Lafr. Syn. p. 40. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 429. — *Cotinga de Cayenne* Buff. Pl. enl. 624. — *Cotinga quereïva* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 59. t. 27, p. 62. t. 28-29 & p. 64. t. 30 (♂ad., ♂ jun., ♂ juv. & ♀).— *Cotinga cayana* Gray Gen. B. I. p. 279. 7.— Bp. Consp. I. p. 175. gen. 340. 4. — *Ampelis cayennensis* Orb. Voy. p. 297. 193. —

Cayenne — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

Gen. XIPHOLENA Glog. 1842. — Pompadour-Cotinga.

327. 1. X. pompadora Cab.

Orn. Not. 233. — Id. Schomb. Reis. Guian. III. p. 693. 125. — Bp. Consp. I. p. 176. gen. 341. 1. — *Ampelis pompadora* Lin. S. N. p. 298. 2. — Vieill. Enc. p. 764. 14. — Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 9. t. 3. — Less. Trait. p. 363. 2. — Burm. Th. Bras. II. p. 429. — *Cotinga pourpre* Buff. Pl. enl. 279 (♂ ad.). — *Cotinga gris de Cayenne* Id. l. l. 699 (♂ juv.). — *Ampelis grisea* Bodd. Tabl. Pl. enl. 699 (♂ juv.). — *Lanius nengeta var. β* Gm. S. N. p. 298. 7. — *Cotinga pacapaca* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 68. t. 31, p. 70. t. 32 & p. 73. t. 33 (♂ ad., ♀ & ♂ juv.). — *Ampelis cinerea* Vieill. Enc. p. 762 (♂ juv.). — *Ampelis macroura* Temm. — *Cotinga pompadora* Gray Gen. B. I. p. 279. 4. —

Surinam — ♂ ad.; Guiana — ♂ jun.; Cayenne — ♂ juv. — 3 St.

328. 2. X. purpurea Cab.

Orn. Not. p. 233. — *Ampelis purpurea* Licht. Doubl. p 57. 583. — Wied Beitr. III. p. 397. — Burm. Th. Bras. II. p. 428. — *Ampelis atropurpurea* Wied Reis. Bras. I. p. 262 & 275. — *Ampelis porphyrio* Less. Trait. p. 363. 2 var. — *Cotinga purpurea* Gray Gen. B. I. p. 279. 5. — *Iipholena atropurpurea* Bp. Consp. I. p. 176. gen. 341. 2. —

Brasilien — 2 ♂ ad., 3 ♂ jun., ♂ juv., 3 ♀ — 9 St.

Subfam. GYMNODERINÆ. Kropfvögel.

Gen. THRENOEDUS Glog. 1842. — Piauhau.

Querula (!) Vieill. 1816. *Ampelis* Cuv. 1817 (nec Lin. 1766).

329. 1. T. cruentus Nob.

Grand gobe-mouche noir de Cayenne Buff. Pl. enl. 381.— *Muscicapa cruenta* Bodd. Tabl. Pl. enl. 381. — *Muscicapa rubricollis* Gm. S. N. p. 933. 31. — Burm. Th. Bras. II. p. 419 Anm. 1. — *Piauhau* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 105. t. 47—48 (♂ & ♀). — *Muscicapa porphyrobrancha* Shaw Nat. Misc. t. 60. — *Querula rubricollis* Vieill. Enc. p. 768. 2. — Id. Gal. Ois. II. p. 181. t. 115. — Less. Trait. p. 363. 3. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 351. 1. — *Coracina rubricollis* Temm. Tabl. méth. p. 20. — Burm. Verz. Mus. Hal. p. 48. — *Querula cruenta* Gray Gen. B. I. p. 239. 1. — *Threnoedus rubricollis* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 691. 121. —

Cayenne — 2 ♂, ♀; Surinam ♀ — 4 St.

Gen. HAEMATODERUS Bp. 1854. — Blut-Piauhau.

330. 1. H. militaris Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 38. 83. — *Coracias militaris* Lath. Ind. Orn. — *Grand Cotinga* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 56. t. 25 & p. 57. t. 26 (♂ ad.& juv.?).— *Querula rubra* Vieill. N. D. VIII. p. 161. — Id. Enc. p. 768. 11. — *Querula purpurea* Less. Trait. p. 362. 1. — *Querula militaris* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 47. — Gray Gen. B. I. p. 239. 2. — Bp. Consp. I. p. 179. gen. 351. 2. — *Threnoedus militaris* Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 690. 120. — *Coracina militaris* Burm. Th. Bras. II. p. 419 Anm. 2. —

Venezuela — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. CHASMORHYNCHUS Temm. 1820. — Hämmerling.

?*Averanus* (!) Rafinq. 1815. *Casmarhynchus* (!) Temm. 1820. *Averano* (!) & *Arapunga* (!) Less. 1831. *Procnias* Gray 1841 (nec Ill. 1811). *Eulopogon* Glog. 1842.

331. 1. C. variegatus Temm.

Pl. col. 51. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 346. 1. — Burm. Th. Bras. II. p. 428 Anm. 2. — *Ampelis variegata* Gm.

S. N. p. 841. 10. — Vieill. Enc. p. 760. 1. — Id. Gal. Ois. II. p. 184. — *Ampelis averano* Id. l. l. t. 117. — *Averano carnobarba* Less. Trait. p. 365. t. 52. 1. — *Procnias variegata* Gray List Gen. B. p. 46. — Id. Gen. B. I. p. 280. 1. — Gen. *Eulopogon* Glog. Hand- & Hilfsb. Nat. Gesch. p. 321. —

Porto Cabello — 2 ♂ ad., 2 ♀ juv. — 4 St.

332. 2. C. nudicollis Temm.

Pl. col. 368 & 383. — Wied Beitr. III. p. 377. — Burm. Th. Bras. II. p. 426. — *Ampelis nudicollis* Vieill. N. D. VIII. p. 164. — Id. Enc. p. 762. 8. — *Ampelis alba* Thunb. Mém. Soc. Mosc. 1823. p. 177. — *Chasmarhynchus ecarunculatus* Spix Av. Bras. II. p. 3. t. 4. — *Procnias nudicollis* Wied Reis. Bras. I. p. 52 & II. p. 158. — *Arapunga nudicollis* Less. Trait. p. 365. 1. — *Procnias alba* Gray Gen. B. I. p. 280. 2. — *Chasmorhynchus albus* Bp. Consp. I. p. 178. gen. 346. 2. — *Arapunga alba* Id. Consp. Vol. Anis. p. 4. gen. 43. 89. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., ♀ — 3 St.

333. 3. C. niveus Nob.

Cotinga blanc Buff. Pl. enl. 793—794. — *Ampelis nivea* Bodd. Tabl. pl. enl. 793—794. — *Ampelis carunculata* Gm. S. N. p. 841. 9. — Vieill. Enc. p. 762. 10. — *Cotinga caronculé ou Guirapunga* Levaill. Hist. Nat. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 86. t. 39 & p. 89. t. 40. — *Casmarhynchus carunculatus* Temm. Tabl. méth. p. 21. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 692. 124. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 346. 3. — Burm. Th. Bras. II. p. 427 Anm. 1. — *Arapunga carunculata* Less. Trait. p. 366. 2. — *Procnias nivea* Gray Gen. B. I. p. 280. 3. —

Guiana — ♂ ad., ♂ jun., ♂ juv., ♀ — 4 St.

Gen. GYMNODERUS Geoffr. 1809. — Kahlhals.

Coracina pt. Vieill. 1816. *Gymnodera* Less. 1831.

334. 1. G. foetidus „Strickl.“

Gray List Gen. B. p. 52. — Id. Gen. B. II. p. 319. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 691. 123. — Burm. Th. Bras. II. p. 425. — *Gracula foetida* Lin. S. N. p. 164. 3. — *Col-nud de Cayenne* Buff. Pl. enl. 609. — *Corvus nudicollis* Bodd. Tabl. Pl. enl. 609. — *Corvus nudus* Gm. S. N. p. 371. 30. — *Gracula nuda* ♀ *foetida* Lath. Ind. Orn. I. p. 190. 4—5. — *Col-nu* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 101. t. 45. & p. 104. t. 46 (♂ & ♀). — *Gracula nudicollis* Shaw. — *Gymnoderus cayennensis* Geoffr. Ann.

Mus. XIII. p. 237. — *Coracina gymnodera* Vieill. Enc. p. 769. 1. — Id. Gal. Ois. II. p. 178. 112. — *Ampelis nudicollis* Licht. Doubl. p. 56. 582. — *Gymnoderus nudicollis* Less. Trait. p. 362. — *Coracina nuda* Temm. Tabl. méth. p. 20. — *Coracina foetida* Bp. Consp. I. p. 178. gen. 347. 1. —

Guiana — ♂; Brasilien — ♂, ♀ — 3 St.

Gen. GYMNOCEPHALUS Geoffr. 1809. — Kapucinervogel.

Calvifrons Daud. 18??.

335. 1. G. calvus Hahn

Abb. & Beschreib. ausl. Vög. Lief. 2. t. 4. — Gray Gen. B. II. p. 319. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 690. 119. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 349. — Burm. Th. Bras. II. p. 423. — *Choucas chauve* Buff. Pl. enl. 521. — *Corvus calvus* Gm. S. N. p. 372. 31. — *Chauve* Levaill. Ois. rar. Amér. & Ind. p. 108. t. 49. — *Gymnocephalus capucinus* Geoffr. Ann. Mus. XIII. p. 237. — Less. Trait. p. 359. t. 41. 1. — *Coracina gymnocephala* Vieill. Enc. p. 770. 3. — *Ampelis calva* Licht. Doubl. p. 56. 581. — *Coracina calva* Temm. Tabl. méth. p. 20. —

Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PYRODERUS Gray 1840. — Kropfvogel.

Coracina Less 1831 & Sws. 1837 (nec Vieill. 1816).

336. 1. P. granadensis Gray

Gen. B. II. p. 317. 2. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 350. 2. — Scl. B. Bogot. p. 25. 266. — *Coracina granadensis* Lafr. R. Z. 1846. p. 277. —

Neu-Granada — ♂ — 1 St.

337. 2. P. orenocensis Gray

Gen. B. II. 317. 3. t. 77. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 350. 3. — *Coracina orenocensis* Lafr. R. Z. 1846. p. 277. —

Caracas — 2 ♂ ad., ♂ juv. — 3 St.

338. 3. P. scutatus Gray

List Gen. B. p. 52. — Hartl. Ind. Azar. p. 4. — Gray Gen. B. II. p. 317. 1. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 350. 1. — *Urraca degollada* Azar. Apunt. no. 56. — *Coracias scutata* Shaw. — Wagl. Syst. Av. I. p. 216. 11. — *Coracina rubricollis* Vieill. N. D. VIII. p. 7. — Id. Enc. p. 771. 7. —

Ampelis sanguinicollis Licht. Doubl. p. 56. 580. — *Coracina scutata* Temm. Pl. col. 40. — Wied Beitr. III. p. 406. — Less. Trait. p. 361. — Sws. Class. B. II. p. 267. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 13. t. 2. — Lafr. R. Z. 1846. p. 276. — Bur. Th. Bras. II. p. 417. —

Brasilien — ♀ — 1 St.

Gen. CEPHALOPTERUS *) Geoffr. 1809. — Schirmträger.

Coracina Temm. 1820 (nec Vieill. 1816).

339. 1. C. ornatus Geoffr.

Ann. Mus. XIII. p. 235. t. 15. — Less. Trait. p. 361. t. 41. 2. — Pöpigg Froriep's Notiz. 1831. no. 687 Beilage. — Küst. Atl. ausl. Vög. Lief. 13. t. 2. — Orb. Voy. p. 296. 191. — Tsch. Consp. p. 11. 52. — Id. Faun. Per. p. 141. — Gray Gen. B. II. p 319. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 691. 122. — Bp. Consp. I. p. 178. gen. 348. — *Coracina cephaloptera* Vieill. N. D. VIII. p. 5. — Id. Enc. p. 772. 9. — Id. Gal. Ois. II. p. 179. t. 114. — Temm. Pl. col. 255. — *Coracina ornata* Spix Av. Bras. I. p. 63. t. 59. — Burm. Th. Bras. II. p. 420. —

Guiana — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

*) Hierher gehören noch die beiden neuentdeckten Arten:

2. *C. penduliger* Scl. Ibis 1859. p. 114. t. 3 (Ecuador);
3. *C. glabricollis* Gould P. Z. S. 1851 (Central-America). —

Fam. PHYTOTOMIDÆ. Pflanzenmäder.

Gen. PHYTOTOMA Molina 1782. — Pflanzenmäder.

340. 1. P. rara Molina

Sag. Ist. Nat. Chil. p. 226. — Gm. S. N. p. 928. 1. — Vieill. Enc. p. 903. 1. — Less. Trait. p. 449. — Orb. Voy. p. 293. 187.— Tsch. Consp. p. 11. 48. — Id. Faun. Per. p. 139. — Gray Gen. B. II. p. 390. 1. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 205. 1. — *Phytotoma Bloxhami* „Children" Griff. Anim. Kingd. II. p. 319. — Jard. & Selby Ill. Orn. I. t. 4 (♀). — *Phytotoma silens* Kittl. Ein. Vög. Chil. p. 3. t. 1. 1—2. — Lafr. Mag. Z. 1832. cl. XI. t. 5. — *Plytotoma Molinae* Less. Inst. 1834. no. 74. p. 316. 2. — *Phytotoma rara* ♀ *Bloxhami* Jard. & Selby Ill. Orn. I. Syn. no. 1 & 3 (♂ & ♀). —

Chile — ♂, ♀; Araucana — ♂, ♀ — 4 St.

341. 2. P. rutila Vieill.

N. D. XXVI. p. 64. — Id. Enc. p. 903. 2.— Jard. & Selby Ill. Orn. I. Syn. no. 2.— Orb. Voy. p. 293. 186. t. 29. 1.— Hartl. Ind. Azar. p. 6. — Gray Gen. B. II. p. 390. 3. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 205. 3. — *Habia dentudo* Azar. Apunt. no. 91. —

Montevideo — ♂ — 1 St.

342. 3. P. angustirostris Orb. & Lafr.

Syn. p. 37. 2. — Orb. Voy. p. 292. 185. t. 29. 2. — Gray Gen. B. II. p. 390. 2. — Bp. Consp. I. p. 86. gen. 205. 2. —

Peru — ♂ — 1 St.

Fam. PRIONITIDÆ. Sägeracken.

Gen. SPATHOPHORUS *) Nob. — Pracht-Motmot.

Eumomota (!) Scl. 1857.

343. 1. S. superciliaris Nob.

Crypticus superciliaris Sandb. MSS. — Bp. Consp. I. p. 165. gen. 314. 1. — *Prionites superciliaris* Jard. & Selby Ill. Orn. IV. t. 18. — *Crypticus superciliosus* Sws. Two Cent. p. 358. 223.—Less. Descript. Mammif. & Ois. p. 267.— *Crypticus apiaster* Less. R. Z. 1842. p. 174. — *Momotus superciliaris* Gray Gen. B. I. p. 68. 10. — Id. List. Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 40. 7.— *Momotus yucatanensis* Cabot Proc. Nat. Hist. Soc. Bost. 1843. p. 156 & 1844. p. 466. — Gray Gen. B. I. p. 68. 13. — *Prionites yucatanensis* Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 7. — *Eumomota superciliaris* Scl. P. Z. S. 1857. 24 Novemb. Rev. spec. fissirostr. Fam. Momot. p. 10. 1. — Id. Ibis. 1859. p. 132. 214.— *Hylomanes superciliaris* Licht. in Mus. Berol. —

Guatimala — ♂ — 1 St.

Gen. CRYBELUS *) Nob. — Mittel-Motmot.

Momotus (!) Bp. 1854 (nec Briss. 1760). *Baryphonus* Id. 1854 (nec Vieill. 1816).

344. 1. C. mexicanus Nob.

Momotus mexicanus Sws. Syn. B. Mexic. p. 442. 101. —

---

*) Von σπάθη (Spatel) und φέρω (tragen). —

*) Von κρύβηλος = κρυπτικός. Nur noch 2 Arten sind hierher zu stellen:

2. *C. castaneiceps.* — *Prionites castaneiceps* Gould P. Z. S. 1854. p. 154.— *Momotus castaneiceps* Scl. Rev. Momot. p. 7. 10 (Central-America);

3. *C. Marti.* — *Prionites Martii* Spix Av. Bras. II. p. 64. t. 60. — Tsch. Consp. p. 39. 215. — Id. Faun. Per. p. 252. — *Momotus Martii* Gray Gen. B. I. p. 68. 6. — *Momotus semirufus* Scl. R. & Mag. Z. 1853. p. 489. — Id. B. Bogot. p. 8. 23. — Id. Rev. Momot. p. 7. 11. — *Baryphonus semirufus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 94. 225 (Neugranada, Peru, Amazonenstrom u. s. w.). —

Gray Gen. B. I. p. 68. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 40. 6.— Less. Descript. Mammif. & Ois. p. 266.— Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 94. 224. — Scl. Rev. Momot. p. 6. 9. — *Prionites Martii* Sws. (nec Spix) Z. Ill. II. t. 81. — *Momotus Martii* Jard. & Selby (nec Spix) Ill. Orn. I. t. 23. — *Prionites mexicanus* Id. Class. B. II. p. 338. — Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 6. —

Mexico — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. PRIONITES *) Ill. 1811. — Motmot.

Rhamphastus pt. Lin. 1748. *Momotus* (!) Briss. 1760. *Baryphonus* Vieill. 1816.

345. 1. P. caeruliceps Gould

P. Z. S. 1836. p. 18. — Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 3. — *Prionites caeruleocephalus* (!) Jard. & Selby Ill. Orn. IV. t. 42. — *Momotus caeruliceps* Gray Gen. B. I. p. 68. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 39. 4. — Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 265. — Scl. Rev. Momot. p. 6. 8. — *Momotus subhutu* Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 265. —

Xalapa — ♂, 2 ♀ — 3 St.

346. 2. P. Lessoni Bp.

Consp. I. p. 165. gen. 315. 9. — *Prionites momotus* Bp. (nec Ill.) P. Z. S. 1847. p. 114. 3. — *Momotus Lessonii* Less. R. Z. 1842. p. 174. — Gray Gen. B. I. p. 68. 12. — Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 266. — Des Murs Iconogr. Orn. livr. 11. 2. t. 62.— Scl. Rev. Momot. p. 6. 7.— Id. Ibis 1859. p. 131. 211. — ?*Momotus psalurus* Bp. Compt. Rend. 1854. XXXVIII. p. 659. — Id. Not. Orn. p. 88. — Scl. Rev. Momot. p. 12. 2. — ?*Prionites psalurus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 94. 229. —

Guatemala — ♂ jun. — 1 St.

---

*) Es bleiben bei dieser Gattung noch:

6. *P. Nattereri.* — ?*Momotus brasiliensis* Orb. & Lafr. (nec Lath.) Syn. p. 34. — *Momotus Nattereri* Scl. Rev. Momot. p. 4. 4 (Goyaz und Bolivien);

7. *P. aequatorialis.* — *Momotus aequatorialis* Gould P. Z. S. 1857. p. 223. — Scl. Rev. Momot. p. 3. 3 (Ecuador);

8. *P. bahamensis* Sws. Two Cent. p. 332. 154. — Jard. & Selby Ill. Orn. IV. t. 45. — Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 2. — *Momotus bahamensis* Gray Gen. B. I. p. 68. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 39. 2. — Scl. Rev. Momot. p. 5. 6 (Antillen, Tobago und Trinidad). —

347. 3. P. microstephanus Nob.

Momotus brasiliensis Scl. (nec Lath.) P. Bogot. p. 7. 22.— *Momotus microstephanus* Id. Rev. Momot. p. 4. 3. —
Chamicuros — ♂ — 1 St.

348. 4. P. subrufescens Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 94. 227. — *Momotus subrufescens* Scl. P. & Mag. Z. 1853. p. 489. — Id. Rev. Momot. p. 5. 5. — *?Prionites parvirostris* Bp. Not. Orn. p. 89. — Id. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 94. 231. — *?Momotus parvirostris* Scl. Rev. Momot. p. 13. 3. —
Cartagena — ♂ — 1 St.

349. 5. P. momota Ill.

Prodr. Syst. Mamm. & Av. p. 224. gen. 50. — Hahn Abb. & Beschr. ausl. Vög. Lief. 2. t. 3. — Less. Trait. p. 251. t. 53. 2. — Tsch. Consp. p. 38. 213. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 704. 176. — Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 1. — *Rhamphastus momota* Lin. S. N. p. 152. 8. — *Motmot du Brésil* Buff. Pl. enl. 370. — *Momotus brasiliensis* Lath. Ind. Orn. I. p. 140. — Vieill. Enc. p. 299. 1. — Gray Gen. B. I. p. 68. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 39. 1. — Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 264. — Scl. Rev. Momot. p. 3. 1. — *Motmot ou Houtou* Levaill. Hist. Nat. Ois. Parad., Roll., Touc. & Barb. I. p. 108. t. 37-38. — *Momotus cyanocephalus* Vieill. N. D. XXI. p. 315. — *Momotus momota* Jard. & Selby Ill. Orn. II. Syn. no. 1. — *Prionites brasiliensis* Sws. Class. B. II. p. 388. — Tsch. Faun. Per. p. 251. — Burm. Th. Bras. II. p. 412. —
Guiana — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. BARYPHTHENGUS *) Nob. — Taquara.

Baryphonus Bp. 1854 (nec Vieill. 1816).

350. 1. B. ruficapillus Nob.

Tutu Azar. Apunt. no. 52. — *?Motmot dombé* Levaill. Ois. Par., Roll. & c. I. p. 113. t. 39.—Scl. Rev. Momot. p. 11. 1.— *Motmot orangroux* Levaill. Hist. Nat. Promer. & Guêp. Ill. Suppl. p. 41. t. B. — *?Baryphonus ruficapillus* Vieill. N. D. XXI. p. 315. — Id. Enc. p. 898. 2. — Id. Gal. Ois.

*) Von *βαρύφθεγγος* = *βαρύφωνος* (mit tiefer Stimme). —

II. p. 319. t. 190. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 94. 226. — *Baryphonus cyanogaster* Vieill. N. D. XXI. p. 317. — Id. Enc. p. 898. 3. — *Prionites ruficapillus* „Ill." Licht. Doubl. p. 21. 206.— Wied Beitr. III. p. 1257.—Tsch. Consp. p. 38. 214. — Id. Faun. Per. p. 251. — Hartl. Ind. Azar. p. 4. — ?Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 4. — *Prionites tutu* Ranz. Elem. Zool. III. 3. p. 157. — ?Less. Trait. p. 251. 2. — *?Prionites dombeyanus* Ranz. Elem. Zool. III. 3. p. 158. — *Prionites rubricapillus* Steph. Gen. Z. XIV. p. 84. — *?Momotus Dombeyi* Less. Man. Orn. II. p. 103. — *Momotus Levaillantii* Id. Descr. Mammif. & Ois. p. 265 — Gray Gen. B. I. p. 68. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 39. 4. — *?Prionites Dombeyi* Sws. Class. B. II. p. 338. — *?Momotus ruficapillus* Gray Gen. B. I. p. 68. 4. — *Momotus tutu* Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 265. — *Prionites Levaillantii* Bp. Consp. I. p. 165. gen. 315. 5. — *Momotus cyanogaster* Scl. Rev. Momot. p. 8. 12. —

Long. tot. 1′ 4″ 5‴, al. 5″ 6‴, caud. 9″, rostr. culm. 1″ 8‴, pil. ruf. 2″ 6‴. pect. & ventr. ruf. 2″ 3‴. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

351. 2. B. melancholicus nov. sp.

Similis praecedenti, sed maior, rostro breviore, minus serrato: supra obscurius caerulescente-viridis, pileo intensius rufo tincto altius in dorsum descendente; subtus crisso caerulescente-viridi, pectore ventreque latissime usque ad tibias rufis, gutture virescente-rufo. — Long. tot. 1′ 6″, al. 6″, caud. 8″ 9‴, rostr. culm. 1″ 5‴, pil. ruf. 3″, pect. & ventr. ruf. 3″. —

?Buenos Ayres — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

Fam. CORACIIDÆ. Rackenvögel.

Subfam. CORACIINÆ. Racken.

Gen. CORACIAS *) Lin. 1735. — Racke.

Galgulus Briss. 1760 & Vieill. 1816. *Coracias* & *Galgulus* Rchb. 1852. *Coraciura* & *Coracias* Bp. 1854.

352. 1. C. cyanogaster Cuv.

Regn. Anim. I. p. 401. — Wagl. Syst. Av. I. p. 215. 6. — Less. Trait. p. 355. 4. — Jard. & Selby Ill. Orn. III. t. 123. — Swns. B. W.-Afr. II. p. 108. t. 13. — Gray Gen. B. I. p. 62. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 34. 6. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 9. — Rchb. Handb. I. p. 48. 111. t. 432. 3683-84. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 1. 65. — Id. Orn. Westafr. p. 30. 82. — *Rollier à ventre bleu* Levaill. Hist. Nat. Ois. Parad., Roll. & c. p. 78. t. 26. — *Galgulus cyanogaster* Vieill. N. D. XXIX. p. 436. — Id. Enc. p. 870. 15. — *Coraciura cyanogastra* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 82. 202. —

Senegambien — ♂ — 1 St.

353. 2. C. caudatus Lin.

S. N. p. 160. 6. — Wagl. Syst. Av. I. p. 216. 10. — Pucher. R. Z. 1845. p. 371. — Desmurs Icongr. Orn. livr. 5. 1-2. t. 28. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 2. — Rchb. Handb. I. p. 47. 110. t. 432. 3182. — Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 400 61. — Id. Orn. Westafr. p. 30. 80. — *Rollier d'Angola* Buff. Pl. enl. 88. — *Coracias angolensis* Shaw Gen. Zool. VII. p. 394. t. 51. — *Coracias natalensis* Licht. Verz. Säugeth. & Vög. Kaffernl. 1842. p. 16. 158—159.—

*) Sonderbarer Weise wird *Coracias* fast immer irrthümlich nach Linné's Vorgange als weiblich gebraucht, während es doch vom griechischen ὁ κορακίας herkommend entschieden männlich ist. —

Coraciura caudata Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 86. 203. —

Mozambique — ♂ — 2 St.

354. 3. C. abyssinicus Gm.

S. N. p. 379. 7. — Cuv. Règn. Anim. I. p. 401. — Desmurs Iconogr. Orn. livr. 5. 2. — Bp. Consp. I. 167. gen. 318. 3. — Strickl. P. Z. S. 1850. p. 216. — Rchb. Handb. I. p. 46. 108. t. 431. 3181. — Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 400. 62. — Heugl. Übers. Vög. N.-O.-Afr. p. 17, 125. — Hartl. Orn. Westafr. p. 30. 81. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 571. 854. — *?Rollier du Senegal* Buff. Pl. enl. 326. — *Rollier d'Abyssinie* Id. l. l. 626. — *?Coracias senegalensis* Gm. S. N. p. 379. 8. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 4. — Rchb. Handb. I. p. 47. 109. t. 435. 3188. — *? Coracias senegala* Lath. Ind. Orn. I. p. 169. — *Rollier à long brins d'Afrique* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 75. t. 25. — *Coracias albifrons* Shaw Gen. Z. VII. p. 392. — *Galgulus caudatus* Vieill. N. D. XXIX. p. 433. — Id. Enc. p. 868. 8. — *Coracias caudata* Wagl. (nec Lin.) Syst. Av. p. 213. 2. — Less. Trait. p. 55. 5. — Gray Gen. B. I. p. 62. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 34. 5. — *Coraciura abyssinica* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 86. 204. —

Senegambien — ♂; Abyssinien — ♂, ♀ — 3 St.

355. 4. C. garrulus Lin.

S. N. p. 159. 1. — Naum. Vög. Deutschl. II. p. 158. 56. t. 60. 1-2. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 160. t. 9. 5. — Wagl. Syst. Av. p. 213. 1. — Less. Trait. p. 354. 1. t. 49. 1. — Gould B. Eur. t. 60. — Blas. & Keys. Wirbelth. Eur. p. 35. 75. — Gray Gen. B. I. p. 62. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 331. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 40. 1. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 51. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 1. — Rchb. Handb. I. p. 45. 107. t. 431. 3179-80. — Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 400. 60. — Brehm l. l. p. 454. — Hartl. Orn. Westafr. p. 29. 79. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 571. 853. — *Galgulus* Briss. Av. II. p. 64. 1. t. 5. 2. — *Rollier* Buff. Pl. enl. 486. — *Rollier vulgaire* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 90. t. 32 & p. 94 t. 33. — *Galgulus garrulus* Vieill. N. D. XXIX. p. 428. — Id. Enc. p. 866. 1. — *Coracias germanicus* Brehm Vög. Deutschl. I. p. 158. — *Coracias planiceps* Id. l. l. p. 159. —

Harz — 2 ♂ ad., ♀ ad., ♂ jun.; Pommern — ♀ jun. — 5 St.

356. 5. C. pilosus Lath.

Ind. Orn. Suppl. p. 27. — Gray List Spec. B. Brit. Mus.

II. 1. p. 34. 4. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 7. — Rchb. Handb. I. p. 49. 113. t. 433. 3184. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 1. 63. — Id. Orn. Westafr. p. 30. 81. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 571. 855. — *Rollier varié d'Afrique jeune âge* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 84. t. 29. — *Coracias crinita* Shaw Gen. Z. VII. p. 401. — *Galgulus pilosus* Vieill. N. D. XXIX. p. 430. — Id. Enc. p. 867. 4. — *Coracias naevia* Licht. (nec Vieill.) Doubl. p. 20. 196. — *Coracias naevia juven.* Wagl. Syst. Av. p. 214. 3. — *Coracias nuchalis* Sws. B. W.-Afr. II. p. 110. — Gray Gen. B. I. p. 62. 7. — *Coracias Levaillanti* Rüpp. Syst. Übers. p. 23. 85. — *Coracias crinita & nuchalis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 87. 208—209. —

Senegambien — ♂; Abyssinien — ♀ 2 St.

357. 6. C. bengalensis Lin.

S. N. p. 159. 6. — Cuv. Règn. Anim. I. p. 401. — Tickell Journ. A. S. B. 1848. p. 301. — *Galgulus mindanoënsis* Briss. Av. II. p. 69. 2. t. 6. 1. — *Rollier de Mindanao* Buff. Pl. enl. 285. — *Rollier varié d'Afrique* (!) Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 80. t. 28. — *Galgulus naevius* Vieill. N. D. XXIX. p. 431. — Id. Enc. p. 868. 6. — *Coracias naevia adult.* Wagl. Syst. Av. p. 214. 3. — Less. Trait. p. 354. 2. — *Coracias indica* Gray (nec Lin.) Gen. B. I. p. 62. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 33. 3. — Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 55. — Blyth R. Mus. A. S. B. p. 51. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 5. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 571. 856. — *Coracias indica var. bengalensis* Rchb. Handb. I. p. 49. —

Nepal — ♀ — 1 St.

358. 7. C. indicus Lin.

S. N. p. 159. 2. — Layard Ann. Nat. Hist. XII. p. 171. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 87. 206. — Rchb. Handb. I. p. 48. 112. t. 433. 3185. —

Ceylon — ♂ — 1 St.

359. 8. C. affinis M'c Clelland

P. Z. S. 1839. p. 164. — Gray Gen. B. I. p. 62. 8. t. 21. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 51. — Rchb. Handb. I. p. 50. 114. t. 434. 3186. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 574. 857. — *Coracias assamensis* M'c Clelland in Mus. Berol. —

Tenasserim — ♂ — 1 St.

360. 9. C. Temmincki Wagl.

Syst. Av. p. 215. 5. — Gray Gen. B. I. p. 62. 5. — Id.

List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 33. 2. — Bp. Consp. I. p. 167. gen. 318. 8.—Rchb. Handb. I. p. 51. 115. t. 434. 3187.— *Rollier Temminck* Levaill. Hist. Nat. Promer. & Guêp. III. p. 46. t. D. — *Galgulus Temminckii* Vieill. N. D. XXIX. p. 435. — Id. Enc. p. 869. 13. — *Coracias Urvillei* Quoy & Gaim. Voy. Astrolab. Ois. t. 16. — *Coracias papuensis* Iid. l. l. I. p. 220. — Scl. Proc. Linn. Soc. Febr. 1858. Zool. New-Guin. p. 155. 11. — *Coracias pileata* „Reinw." Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 87. 210. —

Celebes — ♂ — 1 St.

Gen. CORNOPIO *) Nob. — Rachen-Racke.

Colaris Rchb. 1852 (nec Cuv. 1817). *Eurystomus* Bp. 1854 (nec Vieill. 1816).

361. 1. C. afer Nob.

Coracias afra Lath. Ind. Orn. I. p. 172. — *Petit rolle violet* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. l. p. 99. t. 35. — *Eurystomus afer* Steph. Gen. Z. XIII. p. 97. — Shaw Nat. Misc. t. 401. — Gray Gen. B. I. p. 62. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 32. 4. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 5. — Verr. R. & Mag. Z. 1851. p. 271. — Id. I. I. 1855. p. 414. — Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 399. 58. — Id. Orn. Westafr. p. 28. 77. — *Eurystomus rubescens* Vieill. N. D. XXIX. p. 426. — Id. Enc. p. 871. 3. — Sws. B. W.-Afr. II. p. 112. — *Eurystomus purpurascens* Vieill. N. D. XXIX. p. 427. — Id. Enc. p. 872. 7. — *Colaris afra* Cuv. Règn. Anim. I. p. 401.— Rchb. Handb. I. p. 56. 125. t. 433. 3201-2. — *Colaris purpurascens* Wagl. Syst. Av. p. 106. 2. — Less.

*) Von κορνοπίων (Heuschrecken-Verscheucher). Es gehören noch zwei Arten hierher:

2. *C. madagascariensis.* — *Rolle de Madagascar* Buff. Pl. enl. 501. — *Coracias madagascariensis* Gm. S. N. p. 379. 9.— *Grand rolle violet* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 96. t. 34.—*Eurystomus violaceus* Vieill. N. D. XXIX. p. 426. — Id. Enc. p. 872. 6. — *Colaris violaceus* Wagl. Syst. Av. p. 106. 1. — Less. Trait. p. 356. 2. t. 49. 2. — *Eurystomus madagascariensis* Gray Gen. B. I. p. 62. 2. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 4. — *Colaris madagascariensis* Rchb. Handb. I. p. 56. 124. t. 438. 3200 (Madagascar);

3. *C. gularis.*—*Petit rolle violet à gorge bleue* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 154. t. 55. — *Eurystomus gularis* Vieill. N. D. XXIX. p. 426. — Id. Enc. p. 827. 4. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 409. — Gray Gen. B. I. p. 62. 4.— Id. List B. Brit. Mus. II. 1. p. 33. 5. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 6. — Verr. R. & Mag. Z. 1855. p. 415.— Hartl. Orn. Westafr. p. 29. 78. — *Colaris gularis* Wagl. Syst. Av. p. 106. 3. — Rchb. Handb. I. p. 57. 126. t. 428. 3203. — *Eurystomus collaris* Vig. Z. Journ. V. p. 273. — Gray Gen. B. I. p. 62. 7 (West-Africa). —

Trait. p. 356. 3. — *Colaris viridis* Wagl. Syst. Av. p. 107. 5.— Rchb. Handb. I. p. 57. 127. (juv.).— *Eurystomus orientalis* Rüpp. (nec Lin.) Syst. Übers. Vög. N.-O.-Afr. p. 23. 82. — *Eurystomus viridis* Gray Gen. B. I. p 62. 5.— Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 7. — Hartl. Journ. Orn. 1853. p. 400. 59 (juv.). — *Eurystomus purpurascens* ♀ *afer* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 89. 216-217. —

Goldküste — ♂ ad., ♂ jun., ♀ ad. — 3 St.

Gen. EURYSTOMUS Vieill. 1816. — Breitmaul-Racke.

Colaris Cuv. 1817. *Coracias* Raffl. 1822 (nec Lin. 1735).

362. 1. E. orientalis Steph.

Gen. Z. XIII. p. 99. — Sws. Two Cent. p. 326. 137. fig. 68b.— Gray Gen. B. I. p. 62. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 31. 1.—Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 55. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 51. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 1. — Rchb. Handb. I. p. 54. 121. t. 437. 3195-96. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 121. 148. — *Coracias orientalis* Lin. S. N. p. 159. 4. — Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 302. — *Rolle à gorge bleue* Levaill. Ois. Parad., Roll. & c. I. p. 103. t. 36.— *Eurystomus cyanicollis* Vieill. N. D. XXIX. p. 425. — Id. Enc. p. 871. 2. — Id. Gal. Ois. II. p. 176. t. 111. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 2. — Rchb. Handb. I. p. 55. 122. t. 437. 3197. — *Eurystomus fuscicapillus* Vieill. N. D. XXIX. p. 426. — Id. Enc. p. 872. 5. — *Colaris orientalis* Cuv. Règn. Anim. I. p. 401. — Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 162. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 88. 211.— *Colaris fuscicapillus* Dumont Dict. Sc. Nat. XLVI. p. 174. — *Colaris cyanicollis* Wagl. Syst. Av. p. 106. 4. — *Eurystomus calornyx* Hodgs. —

Malacca*) — ♂ ad., ♂ juv., ♀ ad.; Java — 2 ♂ ad. — 5 St.

363. 2. E. pacificus Gray

Ann. Nat. Hist. 1843. p. 190. — Id. Gen. B. I. p. 62. 6.— Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 32. 3. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 3. — Rchb. Handb. I. p. 55. 123. t. 437.

---

*) Eine sorgfältige Vergleichung von Exemplaren des berliner Museum's aus Nepal mit den uns vorliegenden von Malacca und den Sunda-Inseln hat uns keine genügenden specifischen Unterschiede zwischen denselben auffinden lassen; das von Reichenbach a. a. O. besonders hervorgehobene Unterscheidungs-Merkmal, dass bei *E. cyanicollis* die Flügel den Schwanz erreichen, bei *E. orientalis* kürzer seien, ist, wie die Zahl der blauen Spiegelflecke auf den Handschwingen, nicht constant. —

3198—99. — Gray P. Z. S. 1858. p. 171. 10. — *Coracias pacifica* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 27. — *Galgulus pacificus* Vieill. N. D. XXIX. p. 435. — Id. Enc. p. 870. 14. — *Eurystomus orientalis* Vig. & Horsf. (nec Lin.) Trans. Linn. Soc. XV. p. 202. — *Eurystomus australis* Sws. Two Cent. p. 326. 136. fig. 68a. — Gould B. Austr. II. t. 17. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 38. 47. — *Colaris pacificus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 7. gen. 88. 213. —

Neu-Süd-Wales — ♂, 2 ♀ — 3 St.

Subfam. EURYLAEMINÆ. Rachenvögel.

Gen. CALYPTOMENA Raffl. 1822. – Smaragd-Rachenvogel.

364. 1. C. viridis Raffl.

Trans. Linn. Soc. XIII. p. 295.— Gray Gen. B. I. p. 275.— Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 196.— Bp. Consp. I. p. 169. gen. 326. — Horsf.& Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 120. 147. — *Rupicola viridis* Temm. Pl. col. 216. — Less. Trait. p. 259. 3. t. 50. 2. — *Pipra viridis* Wagl. Isis 1830. p. 926. 3. — *Calyptomena Rafflesia* Sws. Two Cent. p. 296. 49 (ad.). — *Calyptomena caudacuta* Id. l. l. p. 296. 50 (juv.). —

Sumatra — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

Gen. EURYLÆMUS Horsf. 1820. — Hornrachen.

Eurylaimus (!) Horsf. 1820. *Platyrhynchus* Vieill. 1825 (nec Desm. 1806).

365. 1. C. javanicus Horsf.

Trans. Linn. Soc. XIII. p. 170. — Id. Zool. Res. Jav. Lief. 4. t. 5. — Less. Trait. p. 261. 1. — Gray Gen. B. I. p. 65. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 36. 1. — Blyth Cat. Mus. A. S. B. p. 195. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 1. — Rchb. Handb. I. p. 59. 132. t. 441. 3213-14.— Gould B. Asia t. .... — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 116. 140. — *Eurylaimus Horsfieldii* Temm. Pl. col. 130-131. — Wagl. Syst. Av. p. 109. 3 & p. 374. — Sws. Flycatch. p. 240. t. 30. — *Platyrhynchus Horsfieldi* Vieill. Gal. Ois. II. p. 200. t. 125. — *Eurylaemus javanus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 6. gen. 81. 170. —

Sumatra — ♂ ad.; Java — ♂ jun. — 2 St.

366. 2. E. ochromelas Rchb.

Handb. I. p. 60. 133 t. 441. 3215—16. — *Eurylaimus ochromalus* (!) Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 297. — Gray Gen. B. I. p. 65. 2. — Id. List. Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 36. 2. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 195. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 319. 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 116. 141. — *Eurylaimus cucullatus* Temm. Pl. col. 261. — Wagl. Syst. Av. p. 110. 4. — Less. Trait. p. 261 Annot. — *Eurylaimus Rafflesii* Less. Compl. Buff. VIII. p. 463. —

Sumatra — ♂ ad.; Java — ♂ jun. — 2 St.

Gen. CYMBORHYNCHUS Vig. 1831. — Kellenschnabel.

Cymbirhynchus (!) Vig. 1831. *Erolla* (!) Less. 1831. *Cymbyrhynchus* (!) Eyt. 1839.

367. 1. C. macrorhynchus Gray

Gen. B. I. p. 66. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 38. 1.—Bp. Consp. I. p. 169. gen. 324.— Gould B. Asia t....— Rchb. Handb. I. p. 58. 130. t. 440. 3209-10. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 119. 146. — *Todus macrorhynchus* Gm. S. N. p. 446. 15. — *Todus nasutus* Lath. Ind. Orn. I. p. 268. — *Platyrhynchus ornatus* Desm. Hist. Nat. Tang., Man. & Tod. livr. 4. — *Platyrhynchus nasutus* Vieill. N. D. XVII. p. 15. — Id. Enc. p. 844. 35. — *Eurylaimus lemniscatus* Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 296.— *Eurylaimus nasutus* Temm. Pl. col. 154. — Wagl. Syst. Av. p. 109. 2. — *Cymbirhynchus nasutus* Vig. App. Mem. Raffl. p. 654.— Blyth Cat. B. Mus. A.S.B. p. 195. — *Erolla nasica* Less. Trait. p. 260. —

Malacca — ♂; Sumatra — ♀ — 2 St.

Gen. CORYDON Less. 1828. — Corydon.

Cymbirhynchus (!) Rchb. 1850 (nec Vig. 1831).

368. 1. C. sumatranus Strickl.

Ann. & Mag. Nat. Hist. 1841. VI. p. 418. — Gray List Gen. p. 12. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 195. — Bp. Consp. I. p. 168. gen. 321. — Rchb. Handb. I. p. 57. 128. t. 439. 3205-6. — *Coracias sumatranus* Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 303. — *Eurylaimus sumatranus* Vig. App. Mem. Raffl. p. 653. — Gray Gen. B. I. p. 65. — Id. List B. Brit. Mus. II. 1. p. 37. 3. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 117. 142. — *Eurylaimus corydon* Temm. Pl. col. 297. — Wagl. Syst. Av. p. 109. 1. —

Less. Trait. p. 261. 2. t. 50. 1. — *Corydon Temminckii* Less. Man. Orn. I. p. 177. — *Corydon corydon* Licht. in Mus. Berol. —

Sumatra — ♂ ad., ♂ juv. — 2 St.

Subfam. PODARGINÆ. Schwalme.

Gen. BATRACHOSTOMUS Gould 1838. — Froschmaul.

Bombycistomus Hay 1841.

369. 1. B. affinis *) Blyth

Journ. A. S. B. 1847. p. 1180 (♀). — *Podargus parvulus* Temm. in Mus. Lugd. — Schleg. Journ. Orn. 1856. p. 460. 1. — *Batrachostomus parvulus* Bp. Consp. I. p. 57. gen.

---

*) *B. affinis* Blyth unterscheidet sich von *B. javanensis* Gould fast nur durch die geringere Grössenverhältnisse und das Vaterland. Wohin *B. stellatus* Gould gehört, vermögen wir nach der ziemlich verworrenen Beschreibung (P. Z. S. 1837. p. 43.) nicht zu entscheiden, die angegebenen Maasse deuten auf *B. affinis*, das Vaterland auf *B. javanensis*. Cassin stellt zu demselben (Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 2) als Synonym *Podargus crinifrons* Temm., dieser soll jedoch nach Bonaparte's und Schlegel's Angaben grösser als *B. javanensis* sein, während *B. stellatus* entschieden kleiner, ja sogar noch kleiner als *B. affinis* zu sein scheint. Wir ziehen es desshalb vor, bis eine Vergleichung der Original-Exemplare, die hier allein helfen kann, diesen Punkt festgestellt haben wird, alle drei vorläufig noch als eigene Arten zu betrachten, und lassen ihre Synonymie hier folgen:

3. *B. stellatus* Gray Gen. B. I. p. 45. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 3. 2.—Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 2.— ?Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 388. 627. — *Podargus stellatus* Gould P. Z. S. 1837. p. 43 (Java);
4. *B. javanensis* Gould Icon. Av. II. p. 13. — Gray Gen. B. I. p. 45. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 3. 1. — Bp. Consp. I. p. 57. gen. 129. 2. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 7. 1. — *Podargus javanensis* Horsf. Zool. Res. Jav. t. 6. — *Podargus javensis* Id. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 141. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 81. — *Podargus cornutus* Temm. Pl. col. 159. — Schleg. Journ. Orn. 1856. p. 460. 2. — *Batrachostomus cornutus* Gray Gen. B. I. p. 45. 2. — *Batrachostomus javensis* Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 112. 131 (Sunda-Inseln);
5. *B. crinifrons* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 129. 4. — *Podargus crinifrons* Temm. in Mus. Lugd. — Schleg. Journ. Orn. 1856. p. 460. 3. — Grösser als *B. javanensis:* Kehle und Brust röthlich weiss, alle übrigen Theile rothbraun, auf Schulter- und Flügeldeckfedern runde weisse nicht eben grosse Flecke; die gefiederten Stirnborsten sind ausserordentlich gross und kräftig, daher der Name. — Flügellänge 6″ 6‴. — Nach Schlegel stammt das einzige Exemplar des leydener Museums von Gilolo. —

Endlich gehört noch hierher die Riesenform der Gattung:

6. *B. auritus* Gould Icon. Av. II. p. 13. t. 7. — Gray Gen. B. I. p. 45. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 3. 3. — Bp. Consp. I. p. 57. gen. 129. 1.— Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 4.— Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 387. 626. — *Podargus auritus* „Vig. & Horsf.“ Griff. Anim. Kingd. II. p. 114. t. 4. — Vig. App. Mem. Raffl. p. 653. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 81. — *Bombycistomus Fullertoni* Hay Journ. A. S. B. 1841. p. 574. — *Podargus Fullertoni* Blyth l. l. 1842. p. 798 (Malacca). —

129. 3. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 8. 3. —

Malacca — ♂, ♀ — 2 St.

370. 2. B. stictopterus *) nov. sp.

Minor *B. javanensi*, maior *B. affini*: rostro pro mole corporis maximo; supra rufo-brunneus, rectricibus obsolete fasciatis, tectricibus alarum superioribus externo pogonio apice maculis distinctis albis nigricante-marginatis; subtus plumis sordide albescentibus, margine in pectore guttureque imprimis obsolete rufescentibus, in abdomine vix marginatis. Desunt omnino subtus maculae distinctae albae nigro-circumcinctae *B. javanensis* & *B. affinis*. — Long. tot. 9″ 6‴, al. 5″, caud. 5″, rostr. culm. 13‴, tars. 5″, dig. med. exc. ung. 6‴. —

Malacca — ♂ ad., ♀ ad., ♀ jun. — 3 St.

Gen. AEGOTHELES Vig. & Horsf. 1825. — Zwerg-Schwalm.

Oegotheles (!) Less. 1831.

371. 1. A. leucogaster Gould

P. Z. S. 1844. p. 106. — Id. B. Austr. II. t. 2. — Id. Introd. B. Austr. p. 24. 39. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 187. 226. — Gray Gen. B. I. p. 46. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 4. 2. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 130. 2. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 10. 2. —

Nord-West-Australien — ♂, ♀ — 2 St.

372. 2. A. novae Hollandiae Vig. & Horsf.

Trans. Linn. Soc. XV. p. 197. — Lafr. Mag. Z. 1838. p.

*) Diese neue Art, von der auch das berliner Museum zwei Exemplare besitzt, steht in der Grösse gleichsam in der Mitte zwischen *B. affinis* und *B. javanensis*. Von dem ihr am nächsten stehenden *B. javanensis* unterscheidet sie sich leicht durch geringere Grösse, dunkler rothbraune Färbung, deutliche verloschene Schwanzbinden und vorzüglich durch die (jenen gänzlich mangelnden) grossen weisslichen schwärzlich gerandeten Flecken an den Spitzen der Aussenfahnen der grossen Flügeldeckfedern, wie sie bei den Weibchen jener Art gar nicht, bei den Männchen zwar ebenfalls, aber kleiner, verwischter und mehr graugesprenkelt vorkommen. Das ganze Gefieder der Unterseite ist schmutzig weiss mit verloschenen hell rothbraunen Rändern, welche besonders auf Brust und Kehle sehr breit sind und am Unterbauche fast ganz verschwinden; markirte weisse, schwarz eingefasste Flecken, wie sie *B. javanensis* und *B. affinis* zeigen, fehlen gänzlich. Der Schnabel ist verhältnissmässig stark entwickelt, so gross wie bei *B. javanensis*, während alle andern Grössenverhältnisse merklich kleiner sind. — G. L. 9″ 6‴, Fl. 5″, Schwz. 5″, Schnabelfirste 11‴, Schnabelspalte 13‴, Lauf 5‴, Mittelz. o. Kr. 6‴. — Das Männchen ist wie bei allen *Batrachostomus*-Arten viel dunkler gefärbt als das hell rothbraune Weibchen, ohne jedoch von demselben so auffallende Unterschiede zu zeigen, wie bei *B. javanensis* und *B. affinis*. —

21. t. 82. — Gould B. Austr. II. t. 1. — Id. Introd. B. Austr. p. 24. 38. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 188. 227. — Gray Gen. B. I. p. 46. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 3. 1. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 130. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 1. — *Caprimulgus novae Hollandiae* Lath. Ind. Orn. II. p. 588. — Vieill. N. D. X. p. 243. — Id. Enc. p. 537. 5. — Less. Trait. p. 265. b. — *Caprimulgus vittatus* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — Vieill. N. D. X. p. 142. — Id. Enc. p. 545. 28. — *Caprimulgus cristatus* Shaw White's Voy. p. 241. t. 29. — *Podargus novae Hollandiae* Steph. Gen. Z. XIII. p. 93. — *Aegotheles lunulatus* Jard. & Selby Ill. Orn. III. t. 149. — *Aegotheles australis* Sws. Class. B. II. p. 338. — *Aegotheles cristatus* Gray List Gen. B. p. 7. — Id. Gen. B. I. p. 46. 2. —

Neu-Süd-Wales — ♂ — 1 St.

Gen. PODARGUS Cuv. 1829. — Schwalm.

373. 1. P. phalaenoides Gould

P. Z. S. 1839. p. 142. — Id. B. Austr. II. t. 5. — Gray Gen. B. I. p. 45. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 2. 3. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 189. 228. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 128. 5. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 4. —

Nord-Australien — ♂ — 1 St.

374. 2. P. brachypterus Gould

P. Z. S. 1840. p. 163. — Id. Introd. B. Austr. p. 26. 43. — Rchb. Vög. Neuh. III. p. 274. 43. — Gray Gen. B. I. p. 45. 8. — Bp. Consp. I. p. 58. gen. 128. 2. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 5. —

West-Australien — ♀ — 1 St.

375. 3. P. humeralis Vig. & Horsf.

Trans. Linn. Soc. XV. p. 198. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 88. — Sws. Class. B. II. p. 338. — Gould B. Austr. III. t. 3. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 190. 229. — Gray Gen. B. I. p. 45. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 2. 1. — Bp. Consp. I. p. 57. gen. 128. 4. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 8. 1. — *? Caprimulgus gracilis* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — Viei'l. N. D. X. p. 241. — Id. Enc. p. 541. 16. — *? Caprimulgus strigoides* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — Vieill. N. D. X. p. 232. — Id. Enc. p. 545. 29. — *? Caprimulgus podargus* Dumont Dict. Sc.

Nat. XIV. p. 504. — *?Podargus australis* Steph. Gen. Z. XIII. p. 92. — Gray Gen. B. I. p. 45. 4. — *?Podargus gracilis* Steph. Gen. Z. XIII. p. 93. — *?Podargus cinereus* Vieill. N. D. XXVII. p. 151. — Id. Enc. p. 547. 1. — Id. Gal. Ois. II. p. 196. t. 123. — Gray Gen. B. I. p. 45. 1. — *Podargus strigoides* Id. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1843. p. 194. — Id. Gen. B. I. p. 45. 2. —

Neu-Süd-Wales — ♂ — 1 St.

376. 4. P. megacephalus Gould

Introd. B. Austr. p. 26. 40.—Rchb. Vög. Neuh. III. p. 274. 40.— Gray Gen. B. I. p. 45. 5.— Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 3.— *Caprimulgus megacephalus* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 58. — *Caprimulgus stanleyanus* Lath. — *Podargus stanleyanus* Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. XV. p. 197.— Gray Gen. B. I. p. 45. 3.—Bp. Consp. I. p. 57. gen. 128. 3.—

Ost-Australien — ♂, ♀ — 2 St.

377. 5. P. Cuvieri Vig. & Horsf.

Trans. Linn. Soc. XV. p. 200.— Gould B. Austr. II. t. 4.— Rchb. Vög. Neuh. II. p. 145. 466. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 2. 2. — Bp. Consp. I. p. 57. gen. 128. 1. — Cassin Cat. Caprim. Mus. Philad. p. 9. 2. —

Vandiemensland — ♀ — 1 St.

Fam. UPUPIDÆ. Hopfe.

Subfam. UPUPINÆ. Wiedehopfe.

Gen. UPUPA *) Lin. 1735. — Wiedehopf.

378. 1. U. epops Lin.

S. N. p. 183. 1. — Vieill. Enc. p. 525. 1. — Brehm Vög. Deutschl. p. 215. 1. — Naum. Vög. Deutschl. V. p. 437. 176. t. 142. — Less. Trait. p. 323. 1. t. 73. 1. — Gould B. Eur. t. 238.— Keys. & Blas. Wirbelth. Eur. p. 35. 77.— Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 999. 1. — Gray Gen. B. I. p. 90. 1.—Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 43.—Id. Cat. Mamm. B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 58. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 46. — Bp. Consp. I. p. 88. gen. 210. 1. — Rchb. Handb. I. p. 318. 749. t. 595. 4032—34. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 723. 1054. — *Upupa rubbola* Storr. Deg. Ucc. II. t. 205. — *Upupa vulgaris* Pall. Zoogr. Rosso - Asiat. I.

---

*) Ausserdem kennt man bis jetzt noch folgende Arten:

5. *U. marginata* Peters in Mus. Berol. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 1. 6. — *? Upupa madagascariensis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 1. 5.— So gross als *U. maior* Brehm: oben weinröthlich, unten viel heller, besonders am Bauche; erste Handschwinge ganz ohne, zweite nur auf der Aussenfahne, die vier folgenden auf beiden Fahnen, die vier alsdann folgenden nur auf der Innenfahne mit weissem Fleck, Armschwingen an der Wurzel weiss mit drei weissen Querbinden; Schwanz wie bei *U. maior* und *U. epops*, nur ist die jederseits äusserste Steuerfeder aussen viel breiter weiss gesäumt, daher der Name; Haubenfedern sehr lang, schön zimmetroth, nach den breiten schwarzen Enden zu allmählig heller weisslich werdend; Unterschwanzdecken weiss. — G. L. 13″, Fl. 6″, Schwz. 5″, Schnabelf. 2″ 3‴, Lauf 11‴, Mittelz. o. Kr. 9‴. — Das einzige vom Prof. Peters aus Madagascar mitgebrachte Exemplar befindet sich im berliner Museum in Weingeist. —

6. *U. ceylonensis* Rchb. Handb. I. p. 320. 753. t. 595. 4036. — *Upupa minor* Jerd. (nec Shaw) Madr. Journ. 1840. p. 227. — *Upupa senegalensis* Kelaart (nec Sws.) Faun. Ceyl. p. 99 & 119. — *Upupa indica* „Layard“ (nec Hodgs.) Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 1. 4 (Ceylon);

7. *U. senegalensis* Sws. B. W.-Afr. II. p. 114. — Rchb. Handb. I, p. 320. 751. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 8. 98. — Id. Orn. Westafr. p. 42. 119 (West-Africa). —

p. 433. 78. — *Huppe* Buffi Pl. enl. 52. — Levaill. Hist. Nat. Prom. & Guêp. I. p. 53. t. 22. — Vieill. Ois. dor. Prom. t. 1. — *Upupa bifasciata* Brehm Vög. Deutschl. p. 215. 2. t. 15. 2. — *Upupa indica* Hodgs. Gray Z. Misc. 1844. p. 82. — *Upupa maculigera* Rchb. Handb. I. p. 319. —

Harz — 2 ♂, ♀; N.-O.-Africa — ♀ — 4 St.

379. 2. U. maior Brehm

Vogelfang p. 78. 2. —

Maior, rostro longissimo: supra cineracente-cimmamomea, subtus pallidior, rufescens; remigibus primariis nigris, prima externo tantum, ceteris ambobus pogoniis macula alba; cristae plumis longissimis laete cinnamomeis, posterioribus tantum apicem nigrum versus vix pallescentibus. — Long. tot. 13″, al. 5″ 9‴, caud. 4″ 6‴, rostr. culm. 2″ 6‴, tars. 11‴, dig. med. exc. ung. 9‴. —

Egypten — ♂ — 1 St.

380. 3. U. nigripennis „Gould“

Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 725. 1055. — *Upupa minor* Sykes (nec Shaw) P. Z. S. 1832. p. 97. — *Upupa senegalensis* Blyth (nec Sws.) Journ. A. S. B. 1846. p. 189. — Id. l. l. 1847. p. 999. 2. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 46. — *Upupa indica* Rchb. (nec Hodgs.) Handb. I. p. 320. 752. t. 596. 4037. — *Upupa epops* Burgess (nec Lin.) P. Z. S. 1855. p. 27. —

Simillima praecedenti, sed minor, rostro mediocri: cristae plumis elongatis, laete cinnamomeis apicem nigrum versus minime pallescentibus. — Long. tot. 11″ 6‴, al. 5″ 4‴, caud. 3″ 8‴, rostr. culm. 1″ 10‴, tars. 9½‴, dig. med. exc. ung. 7½‴. —

Java — ♂ — 1 St.

381. 4. U. minor Shaw *)

Gen. Z. VIII. p. 139. — Less. Trait. p. 323. 2. — Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 999. 3. — Gray Gen. B. I. p. 90. 2. — Bp. Consp. I. p. 88. gen. 210. 2. — *Huppe d'Afrique* Vieill. Ois. dor. Prom. p. 11. t. 2. — *Upupa africana* Licht. Doubl. p. 16. 146. — *Upupa cristatella* Vieill. Gal. Ois. II. p. 306. t. 184. — *Upupa capensis* „Sws.“ Jard & Selby III. Orn. III. t. 142. — Rchb. Handb. I. 319. 750. t. 595. 4035. —

Kafferland — ♂, ♀ — 2 St.

*) Lesson, Gray, Bonaparte und Hartlaub schreiben Einer nach dem Andern *U. minor* Gm., wir haben jedoch diese Art nirgends von demselben erwähnt gefunden. —

Subfam. IRRISORINÆ. Spotthopfe.

Gen. RHINOPOMASTUS *) Smith 1828. — Sichelhopf.

Rhinopomastes (!) Cab. 1847.

382. 1. R. cyanomelas Less.

Trait. p. 239. — Gray List Gen. B. p. 16. — Bp. Consp. I. p. 411. gen. 878. 1. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 727. 1057. — *Promérops namaquois* Lavaill. Prom. & Guêp. I. p. 15. t. 5-6. — *Falcinellus cyanomelas* Vieill. N. D. XXVIII. p. 165. — Id. Enc. p. 581. 12. — *Upupa purpurascens* Burchell Catal. — *Promerops cyanomelas* Cuv. — *Promerops purpuratus* Sws. — *Epimachus cyanomelas* Wagl. Syst. Av. p. 119. 5. — *Rhinopomastus Smithii* Jard. Z. Journ. IV. 1829. p. 2. t. 1. 1—5. — *Rhinopomastus Levaillantii* Less. — *Epimachus unicolor* Licht. Verz. Vög. & Säugeth. Kaffernl. 1842. p. 17. 162-164. — *Irrisor cyanomelas* Gray Gen. B. I. p. 90. 9. — Müll. Journ. Orn. 1855. p. 12. 127. —

Cap — ♂ — 2 St.

Gen. SCOPTELUS **) Nob. — Lachhopf.

Irrisor Bp. 1854 (nec Less. 1831).

383. 1. S. aterrimus Nob.

Promerops aterrimus Steph. Gen. Z. XIV. p. 257. — *Nectarinia unicolor* Licht. in Mus. Berol. — *Epimachus unicolor* Wagl. Isis 1829. p. 656***). — *Promerops pusillus* Sws. B. W. - Afr. II. p. 128. — *Irrisor unicolor* Gray Gen. B. I. p. 90. 5. — Bp. Consp. I. p. 411. gen. 877. 5. —

---

*) Hierher gehören noch:

2. *R. Cabanisi* Rchb. Handb. I. p. 326. 766. — *Irrisor Cabanisi* Filippi R. & Mag. Z. 1853. p. 290 (vom weissen Nil);

3. *R. minor* Bp. Consp. I. p. 411. gen. 878. 3. — Rchb. Handb. I. p. 326. 765. t. 600. 4050. — *Promerops minor* Rüpp. Syst. Verz. p. 25. — *Epimachus minor* Id. l. l. t. 8. — *Irrisor minor* Gray Gen. B. I. p. 90. 10 (Abyssinien). —

**) Von σκωπτηλός (Spötter) = *Irrisor*. —

***) Die Vaterlands-Angabe „Bengalen" ist a. a. O. irrthümlich, das lichtenstein'sche Original-Exemplar stammt vom Senegal und stimmt völlig mit *Promerops aterrimus* Steph. und *Promerops pusillus* Sws. überein. —

Rchb. Handb. I. p. 325. 762. — *Rhinopomaster pusillus* Bp. Consp. I. p. 411. I. gen. 878. 2. — Rchb. Handb. I. p. 326. 764. — *Irrisor pusillus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 5. 13. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 9. 100. — Id. Orn. Westafr. p. 43. 121. — *?Promerops cyanomelas* Rüpp. (nec Vieill.) Syst. Übers. p. 28. 104. — Brehm Journ. Orn. 1853. p. 456. —

Simillimus *Rhinopomasto minori* Bp., sed maior: rostro nigro, recto, paululum modo curvato; remigum 1ma nigra, 2da — 4ta interno, 5ta — 9na utroque pogonio macula nivea. — Long. tot. 9″ 6‴, al. 3″ 10‴, caud. 4″ 9‴, rostr. culm. 1″ 1‴, tars. 9‴. —

Sennaar — ♂ — 1 St.

Gen. IRRISOR Less. 1831. — Spotthopf.

Falcinellus pt. Vieill. 1816. *Promerops* Boie 1826 (nec Briss. 1760).

384. 1. I. capensis *) Less.

Trait. p. 239. — *Upupa erythrorhyncha* Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 124. — *Promerops moqueur* Levaill. Prom. & Guêp. I. p. 8. t. 1-3. *Promerops à bec rouge* Vieill. Ois. dor. Prom. t. 6. — *Promerops erythrorhynchus* Shaw Nat. Misc. t. 533. — Gray List Gen. B. p. 16. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 16. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 4. 9. — *Falcinellus erythrorhynchus* Vieill. N. D. XXVIII. p. 16. — Id. Enc. p. 877. 2. — *Nectarinia erythorhyncha* Licht. Doubl. p. 15. 144. — *Epimachus erythrorhynchus* Wagl. Syst. Av. p. 119. 4. — *Irrisor erythrorhynchus* Gray Gen. B. I. p. 90. 1. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 45. — Bp. Consp. I. p. 410. gen. 877. 1. — Rchb. Handb. I. p. 322. 757. t. 597. 4041. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 726. 1056. —

Kaffernland — ♂ — 1 St.

385. 2. I. senegalensis Hartl.

Journ. Orn. 1854. p. 8. 99. — Id. Orn. Westafr. p. 42. 120. — *Varieté du Promérops moqueur à bec rouge* Levaill. Prom. & Guêp. I. p. 13. t. 4. — *Falcinellus senegalensis* Vieill. N. D. XXVIII. p. 168. — Id. Enc. p. 580. 9. — *Nectarinia melanorhyncha* Licht. Doubl. p. 15. 145 (juv). —

*) Wir ziehen es vor diese beiden nahe verwandten Arten durch die vom Vaterlande entnommenen Namen zu trennen, da ja bei beiden für die alten Vögel der Name *I. erythrorhynchus*, für die jungen *I. melanorhynchus* anwendbar wäre. —

Epimachus melanorhynchus Wagl. Syst. Av. p. 119. 3. — *Promerops senegalensis* Sws. B. West-Afr. II. p. 117. — *Irrisor melanorhynchus* Gray Gen. B. I. p. 90. 2. t. 31. — Bp. Consp. I. p. 410. gen. 877. 2. — Strickl. Ann. & Mag. N. H. 1852. p. 344. — Jard. Contrib. Orn. 1852. p. 87. — Strickl. l. l. p. 154. — Rchb. Handb. I. p. 323. 758. t. 597. 4042. — *Promerops erythrorhynchus* Rüpp. (nec Lath.) Syst. Übers. p. 28. 103. — Brehm Journ. Orn. 1853. p. 456. — *Promerops melanorhynchus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 12. gen. 4. 11. —

Sennaar — ♂ ad., ♀ jun. — 2 St.

Fam. MEROPIDÆ. Bienenfresser.

Subfam. NYCTIORNITHINÆ. *) Nachtspinte.

Gen. NYCTIORNIS Sws. 1831. — Nachtspint.

Alcemerops Geoffr. 1832. *Bucia* (!) Hodgs. 1836. *Napophila* Id. 1841.

386. 1. N. Athertoni M'c Clelland

P. Z. S. 1839. p. 155. — Gray Gen. B. I. p. 87. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 72. 1. — Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 58.—Bp. Consp. I. p. 164. gen. 311. 3. — Gould B. Asia II. t. 2. — Rchb. Handb. I. p. 81. 166. t. 453. 3262–63. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 89. 111. — *Merops Athertoni* Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 58. — *Bucia nipalensis* Hodgs. Journ. A. S. B. 1836. p. 361. — *Nyctiornis caeruleus* Sws. Class. B. II. p. 333. — *Merops assamensis* M'c Clelland. — *Nyctiornis Amherstiana* Royle Ill. Him. Bot. I. p. 77. — *Merops cyanogularis* Jerd. Madr. Journ. Lit. & Sc. 1840. p. 229. — *Bucia Athertonii* Blyth Journ. A. S. B. 1841. p. 922. — Rchb. Handb. I. p. 83. — *Napophila Athertonii* Blyth Journ. A. S. B. 1842. p. 104. — *Napophila meropina* Hodgs. Gray Z. Misc. 1844. p. 82. — *Alcemerops*

---

*) In diese Subfamilie gehört u. a. mit *Nyctiornis* nahe verwandte Gattung:

Pogonomerops Nob. (*Meropogon* (!) Bp. 1850):

P. Forsteni. — *Merops Forsteni* Temm. in Mus. Lugd. — *Meropogon Forsteni* Bp. Consp. I. p. 164. gen. 312.—Rchb. Handb. I. p. 80. 164 (Celebes).— Ausserdem auch noch das kleinere, mehr *Melittophagus* ähnliche Formen enthaltende Genus:

Meropiscus Sundev. 1849:

1. *M. gularis* Sundev. Oefvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1849. p. 162. — Rchb. Handb. I. p. 83. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 8. 97. — *Merops gularis* Shaw Z. Misc. t. 337. — Less. Descr. Mammif. & Ois. p. 268.— Rchb. Handb. I. p. 80. 163. t. 452. 3258-59. — Hartl. Orn. Westafr. p. 42. 118. — Verr. R. & Mag. 1855. p. 355. — *Melittophagus gularis* Gray Gen. B. I. p. 86. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 72. 6. — *Nyctiornis gularis* Bp. Consp. I. p. 164. gen. 311. 1 (Sierra Leone, Gabon, Ashantee);
2. *M. Müller i* Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1857. p. 37. — *Merops Müller i* Hartl. Orn. Westafr. p. 262. 741 (Muni-Fluss). —

Athertonii Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 52. — *Alcemerops paleazureus* Less. R. Z. 1840. p. 262. —

Himalaya — ♂; Nepal — ♀ — 2 St.

387. 2. N. amictus Sws.

Z. Ill. n. s. II. t. 56. — Gray Gen. B. I. p. 87. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 73. 2. — Bp. Consp. I. p. 164. gen. 311. 2. — Gould B. Asia II. t. 3. — *Merops amictus* Temm. Pl. col. 310. — Less. Trait. p. 237. 2. — *Alcemerops amictus* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 15. —

Maior, rostro longiore robustiore: sincipite verticeque roseo-lilacinis, caudae apicibus latius nigris, gula juguloque latissime rubris. — Long. tot. 1′ 1″, al. 5″, caud. 4″ 9‴, caud. apic. nigr. 1″ 4‴, rostr. culm. 2″, rostr. altit. 6‴. —

Sumatra — ♂ ad.; Borneo — ♂ jun. — 2 St.

388. 3. N. malaccensis *) Nob.

Nyctiornis amictus (nec Sws.) Rchb. Handb. I. p. 80. 165. t. 453. 3260-61. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 383. 619.— *Alcemerops amictus* Blyth (nec Sws.) Cat. B. Mus. A. S. B. p. 52. —

Minor, rostro breviore, graciliore: sincipite late rubro, verticem roseo-lilacinum versus sensim rosescente; gula juguloque minus late rubris, caudae apicibus angustius nigris. — Long. tot. 11″, al. 4″ 6‴, caud. 4″ 3‴, caud. apic. nigr. $10^1/_2$‴, rostr. culm. 1″ 6‴, rostr. altit. $4^1/_2$‴. —

Malacca — ♀ ad., ♂ juv. — 2 St.

Subfam. MEROPINÆ. Spinte.

Gen. SPHECONAX **) Nob. — Prachtspint.

Coccolarynx (!) **) Rchb. 1852.

389. 1. S. albifrons Nob.

Merops Bullockoides (!) Smith S.-Afr. Quart. Journ. 1834.

---

*) Mehrere uns vorliegende Exemplare von Malacca verdienen mindestens als climatische Race betrachtet zu werden; dieselben sind stets merklich kleiner, haben einen kürzern weniger robusten Schnabel, zeigen einen mehr gelblichen Anflug auf dem grünen Gefieder und weniger breite schwarze Enden der Steuerfedern. Ferner haben sie stets eine breite schön rothe Stirn, und zeigen die Stirnfedern fast nie rosenfarbene Spitzen, während bei dem sumatranischen ächten *M. amictus* Temm. sich nie eine Spur von Roth auf dem ganzen Vorderkopf entdecken lässt.—

**) Hierher gehört noch der jüngst beschriebene:

4. *S. Boleslavski.* — *Merops Bullockii* Vierthaler (nec Vieill.) Naumannia II. p. 41.— *Merops Boleslavskii* Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Class. Kais. Acad.

p. . . . — Id. Ill. S.-Afr. Z. B. II. t. 9. — Rchb. Handb. I. p. 77. 158. t. 450. 3248-49. — Hartl. Orn. Westafr. p. 263. 742. — *Melittophagus Bullockoides* (!) Gray Gen. B. I. p. 86. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 72. 5. — Bp. Consp. I. p. 164. gen. 310. 6. — *Coccolarynx Bullockioides* (!) Rchb. Handb. I. p. 83. 158. —

Süd-Africa — ♂ jun. — 1 St.

390. 2. S. Bullocki Nob.

Guêpier Bullock ou à gorge rouge Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 59. t. 20. — Donov. Nat. Repes. t. 45. — *Merops Bullockii* Vieill. N. D. XIV. p. 13. — Id. Enc. p. 391. 29. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 8. 96. — Id. Orn. Westafr. p. 41. 117. — *Merops cyanogaster* Sws. B. W.-Afr. II. p. 80. t. 8. — *Melittophagus Bullockii* Gray Gen. B. I. p. 86. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 72. 4. — Bp. Consp. I. p. 163. gen. 310. 5. —

Senegal — ♂ — 1 St.

391. 3. S. frenatus Nob.

Merops Bullockii Rüpp. (nec Vieill.) Syst. Übers. p. 24. 101. — Rchb. Handb. I. p. 78. 159. t. 450. 3250-51. — Heugl. Übers. p. 20. 144. — *Coccolarynx Bullockii* Rchb. (nec Vieill.) Handb. I. p. 83. 159. — *Merops frenatus* Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 257. — Id. Orn. Westafr. p. 42. 117 Anm. —

Sennaar — ♂; Abyssinien — ♀ — 2 St.

Gen. MELITTIAS *) Nob. — Urica.

Urica (!) Bp. 1854.

392. 1. M. quinticolor Nob.

Guêpier quinticolor Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 51. t. 15 (ad.). — *Guêpier Laichenot* Id. l. l. p. 55. t. 18 (juv.) — *Merops quinticolor* Vieill. N. D. XIV. p. 20. — Id. Enc. p. 393. 34.— Jerd. Madr. Journ. Lit. & Sc. 1840. p. 229.— Gray Gen. B. I. p. 86. 11. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 70. 7. — Bp. Consp. I. p. 163. gen. 309. 15. — Rchb. Handb. I. p. 63. 137. t. 600. 3544. — Horsf. &

Wissensch. 1858. p. 320 (vom blauen Nil); da aber diese gelbkehlige Art den Namen *Coccolarynx* (mit blutrother Kehle) geradezu widerspricht, so möchten wir denselben in obiger Weise in *Spheconax* (von σφήξ. Wespe und ἄναξ, Herrscher) umgeändert sehen. —

*) Von μελίττα (Biene) wie μυίας von μυῖα gebildet. —

Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 88. 108. — *Merops Leschenaulti* Vieill. N. D. XIV. p. 18. — Id. Enc. p. 391. 27. — Gray Gen. B. I. p. 86. 18. — Rchb. Handb. I. p. 64. t. 478. 3394 (juv.). — *Merops urica* Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 172. — Sws. Z. Ill. t. 8. — Rchb. Handb. I. p. 63. 138. t. 443. 3223-24. — *Merops erythrocephalus* Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 104. — *Urica quinticolor* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 96. 245. — *Urica Leschenaulti* Id. l. l. p. 8. gen. 96. 246. —

Java — ♂ — 1 St.

Gen. MELITTOPHAGUS Boie 1828. — Zwergspint.

Sphecophobus Rchb. 1852.

393. 1. M. erythropterus Boie

Isis 1828. p. 316. — Gray List Gen. B. p. 15. — Id. Gen. B. I. p. 86. 1. — List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 71. 1. — Bp. Consp. I. p. 163. gen. 310. 1. — *Guêpier du Sénégal* Buff. Pl. enl. 318. — *Merops erythropterus* Gm. S. N. p. 464. 15. — Vieill. Enc. p. 275. 7. — Sws. B. W.-Afr. II. p. 88. — Rchb. Handb. I. p. 73. 152. t. 447. 3240-41. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 7. 91. — Id. Orn. Westafr. p. 40. 113. — *Guêpier minule* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 53. t. 17. — *Merops minutus* Vieill. N. D. XIV. p. 18. — Id. Enc. p. 392. 30. — *Merops minulus* Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — Less. Trait. p. 239. 12. — *Merops pusillus* Sws. B. W.-Afr. II. p. 89. — *Sphecophobus erythropterus* Rchb. Handb. I. p. 82. 152. — *Merops cupreus* Licht. in Mus. Berol. —

Egypten — ♂ ad.; Abyssinien — ♂ ad., ♀ juv.; Senegal — 2 ♀ ad. — 5 St.

394. 2. M. angolensis Nob.

Apiaster angolensis Briss. Av. IV. p. 558. 11. t. 44. 1a (jun.) — *Merops angolensis* Gm. S. N. p. 463. 12. — Vieill. Enc. p. 274. 4 (jun.). — *Guêpier Sonnini ou à collier gros bleu* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 33. t. 7. — *Merops variegatus* Vieill. N. D. XIV. p. 12. — Id. Enc. p. 390. 26. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 6. 89. — Id. Orn. Westafr. p. 39. 110. — *Melittophagus variegatus* Gray Gen. B. I. p. 86. 2. — *Melittophagus sp.* Id. l. l. p. 86. 3. — *Melittophagus Sonnini* Bp. Consp. I. p. 163. gen. 310. 2. — *Melittophagus cyanipectus* Verr. R. & Mag. Z. 1851. p. 269. — *Merops cyanipectus* Rchb. Handb. I. p. 71. 147. t. 478. 3392-93. — *Merops Sonnini* „Vieill." Id. l. l. p. 71. 148. t. 447. 3237. — *Sphecophobus cyani-*

pectus Id. l. l. p. 82. 147. — *Sphecophobus Sonninii* Id. l. l. p. 82. 148. —
Gabon — ♂ — 1 St.

Gen. DICROCERCUS *) Nob. — Gabelschwanz-Spint.

Melittophagus Rchb. 1852 & Bp. 1854 (nec Boie 1828).

395. 1. D. hirundinaceus Nob.

Guêpier tawa ou à queue fourchue Levaill. Prom. & Guêp II. p. 35. t. 8. — *Merops hirundinaceus* Vieill. N. D. XIV. p. 21. — Id. Enc. p. 392. 32. — Sws. B. W. - Afr. II. p. 91. t. 10. — Gray Gen. B. I. p. 86. 16. — Rchb. Handb. I. p. 69. 145. t. 446. 3235-36. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 7. 91. — Id. Orn. Westafr. p. 40. 112. — *Merops tawa* Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — *Merops chrysolaimus* Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 99. — *Melittophagus tawa* Boie Isis 1828. p. 316. — *Merops azuror* Less. Trait. p. 239. 13. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — *Merops furcatus* Stanley Salt's Trav. App. p. 57. 18. — *Melittophagus hirundinaceus* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 71. 3. — Bp. Consp. I. p. 163. gen. 310. 4. — Rchb. Handb. I. p. 82. 145. — *Merops Tormisi* Aliq. . . . . —
Senegal — ♂ ad.; Süd-Africa — ♀ jun. — 2 St.

Gen. PHLOTHRUS Rchb. 1852. — Grün-Spint.

396. 1. P. viridis Rchb.

Handb. I. p. 82. 143. — *Merops viridis* Lin. S. N. p. 182. 2. — Vieill. Enc. p. 273. 2. — Less. Trait. p. 238. 8. — Sykes P. Z. S. 1832. p. 82. — Gray Gen. B. I. p. 86. 10. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 69. 4. — Blyth. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 53. — Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 58. — Bp. Consp. I. p. 162. gen. 309. 11. — Rchb. Handb. I. p. 57. 143. t. 445. 3231-32. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 84. 104. — *Guêpier à collier de Madagascar* Buff. Pl. enl. 740. — *Merops viridis var. β ♀ ♂* Gm. S. N. p. 450. 2. — *Merops orientalis ♀ torquatus* Lath. (ad. & jun.). — *Guêpier Lamark ou à gorge bleue* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 39. t. 10. — *Merops Lamarkii* Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — *Merops indicus* Jerd. Madr. Journ. 1840. p. 227. — Blyth Ann. Nat. Hist. XII. p. 93. — *Merops torquatus ♀ ferrugeiceps* Hodgs. Gray Z. Misc. 1844. p. 82. —
Java — ♂; Ostindien — ♂, ♀ — 3 St. *Q*

*) Von δίκροος (gabelförmig) und κέρκος Schwanz). —

397. 2. P. cyanophrys nov. sp.

??Rchb. Handb. I. t. 445. 3204 —

Supra virescens, subtus aeruginosus, gula, fronte superciliis turcino-caeruleis, torque lato striaque oculari nigris; remigibus primariis fuscis, secundariis fulvescentibus, utrisque extus virescente-limbatis lateque nigro-apicatis; rectricibus virescentibus, subtus fuscis, duabus mediis angustatis et elongatis; rostro nigro, pedibus fuscis. — Long. tot. 7″, al. 3″ 9‴, caud. 3″, rectric. duab. med. 4″, rostr. culm. 13‴, tars. 5‴, dig. med. exc. ung. 4½‴. —

Arabien — ♂ juv. — 2 St.

398. 3. P. viridissimus Rchb.

Handb. I. p. 82. 142. — *Merops aegyptius* Licht. (nec Forsk.) Doubl. p. 13. 99. — Kittl. Kupf. Vög. t. 7. 1. — *Merops viridissimus* Sws. B. W.-Afr. II. p. 82. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — Bp. Consp. I. p. 162. gen. 319. 10. — Rchb. Handb. I. p. 66. 142. t. 445. 3229-30. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 7. 93. — Id. Orn. Westafr. p. 40. 114. — *Merops viridis* Rüpp. (nec Lin.) Syst. Übers. p. 24. 97. — Heugl. Übers. p. 19. 140. —

Senegal — ♂; Abyssinien — ♂; Berberei — ♀ — 3 St.

Gen. AËROPS Rchb. 1852. — Immenwolf.

Aerops (!) Rchb. 1852.

399. 1. A. albicollis Rchb.

Handb. I. p. 82. 157. — *Merops superciliosus var. γ* Lath. Gen. Hist. IV. p. 228. — *Guêpier Cuvier ou à gorge blanche* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 37. t. 9. — *Merops albicollis* Vieill. N. D. XIV. p. 15. — Id. Enc. p. 393. 36. — Gray Gen. B. I. p. 86. 12. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 70. 6. — Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309, 6. — Rchb. Handb. I. p. 76. 157. t. 449. 3246-47. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 6. 87. — Id. Orn. Westafr. p. 39. 108. — *Merops Cuvieri* Licht. Doubl. p. 13. 97. — Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — Less. Trait. p. 238. 11. — Sws. B. W.-Afr. II. p. 85. — Heugl. Übers. p. 19. 140. — *Merops Savignyi* Sws. (nec Cuv.) Z. III. t. 76. —

Abyssinien — ♂, ♀ — 2 St.

Gen. MELITTOPHAS Rchb. 1852. — Braunkopf-Spint.

400. 1. M. bicolor Nob.

Guêpier de l'isle de France Buff. Pl. enl. 252. — *Merops*

bicolor Bodd. Tabl. Pl. enl. 252. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — *Merops badius* Gm. S. N. p. 462. 10. — Gray Gen. B. I. p. 86. 14. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 70. 8. — Bp. Consp. I. p. 162. gen. 309. 13. — Rchb. Handb. I. p. 75. 156. t. 449. 3244. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 87. 106.— *Merops castaneus* Lath. Ind. Orn. I. p. 273. — Vieill. Enc. p. 276. 13. — *Guêpier Latreille* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 45. t. 12. — *Merops sumatranus* Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 294. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 53. — *Merops cyanopygius* Less. Trait. p. 238. 10. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — *Merops Latreillei* Bp. Consp. I. p. 161. — Rchb. Handb. I. p. 76. — *Merops hypoglaucus* Id. I. I. p. 76. t. 449. 3245 (juv.). — *Melittophas hypoglaucus* Id. I. I. p. 82. 156 (juv.). — *Melittophas badius* Id. I I. p. 82. 156 (ad.). — *Melittophas philippinus* (!!) Bp. (nec Lin.) Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 96. 242. —

Malacca — ♂; Borneo — ♀; Sumatra — ♀ — 3 St.

Gen. COSMAERops *) nov. gen — Schmuck-Spint.

401. 1. C. ornatus Nob.

Merops ornatus Lath. Ind. Orn. Suppl. p. 30. — Dumont N. D. ed. Levrault p. 53. — Gould B. Austr. II. t. 16. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 39. 48. — Gray Gen. B. I. p. 86. 8. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 70. 5. — Bp. Consp. I. p. 162. gen. 309. 12. — Rchb. Handb. I. p. 68. 144. t. 446. 3233-34. — *Guêpier Thouin ou à long-brins* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 26. t. 4. — *Philemon ornatus* Vieill. N. D. XVII. p. 423. — *Merops Thouini s. tenuipennis* Dumont N. D. ed. Levrault p. 52. — *Merops melanurus* Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. XV. p. 208. — Lewin B. New-Holl. t. 18. — Less. Trait. p. 238. 7. — *Melittophagus ornatus* Rchb. Handb. I. p. 82. 144. —

Neu-Süd-Wales — 2 ♂; Süd-Australien — ♀; Timor **) — ♂ — 4 St.

*) Von κόσμος (Schmuck) und ἀέροψ = μέροψ (Spint). —

**) Gould behauptet a. a. O., diese Art sei nur auf Australien selbst beschränkt, indessen beweist ausser dem vorliegenden Weibchen von Timor auch ein junges Exemplar des berliner Museum's aus Neu-Guinea eine weitere Verbreitung dieser Art. Es ist unseres Wissens bisher noch kein *Merops* auf der letztern Insel gefunden worden. —

Gen. MEROPS Lin. 1756. — Bienenfresser.

Apiaster Briss. 1760. *Blepharomerops* Rchb. 1852.

402. 1. M. philippinus Lin.

S. N. p. 183. 5. — Vieill. Enc. p. 275. 6. — Gray Gen. B. I. p. 68. 9. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 69. 3.—Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 57.— Jerd. Madr. Journ. Lit. & Sc. 1840. p. 228. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 52. — Rchb. Handb. I. p. 70. 146. t. 478. 3391. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 86. 105. — *Grand guêpier des Philippines* Buff. Pl. enl. 57. — *Guêpier Daudin ou à queue d'azur* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 49. t. 14. — *Merops Daudini* Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — *Merops javanicus* Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 171. — Raffl. I. I. p. 291. — Gray Gen. B. I. p. 68. 7. — Bp. Consp. I. p. 162. gen. 309. 14. — Rchb. Handb. I. p. 66. 141. t. 444. 3227—28. — *Merops philippensis* Temm. Tabl. méth. p. 73. — *Merops typicus* Hodgs. Gray's Z. Misc. 1844. p. 82. — *Merops cyanorrhos* Temm. in Mus. Lugd. — *Merops savignyoides* in Mus. Massen. — *Blepharomerops javanicus* *) Rchb. Handb. I. p. 82. 141. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 16. 240.— *Blepharomerops philippinus**) Rchb. Handb. I. p. 82. 143.— *Blepharomerops typicus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 8. gen. 16. 241. —

Java — 3 ♂ ad., ♀ ad., ♀ jun. — 5 St.

403. 2. M. chrysocercus Nob.

Guêpier Savigny var. Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 31. t. 6b. — *Merops Savignyi* Sws. (nec Cuv.) B. W.-Afr. II. p. 77. t. 7. — Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309. 3. — Rchb. Handb. I. p. 65. 140. t. 144. 3225—26. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 6. 86. — Id. Orn. Westafr. p. 38. 107. — *Merops aegyptius* Bp. (nec Forsk.) Iconogr. Faun. Ital. t. 25. 1.— *Blepharomerops Savignyi* Rchb. (nec Cuv.) Handb. I. p. 82. 140. — *Merops longicauda* (!) Vieill. N. D. XIV.

---

*) Die Vergleichung einer ganzen Reihe von Exemplaren dieser Art im berliner Museum von Ceylon, Malacca, Java und den Philippinen hat uns keine genügenden specifischen Unterschiede entdecken lassen, ausser dass die philippinischen Vögel einen etwas dunklern Schein als die lebhafter gefärbten von Malacca und Java zeigen, und glauben wir desshalb Gray und Moore in der Vereinigung von *M. javanicus* und *M. philippinus* folgen zu müssen. —

p. 15. — Id. Enc. p. 393. 37. — Gray Gen. B. I. p. 86. 20 (Artefact.). —

Maior: fronte vix virescenti-albida, rectricibus splendide virenti-aureis absque margine cyaneo, duabus mediis valde elongatis. — Long. tot. 10″ 3‴, al. 5″ 8‴, caud. 3″ 7‴, rectric. med. 6″, rostr. culm. 1″ 7‴. —

Senegal — ♂ — 1 St.

404. 3. M. aegyptius Forsk.

Faun. Arab. I. no. 2.— Vieill. Enc. p. 276. 11.— Gray Gen. B. I. p. 68. 6. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 69. 2. — Bp. Consp. 1. p. 161. gen. 309. 2. — Rchb. Handb. I. p. 64. 139. t. 600. 3545-46. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 89. 109. — *Merops persica* Pall. It. II. App. p. 708. 16. — Id. Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 440. 82. — Blas. & Keys. Wirbelth. Eur. p. 35. 74. — *Merops viridis var. γ* Gm. S. N. p. 461. 4. — Vieill. Enc. p. 279. — *Merops superciliosus var. β* Gm. S. N. p. 461. 2. — *Guêpier Savigny* Levaill. Prom. & Guèp. II. p. 30. t. 6 (ad.). — *Guêpier rousse-gorge* Id. l. l. p. 52. t. 16 (juv.). — *Merops ruficollis* Vieill. N. D. XIV. p. 22. — Id. Enc. p. 392. 31 (juv.). — *Merops Savignyi* Cuv. Règn. Anim. I. p. 442. — *Merops superciliosus* Licht. (nec Lin.) Doubl. p. 13. 96. — Heugl. Übers. p. 19. 138.— *Merops chaddaejr* Forsk. (juv.). — *Merops shaeghagha* Bp. (nec Forsk.) Consp. I. p. 161. — *Blepharomerops aegyptius* Rchb. Handb. I. p. 82. 139. —

Medius: fronte vittaque superciliari pulchre caerulescenti-alba, cauda alisque minus splendide virentibus, rectricibus duabus mediis minus elongatis. — Long. tot. 9″ 3‴, al. 5″ 4‴, caud. 3″ 3‴, rectric. med. 5″, rostr. culm. 1″ 6‴. —

Egypten — ♂ ad., ♀ ad.; Nubien — ♂ jun. — 3 St.

405. 4. M. superciliosus Lin.

S. N. p. 182. 4. — Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309. 5. — Rchb. Handb. I. p. 74. 154. t. 448. 3242. — *Guêpier de Madagascar* Buff. Pl. enl. 219. — *Guêpier Bonnelli ou rousse-tête* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 57. t. 19. — *Merops ruficapillus* Vieill. N. D. & Enc. — *Merops Vaillanti* Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309. 4. —

Minor: capite nitore quodam rufo - brunnescente, fronte vittaque superciliari pulchre caerulescenti, cauda alisque minus splendide virentibus nonnihil flavido - nitentibus; rectricibus duabus mediis minus elongatis. — Long. tot. 9″,

al. 4″ 9‴, caud. 3″ 3‴, rectric. med. 5″, rostr. culm. 1″ 6‴. —

Port Natal — ♀ jun., ♂ juv. — 2 St.

406. 5. M. apiaster Lin.

S. N. p. 182. 1. — Vieill. Enc. p. 272. 1. — Brehm Vög. Deutschl. p. 147. 2 (juv.). — Naum. Vög. Deutschl. V. p. 462. 177. t. 143. 1-2. — Less. Trait. p. 237 1. t. 30. 1. — Sws. B. W.-Afr. II. p. 75. — Gould B. Eur. t. 59. — Blas. & Keys. Wirbelth. Eur. p. 35. 75. — Gray Gen. B. I. p. 86. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 42. 1. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 309. 1. — Rchb. Handb. I. p. 62 136. t. 443. 3220-22. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 5. 85. — Id. Orn. Westafr. p. 38. 106. — *Merops shaeghagha* Forsk. Faun. Arab. p. 1. 2. — *Guêpier* Buff. Pl. enl. 938. — *Merops congener* Gm. S. N. p. 461. 3. — Vieill. Enc. p. 277. 14 (juv.). — *Merops chrysocephalus* Gm. S. N. p. 463. 11. — Vieill. Enc. p. 274. 5 (ad.). — *Guêpier vulgaire* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 21. t. 1-2. — *Merops Hungariae* Brehm Vög. Deutschl. p. 146. 1. t. 11. 1 (ad.). — *Merops brevirostris* „Boiss.“ Rchb. Handb. I. p. 62. —

Ungarn — 2 ♂ ad.; Spanien — ♂ juv. — 3 St.

Gen. MELITTOTHERES Rchb. 1853. — Bienenjäger.

407. 1. M. nubicus Rchb.

Handb. I. p. 82. 161. — *Guêpier rouge à tête-bleue* Buff. Pl. enl. 649. — *Merops nubicus* Gm. S. N. p. 464. 14. — Vieill. Enc. p. 275. 8. — Less. Trait. p. 237. 4. — Gray Gen. B. I. p. 86. 15. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 71. 9. — Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309. 7. — Rchb. Handb. I. p. 79. 161. t. 451. 3254 - 55. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 8. 65. — Id. Orn. Westafr. p. 41. 116. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 88. 107. — ?*Merops brasiliensis* Gm. S. N. p. 462. 9. — *Merops caeruleocephalus* Lath. Ind. Orn. I. p. 274. — Sws. B. W.-Afr. II. p. 87. t. 9. — Rüpp. Syst. Übers. p. 24. 98. — Heugl. Beitr. t. 40. 6. — Id. Übers. p. 19. 141. — *Merops superbus* Penn. Ind. Z. Suppl. p. 33. — Steph. Gen. Z. VIII. p. 161. — Shaw Nat. Misc. t. 78. — *Guêpier rose à tête bleue* Levaill. Prom. & Guêp. II. p. 24. t. 3. —

Nubien — ♂, ♀ — 2 St.

408. 2. M. natalensis Rchb.

Handb. I. p. 82. 160. — *Merops nubicoides* (!) Desmurs & Puch. R. Z. 1846. p. 243. — Id. Iconogr. Orn. livr. 6. 7. t. 35. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 71. 10. — Bp. Consp. I. p. 161. gen. 309. 8. — *Merops natalensis* Rchb. Handb. I. p. 78. 160. t. 451. 3252-53. — *Melittotheres nubicoides* (!) Bp. Consp. Vol. Anis. p 8. gen. 98. 250. —

Port Natal — ♂ — 1 St.

Fam. ALCEDINIDÆ. Eisvögel.

Subfam. ALCEDININÆ. Königsfischer.

Gen. ALCYONE Sws. 1837. — Lasur-Eisvogel.

Therosa Müll. 18??

409. 1. A. diemensis Gould

P. Z. S. 1846. p. 19. — Id. Introd. B. Austr. p. 31. 65. — Rchb. Vög. Neuholl. III. p. 278. 65. — Gray Gen. B. I. p. 82. 3. — Kaup Fam. Eisv. p. 18. subgen. 5. 2c. — Rchb. Handb. I. p. 81. 19. —

Vandiemensland — ♀ — 1 St.

Gen. ALCEDO Lin. 1756. — Eisvogel.

410. 1. A. semitorquata Sws.

Z. Ill. III. t. 151. — Rüpp. Syst. Übers. p. 20. t. 7 & p. 23. 94. — Gray Gen. B. I. p. 81. 6. — Kaup Fam. Eisv. p. 17. subgen. 4. 3c. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 63. 6. — Bp. Consp. I. p. 159. gen. 307. 8. — Rchb. Handb. I. p. 5. 7. t. 395. 3054-55. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 4. 6. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 3. 75. — Id. Orn. Westafr. p. 34. 94. — *Alcedo azureus* Less. Trait. p. 243. 9. —

Senegal — ♂; Abyssinien — ♀ — 2 St.

411. 2. A. ispida Lin.

S. N. p. 179. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 252. 20. — Pall. Zoogr. Rosso-Asiat. p. 437. — Vieill. Enc. p. 295. 31. — Brehm Vög. Deutschl. I. p. 149. 2. — Naum. Vög. Deutschl. V. p. 479. 178. t. 144. 1-2. — Kittl. Kupf. Nat. Gesch. Vög. t. 29. 1. — Gould B. Eur. t. 61. — Blas. & Keys. Wirbelth. Eur. p. 35. 73. — Gray Gen. B. I. p. 81. 1. — Kaup Fam. Eisv. p. 17. subg. 4. 3d. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 62. 1. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 40. 1. — Bp. Consp. I. p. 158. gen. 307. 2. — Rchb. Handb.

I. p. 1. 1. t. 480. 3401-3. & t. 392. 3038-42. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 3. 1. — *Martin-pêcheur* Buff. Pl. enl. 77. — *Gracula atthis* Gm. S. N. p. 398. 8. — Lath. Ind. Orn. I. p. 192. 18. — *Sturnus atthis* Daud. — *Alcedo cristata* Sander (nec Lin.). — *Alcedo aegyptia* Vieill. Enc. p. 292. 24. — *Alcedo subispida* Brehm Vög. Deutschl. I. p. 149. 1. — *Alcedo advena* Id. l. l. p. 150. 3. t. 9. 2. — *Alcedo hispida* Less. Trait. p. 243. 8. — *Alcedo Pallasii* Rchb. Handb. I. p. 3. 2. t. 392. 3043-44. & t. 393. 3045. 46. —

Harz — ♂ ad., ♂ jun., ♀ ad., 2 pull.; Egypten — ♂ jun., ♀ juv.; N. O. Africa — ♀ ad. — 8 St.

412. 3. A. bengalensis Gm.

S. N. p. 450. 20. — Vieill. Enc. p. 291. 21. — Kittl. Kupf. Vög. t. 29. 2. — Sykes P. Z. S. 1832. p. 84. — M'c Clelland l. l. 1839. p. 156. — Jerd. Madr. Journ. 1840. p. 231. — Gray Gen. B. I. p. 81. 2. — Kaup Fam. Eisv. p. 16. subgen. 4. 3b. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 63. 2.—Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 57. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 49. — Bp. Consp. I. p. 158. gen. 307. 3. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 3. 2. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 129. 162. — *Alcedo hispidoides* Less. Compl. Buff. IX. p. 345. — *Alcedo hispidula* Cat. Rivoli Coll. p. 2. 3. — *Alcedo bengalensis var. indica* Rchb. Handb. I. p. 3. 3a. t. 393. 3047. —

Ostindien — ♂ — 1 St.

413. 4. A. sondaïca Nob.

Alcedo bengalensis var. sondaïca Rchb. Handb. I. p. 3. 3b. —

Borneo — ♂ ad.; Java — ♀ jun. — 2 St.

414. 5. A. meninting Horsf.

Trans. Linn. Soc. XIII. p. 172. — Temm. Pl. col. 239. 2.— Gray Gen. B. I. p. 81. — Kaup Fam. Eisv. p. 16. subgen. 4. 3a. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 63. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 49. — Bp. Consp. I. p. 158. gen. 307. 5. — Rchb. Handb. I. p. 4. 4. t. 394. 3050-51.— Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 3. 4. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 130. 163. — *Alcedo bengalensis var. β* Gm. S. N. p. 450. 20. — *Ceyx meninting* Cuv. Règn. Anim. I. p. 444. — *Alcedo asiatica* Sws. Z. Ill. n. s. t. 50. — *Alcedo bengalensis* Less. (nec Lin.) Trait. p. 243. 10. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

Gen. ISPIDINA Kaup 1848. — Zwerg-Eisvogel.

Ipsidina (!) Kaup 1848.

415. 1. I. picta Rchb.

Handb. I. p. 6. 13. t. 397. 3061-62. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 14. 1. — *Todier de Juida* Buff. Pl. enl. 783. 1. — *Todus pictus* Bodd. Tabl. Pl. enl. p. 49. t. 783. 1. — *Todus caeruleus* Gm. S. N. p. 444. 4. — *Alcedo capistrata* Shaw Gen. Z. VIII. p. 64. — *Alcedo ultramarina* Daud. Ann. Mus. II. p. 442. t. 62. 2. — Shaw Nat. Misc. t. 901. — *Alcedo pusilla* Id. l. l. t. 159. — *Alcedo todina* Merrem. — *Alcedo nutans* Vieill. N. D. XIX. p. 412. — Id. Enc. p. 396. 43. — *Alcyone coronata* Smith. — *Halcyon cyanotis* Sws. B. W.-Afr. II. p. 103. — *Alcedo picta* Gray Gen. B. I. p. 81. t. 28. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 65. 13. — Kaup Fam. Eisv. p. 12. subgen. 1. 1. — *Alcedo cyanotis* Bp. Consp. I. p. 159. gen. 307. 12. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 4. 77. — Id. Orn. Westafr. p. 35. 96. — *Alcedo caerulea* Heugl. Übers. p. 18. 135. —

Goldküste — ♂ — 1 St.

Gen. CORYTHORNIS Kaup 1848. — Hauben-Eisvogel.

Alcedo Lin. 1766 (nec 1756).

416. 1. C. cyanocephala Nob.

Petit martin-pêcheur du Sénégal Buff. Pl. enl. 356. — *Alcedo caeruleocephala* (!) Gm. S. N. p. 449. 19. — Vieill. Enc. p. 290. 19. — Less. Trait. p. 243. 12. — Gray Gen. B. I. p. 81. 8. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 64. 8. — Kaup Fam. Eisv. p. 13. subgen. 2. 1b. — Bp. Consp. I. p. 159. gen. 307. 14. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 4. 79. — Id. Orn. Westafr. p. 36. 100. — *Alcedo cyaneocephala* Shaw Gen. Z. VIII. p. 100. — *Alcedo cyanostigma* Rüpp. Neue Wirbelth. t. 24. 2 (juv.). — Gray Gen. B. I. p. 81. 9. — Id. Licht Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 64. 11. — Kaup Fam. Eisv. p. 13. subgen. 2. 1d. — Bp. Consp. I. p 164. gen. 307. 15. — Heugl. Übers. p. 18. 134. — *Corythornis caeruleocephala* (!) Rchb. Handb. I. p. 18. 44. t. 397. 3063. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 6. 2. — *Corythornis cyanostigma* Rchb. Handb. p. 19. 46. t. 395. 3057-59. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 63. —

Mozambique — ♂ ad.; Sennaar — ♂ jun. — 2 St.

417. 2. C. cristata Rchb.

Handb. I. p. 18. 45. t. 403. 3176-77. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 6. 1. — *Alcedo cristata* Lin. S. N. p. 178. 1. — Vieill. Enc. p. 295. 30. — Kittl. Kupf. Vög. t. 29. 3. — Gray Gen. B. I. p. 81. 10. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 64. 10. — Kaup Fam. Eisv. p. 13. subgen. 2. 3. — Bp. Consp. I. p. 159. gen. 307. 16. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 4. 80. — Verr. R. & Mag. Z. 1855. p. 353. — Hartl. Orn. Westafr. p. 36. 99. — *Petit martin-pêcheur de l'isle de Luçon* Ruff. Pl. enl. 756. 1. — *Alcedo cristata var. β* Licht. Doubl. p. 12. 94. —

Cap — ♂; Port Natal. — ♂ — 2 St.

Gen. CHLOROCERYLE Kaup 1849. — Grün-Königsfischer.

Amazonis Rchb. 1851.

418. 1. C. superciliosa Rchb.

Handb. I. p. 28. 65. t. 415. 3122-24. — Burm. Th. Bras. II. p. 308 Anm. 2. — *Alcedo superciliosa* Lin. S. N. p. 179. 6. — Lath. Ind. Orn. I. p. 259. 39. — Vieill. Enc. p. 287. 12. — Less. Trait. p. 244. 15. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 704. 175. — *Martin-pêcheur petit vert de Cayenne* Buff. Pl. enl. 756. 2-3. — *Ceryle superciliosa* Gray Gen. B. I. p. 82. 11. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 62. 9. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 10. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 5. 8. — Pelzeln Sitzungsber. Acad. Wissensch. Wien Apr. 1851. Üb. neue & wenig gek. Art. Fam. Trog. & Alced. k. k. Mus. p. 515. — *Amazonis superciliosa* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 128. 339. —

Guiana — ♂ ad., ♀ ad., ♀ jun. — 3 St.

419. 2. C. viridirufa Nob.

Alcedo inda (!) Lin. S. N. p. 179. 2. — Lath. Ind. Orn. I. p. 259. 37. — Vieill. Enc. p. 397. 33. (jun.?) — *Martin-pêcheur vert & roux de Cayenne* Buff. Pl. enl. 592. 1-2. — *Alcedo viridirufa* Bodd. Tabl. Pl. enl. p. 36. t. 592. 1-2. — *?Alcedo surinamensis* Gm. S. N. p. 448. 17. — *Alcedo bicolor* Id. l. l. p. 451. 24. — Lath. Ind. Orn. I. p. 258. 34. — Vieill. Enc. p. 290. 17. — Less. Trait. p. 242. 6. — Wied Beitr. IV. p. 23. 4. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 704. 173. — *? Alcedo maculata* Gm. S. N. p. 451. 25. — Vieill. Enc. 293. 26 (juv.). — *Ceryle viridirufa* Gray Gen. B. I. p. 82. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 61. 4. — *? Ceryle inda* Gray Gen. B. I. p. 82.

10. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 5. 5. — Burm. Th. Bras. II. p. 526. — *? Ceryle surinamensis* Gray Gen. B. I. p. 62. 13. — *Ceryle bicolor* Kaup Fam. Eisv. p. 8. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 6. — Pelzeln Sitzungsber. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 515. — *Chloroceryle bicolor* Rchb. Handb. p. I. 28. 60. t. 414. 3118-19. — Burm. Th. Bras. II. p. 406. — *Amazonis bicolor* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 129. 339. —

Brasilien — ♂ ad., ♀ jun.; Cayenne — ♀ ad.; Guiana — ♀ ad. — 4 St.

420. 3. C. americana Rchb.

Handb. I. p. 27. 63. t. 413. 3112-15. — Burm. Th. Bras. II. p. 407. — *Martin-pêcheur vert & blanc de Cayenne* Buff. Pl. enl. 591. 1-2. — *Alcedo americana* Gm. S. N. p. 451. 23. — Lath. Ind. Orn. I. p. 258. 35. — Wied Beitr. IV. p. 17. — Less. Trait. p. 242. 7. — Hartl. Ind. Azar. p. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 704. 174. — *Martin-pescador verde obscuro* Azar. Apunt. no. 421. — *Alcedo viridis* Vieill. N. D. XIX. p. 413. — Id. Enc. p. 397. 45. — *Alcedo brasiliensis* Gm. S. N. p. 450. 22. — Vieill. Enc. p. 293. 28. — *Ceryle americana* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 60. 3. — Id. Gen. B. I. p. 82. 8. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 9. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 5. 6. — Pelzeln Sitzungsber. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 515. — *Chloroceryle chalcites* Rchb. Handb. I. p. 28. 64. t. 415. 3120-21. — Burm. Th. Bras. II. p. 408 Anm. 1. —

Brasilien — ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ jun., 2 ♀ juv.; Caracas — 2 ♂ ad., ♀ ad. — 9 St.

421. 4. C. Cabanisi *) Rchb.

Handb. I. p. 27. 62. — *Alcedo americana* Tsch. (nec Gm.) Consp. p. 39. 216. — *Alcedo Cabanisi* Id. Faun. Per. p.

*) Die Hauptunterschiede dieser Art von *C. americana* Rchb. bestehen in der bedeutendern Grösse, dem längern gestrecktern Schnabel, der grössern Ausdehnung der weissen Kehle und der starken Fleckenzeichnung auf den Flügeldeckfedern und Schwingen. Die von Tschudi angegebenen Unterscheidungs-Merkmale, als die breitern grünen Zügel und der stärker grün geschilderte Bauch sind durchaus schwankend und unwesentlich und waren vielleicht bei dem einzigen Exemplar Tschudi's individuell. Während *C. americana* sich von Brasilien durch Guiana bis Venezuela erstreckt, können wir bis jetzt für *C. Cabanisi* mit Sicherheit nur Peru, Costa Rica, Mexico und Californien als Vaterland angeben, glauben jedoch, dass auch die dazwischen liegenden Länder auf der Westseite America's, als Guatimala, Neu-Granada und Ecuador, diese Art und nicht die östliche *C. americana* beherbergen. Die Maassen der uns vorliegenden jungen Weibchen sind folgende: G. L. 8″ 3‴, Fl. 3″ 3‴, Schwanz 2″ 6‴, Schnabelfirste 1″ 7‴, Lauf $3^1/_2$‴, Mittelz. o. Kr. $3^1/_2$‴. —

253. — *Ceryle Cabanisi* Gray Gen. B. I. p. 82. 9. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 8. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 5. 7. — *Ceryle americana* Id. (nec Gray) B. Calif. I. p. 255. — Scl. P. Z. S. 1856. p. 286. 13. — Id. Ibis 1859. p. 131. 209. —

Mexico — ♀ jun., ♀ juv. — 2 St.

422. 5. C. amazonia *) Rchb.

Handb. I. p. 28. 60. t. 412. 3110-3111. — Burm. Th. Bras. II. p. 405. — *Alcedo amazona* (!) *) Lath. Ind. Orn. I. p. 257. 31. — Vieill. N. D. XIX. p. 399. — Id. Enc. p. 292. 25 (♀). — Tsch. Consp. p. 39. 217. — Id. Faun. Per. p. 253. — Hartl. Ind. Azar. p. 26. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 704. 172. — *Martin-pescador obscuro dorada* Azar. Apunt. no. 419 (♀). — *Martin-pescador garganta roxa* Id. l. l. no. 420 (♂). — *Alcedo vestita* Dumont Dict. Sc. Nat. XXIX. p. 272. — Less. Trait. p. 242. 3. — *Alcedo rubescens* Vieill. N. D. XIX. p. 408. — Id. Enc. p. 395. 42 (♂). — *Ceryle amazona* Gray Gen. B. I. p. 82. 7. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 61. 5. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 7. — Pelzeln Sitzungsber. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 515. — *Chloroceryle leucosticta* Rchb. Handb. I. p. 29. 61. t. 414. 3116-17 (juv.). — Burm. Th. Bras. II. p. 406 Anm. —

Brasilien — 2 ♂, ♀ — 3 St.

Gen. CERYLE Boie 1828. — Königsfischer.

Alcedo Ill. 1811 (nec Lin. 1756). *Ispida* Sws. 1837 (nec Briss. 1760).

423. 1. C. rudis Gray

List Gen. B. p. 14. — Id. Gen. B. I. p. 82. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 60. 1. — Bp. Consp. I. p. 159. gen. 308. 1. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 6. 9. — Rchb. Handb. I. p. 20. 49. t. 408. 3097 (♀). — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 5. 81. — Id. Orn. Westafr. p. 37.103 (♂ & ♀). — *Ispida ex albo et nigro varia* Briss. Av. IV. p. 520. t. 39. 2 (juv.). — *Alcedo rudis* Lin. S. N. p. 181. 12. — Vieill. Enc. p. 254. 5. — Less. Trait. p. 242. 5. — Blas. & Keys. Wirbelth. Eur. p. 35. 72. — *Martin-pêcheur noir et blanc du Sénégal* Buff. Pl. enl. 62 (♂ juv.). — *Martin-pêcheur huppé du cap de bonne esperance* Id. l. l. 716

**) Da das Wort *amazonus*, soviel wir wissen, nicht existirt, haben wir vorgezogen dasselbe einfach in *amazonius* umzuändern. —

(♀). — *Ispida bicincta* Sws. B. W.-Afr. II. p. 95 (♂). — *Ispida bitorquata* Id. Class. B. II. p. 336 (♂). — *Ceryle bicincta* Rchb. Handb. I. p. 20. 50. t. 408. 3098. —
Kaffernland — ♂ ad.; Senegal — ♂ jun.; Egypten — 2 ♀ — 4 St.

424. 2. C. varia Strickl.

Ann. & Mag. Nat. Hist. VI. p. 418. — Id. P. Z. S. 1842. p. 167. — *Alcedo rudis* Sykes (nec Lin.) l. l. 1832. p. 84. — Pearson Journ. A. S. B. 1841. p. 635. — *Ispida rudis* Jerd. (nec Lin.) Madr. Journ. 1840. p. 232. — *Ceryle rudis* Blyth (nec Lin.) Journ. A. S. B. 1842. p. 111.— Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 57.— Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 49. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 131. 165. — *Ceryle leucomelanura* Rchb. Handb. I. p. 21. 51. t. 418. 3488. —
Ostindien — ♀ — 1 St.

Gen. MEGACERYLE Kaup 1848. — Fischtiger*).

425. 1. M. guttata **) Nob.

Cnnsp. Vol. Anis. p. 10. gen. 124. 331. — *Alcedo guttata* Vig. P. Z. S. 1830. p. 22. — Gould Cent. Himal. B. t. 5.— *Ceryle guttata* Gray Gen. B. I. p. 82. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 60. 2. — Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 57. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 48. — Bp. Consp. I. p. 159. gen. 308. 2. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 6. 10. — Rchb. Handb. I. p. 21. 52. t. 409. 3104. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 132. 166. —
Nepal — ♂ — 1 St.

426. 2. M. lugubris ***) Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 124. 330. — *Alcedo lugubris* Temm. Pl. col. 548. — *Ceryle lugubris* Temm. & Schleg. Faun. Japon. p. 77. 3. t. 38b. — Bp. Consp. I. p. 160.

---

*) *Muchee-bag* (Fischtiger) nennen die Nepalesen nach Reichenbach *M. guttata* Bp.—

**) Ganze Oberseite fein bandirt und kleiner punktirt; Halsband breit aus schwarzen Flecken bestehend; Unterseite weiss, nur unter den Flügeln fein schwärzlich gebändert, Unterschwanz-Deckfedern reinweiss. —

***) Ganze Oberseite stärker und gröber punktirt und bandirt; Halsband schmal aus schwarzgrauen Flecken bestehend; Unterseite weiss mit starken auf der Bauchmitte fast zusammenstossenden schwarzen Bandirungen; Unterschwanz-Deckfedern weiss breit schwarz gebändert. —

gen. 308. 3. — Rchb. Handb. I. p. 22. 53. t. 408. 3099-3100. —
Japan — ♀ — 1 St.

Gen. ICHTHYNOMUS *) Nob. — Riesen-Königsfischer.

Megaceryle Rchb. 1851 (nec Kaup 1848).

427. 1. I. maximus Nob.

Martin-pêcheur huppé Buff. Pl. enl. 679 (♂ jun.). — *Alcedo maxima* Pall. Spicil. VI. p. 15. — Gm. S. N. p. 455. 34. — Vieill. Enc. p. 282. 2. — Less. Trait. p. 242. 1. — *Alcedo guttata* Bodd. Tabl. pl. enl. p. 42. t. 679. — *Alcedo afra* Shaw Gen. Z. VIII. p. 55. — *Ispida gigantea* Sws. B. W.-Afr. II. p. 93. t. 11. — Id. Class. B. II. p. 336 (♂ ad.). — *Ceryle maxima* Gray Gen. B. I. p. 82. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 61. 7. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 4. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 4. 1. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 5. 83. — Id. Orn. Westafr. p. 37. 101. — Gurney Ibis 1859. p. 243. 32. — *Megaceryle maxima* Rchb. Handb. I. p. 22. 54. t. 419. 2101-2 (♂ jun. & ♀ jun.). — *Megaceryle gigantea* Id. l. l. p. 23. 55. t. 409. 3103 & t. 418. 3486 (♂ ad. & ♀ ad.). — *Ceryle gigantea* Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 5. 84. — Id. Orn. Westafr. p. 38. 105. — *Alcedo gigantea* Müll. Journ. Orn. 1855. p. 9. 94. —
Senegal — ♂ jun.; Congo — ♀ ad. — 2 St.

Gen. STREPTOCERYLE Bp. 1854. — Halsband-Königsfischer.

428. 1. S. torquata Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 124. 332. — *Alcedo torquata* Lin. S. N. p. 180. 8. — Less. Trait. p. 242. 2. — Cab. Schomb. Reis. Guian. III. p. 703. 171. — *Martin-pêcheur huppé du Méxique* Buff. Pl. enl. 284. — *Martin-pescador celeste* Azar. Apunt. no. 417 (♀). — *Martin - pescador celeste obscuro* Id. l. l. no. 418 (♂ jun.).— *Alcedo cyanea* Vieill. N. D. XIX. p. 401.—Id. Enc. p. 395. 40 (♀).—Wied Beitr. IV. p. 5. — *Alcedo cinerea* Vieill. Enc. p.286. 9 (♂ jun.).— *Ceryle torquata* Bp. P. Z. S. 1837. p. 108. 3.— Hartl. Ind. Azar. p. 26. — Gray Gen. B. I. p. 82. 5. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 61. 6.— Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 5. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 4. 2. — Pelzeln Sitzungsber. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 514.— *Megaceryle torquata* Rchb. Handb. I. p. 24. 56. t. 411.

*) Von *ἰχθύς* (Fisch) und *νόμος* (Herrscher). —

3106. — Burm. Th. Bras. II. p. 404. — *Megaceryle caesia* Rchb. Handb. I. p. 24. 57. t. 411. 3107. — Burm. Th. Bras. II. p. 405 Anm. 2 (♂ ad.). —
Guiana — ♂; Brasilien — ♀ — 2 St.

429. 2. S. stellata Nob.

Alcedo stellata Meyen Nov. Act. phil. med. Soc. Caes. Leopold. Carol. N. Cur. XVI. Suppl. p. 93. t. 14. — Tsch. Faun. Per. p. 254.— *Alcedo torquata* Id. (nec Lin.) Consp. p. 39. 217. — *Megaceryle stellata* Rchb. Handb. I. p. 24. 58. t. 418. 3187. —
Chile — ♂ — 2 St.

430. 3. S. alcyon Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 125. 333. — *Alcedo alcyon* Lin. S. N. p. 180. 7. — Vieill. Enc. p. 283. 4. — Wils. Amer. Orn. III. p. 59. — Sws. & Rich. Faun. Bor. Amer. II. p. 339. — Nutt. Man. I. p. 594. — Aud. B. N.-Amer. I. p. 394. t. 77. — Id. Syn. B. N.-Amer. p. 173. 255. — Thompson Ann. & Mag. Nat. Hist. 1844. p. 430.— *Martin-pêcheur de la Louisiane* Buff. Pl. enl. 715. — *Ispida ludoviciana* Gm. S. N. p. 452-53. 7 var. α & β. — *Alcedo jaguacati* Dumont Dict. Sc. Nat. XIX. p. 406. — *Alcedo guacu* Vieill. N. D. XIX. p. 406. — *Ispida alcyon* Sws. Class. B. II. p. 336. — *Ceryle alcyon* Bp. P. Z. S. 1837. p. 108. 4. — Gray Gen. B. I. p. 82. 3. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 62. 8. — Id. List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 41. 2. — Bp. Consp. I. p. 160. gen. 308. 4. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 4. 3. — Gundl. Journ. Orn. 1856. p. 101. 120. — Newton Ibis 1859. p. 67. — *Megaceryle alcyon* Rchb. Handb. I. p. 25. 59. t. 412. 3108-9. — ?*Megaceryle domingensis* Id. I. I. p. 26. t. 410. 3105. —
Nord-America — ♂ ad.; Xalapa — ♂ jun., ♀ — 3 St.

Subfam. HALCYONINÆ. Lieste.

Gen. CEYX Lacép. 1800—1801. — Stummel-Liest.
Ceycis (!) Glog. 1842.

431. 1. G. melanura Gray

List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 59. 3. — Id. Gen. B. III. App. p. 5. — Bp. Consp. I. p. 158. gen. 305. 4. — Rchb. Handb. I. p. 9. 23. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p.

15. 2. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 413. 8. — *Alcedo melanura* Kaup Fam. Eisv. p. 4. subgen. 3. 1b. —
Philippinen — ♂ — 1 St.

432. 2. C. rufidorsa Strickl.

P. Z. S. 1846. p. 99. — Gray Gen. B. III. App. p. 5. — Bp. Consp. I. p. 158. gen. 305. 3. — Rchb. Handb. I. p. 8. 22. t. 398. 3070. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 15. 3. — Blyth Cat. B. Mus. Philad. p. 15. 3. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 50. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 413. 8. 1. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 132. 167. — *Alcedo madagascariensis* (!) Lin. S. N. p. 179. 5. — Vieill. Enc. p. 298. 35. — Jerd. Ill. Orn. t. 25. — Gray Gen. B. I. p. 81. 13. — *Martin-pêcheur de Madagascar* (!) Buff. Pl. enl. 778. 1. — *Alcedo tridactyla* Horsf. (nec Lin.) Trans. Linn. Soc. XIII. p. 174. — Raffl. l. l. p. 393. — *Ceyx tridactyla* Jard. & Selby (nec Lin.) Ill. Orn. II. t. 55. 2. — *Alcedo rufidorsa* Kaup Fam. Eisv. p. 15. subgen. 3. 1c. —
Malacca — ♂ — 1 St.

Gen. PAGUROTHERA*) Nob. — Krebsjäger.

Halcyon Bp. 1850 (nec Sws. 1821). *Chelicutia* (!) Rchb. 1851.

433. 1. P. Chelicuti Nob.

Alcedo Chelicuti Stanley Salt's Trav. App. p. 56. — *Dacelo pygmaea* „Kretzschm." Rüpp. Z. Atl. Vög. p. 42. t. 28b. — *Halcyon Chelicuti* Rüpp. Syst. Übers. Vög. p. 23. 88. — Gray Gen. B. I. p. 79. 6. — Id. List Spec. B. II. 1. p. 54. 9. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 11. 21. — Heuglin Übers. p. 18. 130. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 128. 160. — *Halcyon pygmaea* Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 6. — *Chelicutia pygmaea* Rchb. Handb. I. p. 38. 93. t. 424. 3154. —
Abyssinien — ♂ jun., ♀ — 2 St.

434. 2. P. variegata Nob.

Alcedo atricapilla var. β Lath. Ind. Orn. — *Alcedo variegata* Vieill. Enc. p. 397. 47. — *Alcedo striolata* „Ill." Licht. Doubl. p. 12. 93. — *Halcyon striolata* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 54. 10. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 7. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 1. 65. — Id.

*) Von *πάγουρος* (Krebs) und *θηράω* (jagen). —

Orn. Westafr. p. 31. 83. — *Chelicutia striolata* Rchb. Handb. I. p. 39. 94. t. 424. 3152. —

Mozambique — ♂ jun. — 1 St.

435. 3. P. fuscicapilla Nob.

Dacelo fuscicapilla Lafr. Mag. Z. 1833. t. 18. — *Dacelo Vaillantii* Temm. in Mus. Lugd. — *Halcyon fuscicapilla* Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 13. — Gray Gen. B. I. p. 79. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 54. 8. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 8. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 10. 20. — *Alcedo Vaillantii* Müll. Journ. Orn. 1855. p. 7. 72. — *Chelicutia fuscicapilla* Rchb. Handb. I. p. 39. 95. t. 424. 3152-53. —

Kaffernland — ♂ ad., ♀ jun.; Port Natal — ♂ jun., ♂ ad. — 4 St.

Gen. HALCYON Sws. 1821. — Krabbenstecher.

Paralcyon Glog. 1842 (nec 1827). *Cancrophaga* Bp. 1850.

436. 1. H. senegalensis Sws.

Z. Ill. t. 27. — Id. B. W.-Afr. II. p. 97. — Gray Gen. B. I. p. 79. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 53. 6. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 15. — Verr. R. & Mag. Z. 1851. p. 266. — Rchb. Handb. I. p. 11. 30. t. 400. 307. 1. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 10. 17. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 2. 69. — Id. Orn. Westafr. p. 31. 85. — *Alcedo senegalensis* Lin. S. N. p. 180. 11. — Vieill. Enc. p. 283. 3. — *Martin-pêcheur à tête grise* Buff. Pl. enl. 594. — *Dacelo senegalensis* Less. Trait. p. 247. 8. — *Cancrophaga senegalensis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 116. 286. —

Senegal — ♂ 2 St.

437. 2. H. semicaerulea Rüpp.

Neue Wirbelth. t. 24. 1. — Id. Syst. Übers. p. 23. 89. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 53. 6. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 16. — Rchb. Handb. I. p. 11. 27. t. 402. 3085. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 128. 159. — Hartl. Orn. Westafr. p. 33. 88. — *Alcedo semicaerulea* Forsk. Faun. Arab. p. 2. 5. — Gm. S. N. p. 457. 41. — Vieill. Enc. p. 297. 32. — *Cancrophaga semicaerulea* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 116. 283. —

Abyssinien — ♂ jun. — 1 St.

438. 3. H. rufiventris Sws.

B. W.-Afr. II. p. 101. t. 12. — Bp. Consp. I. p. 155. gen.

301. 18[illegible] Rchb. Handb. I. p. 10. 26. t. 402. 3083-84. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 11. 22. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 3. 72. — Id. Orn. Westafr. p. 33, 91. — *Martin-pêcheur bleu & noir* Buff. Pl. enl. 356. 2. — *Alcedo senegalensis var. δ* Gm. S. N. p. 456. 10. — Vieill. Enc. p. 283. 3 *β*. — *Dacelo acteon* Less. Trait. p. 247. 9. — *Alcedo erythrogastra* Temm. Tabl. méth. p. 75. — *Halcyon Swainsonii* Smith Quart. Journ. S.-Afr. 1836. p. 143. — Müll. Journ. Orn. 1855. p. 7. 74. — *Halcyon erythrograstra* Gray Gen. B. I. p. 79. 7. — *Cancrophaga rufiventris* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 116. 285. —

Senegal — ♂; Sennaar — ♀ — 2 St.

Gen. ENTOMOBIA *) Nob. — Kerf-Liest.

Entomothera Rchb. 1851 (nec Horsf. 1820) *Halcyon* Bp. 1854 (nec Sws. 1821).

439. 1. E. cyaniventris Nob.

Alcedo cyaniventris Vieill. N. D. XIX. p. 412. — Id. Enc. p. 396. — *Alcedo melanoptera* Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 174. — Steph. Gen. Z. XIII. p. 100. — *Alcedo omnicolor* „Reinw." Temm. Pl. col. 135. — *Dacelo omnicolor* Less. Trait. p. 247. 7. — *Halcyon omnicolor* Sws. Class. B. II. p. 335. — Hartl. Verz. Mus. Brem. p. 13. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 22. — *Halcyon melanoptera* Gray Gen. B. I. p. 79. 18. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. I. p. 54. 12. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 127. 157. — *Halcyon multicolor* Kaup Fam. Eisv. p. 8. — *Entomothera melanoptera* Rchb. Handb. I. p. 14. 35. t. 404. 3087. — *Halcyon cyanoventris* Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 2. —

Java — ♂ — 1 St.

440. 2. E gularis Nob.

Grand martin-pêcheur de Madagascar Buff. Pl. enl. 232. — *Alcedo smyrnensis var. β* Gm. S. N. p. 456. 11. — Vieill. Enc. p. 286. 8 *α*. — *Alcedo gularis* Kuhl & Swinderen Buff. Fig. Av. Col. N. Syst. 1820. p. 4. — *Alcedo rufirostris* „Ill." Meyen Beitr. III. p. 94. — *Alcedo smyrnensis* Kittl. (nec Lin.) Kupf. Vög. p. 10. t. 14. 2. 232. — *Halcyon ruficollis* Sws. Class. B. II. p. 335. — *Alcedo melanoptera* Temm. (nec Horsf.) Tabl. méth. p. 75. — *Al-*

*) Von ἔντομον (Insect) und βιόω (leben). —

cedo smyrnensis var. albogularis Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 998. — Id. l. l. 1844. p. 894. — *Halcyon gularis* Gray Gen. B. I. p. 79. 13. — Kaup Fam. Eisv. p. 8. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 21. — *Entomothera gularis* Rchb. Handb. I. p. 13. 34. t. 401. 3082. — *Halcyon fusca* Cassin (nec Bodd.) Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 4. —

Philippinen — ♂; China — ♀ — 2 St.

441. 3. E. fusca *) Nob.

Martin-pêcheur de la côte de Malabar Buff. Pl. enl. 894. — *Alcedo fusca* Bodd. Tabl. pl. enl. p. 54. t. 894. — *Alcedo smyrnensis var. γ* Gm. S. N. p. 457. 11. — Lath. Ind. Orn. I. p. 248. — Vieill. Enc. p. 286. 8 β. — *Dacelo smyrnensis* Less. Trait. p. 246. 3. — Sykes P. Z. S. 1832. p. 84. — M'c Clelland l. l. 1839. p. 156. — Jerd. (nec Lin.) Madr. Journ. 1840. p. 230. — Pearson Journ. A. S. B. 1841. p. 633. — Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 47. — *Halcyon fusca* Id. Gen. B. I. p. 79. 12. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 55. 14. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 23. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 3. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 125. 155. — *Entomothera fusca* Rchb. Handb. I. p. 12. 32. t. 401. 3088-89. — *Alcedo erythrorhyncha* Licht. in Mus. Berol. —

Madras — ♂; Bengalen — ♂, ♀ — 3 St.

442. 4. E. pileata Nob.

Martin-pêcheur de la Chine Buff. Pl. enl. 673. — *Alcedo pileata* Bodd. Tabl. pl. enl. p. 41. t. 673. — *Alcedo atricapilla* Gm. S. N. p. 453. 27. — Vieill. Enc. p. 289. 15. — Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 203. — *Alcedo brama* Less. Cent. Z. t. 8. — *Dacelo atricapilla* Id. Trait. p. 246. 2. — *Halcyon atricapilla* Steph. Gen. Z. XIII. p. 99. — Bartl. Verz. Mus. Brem. p. 13. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 47. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 20. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 124. 153. — *Halcyon pileata* Gray Gen. B. I. p. 79. 8. — Id. List Spec.

*) Dieser Art sehr nahe verwandt ist:

5. *E. smyrnensis.* — *Alcedo smyrnensis* Lin. S. N. p. 181. 11. — Vieill. Enc. p. 286. 8. — *Halcyon smyrnensis* Steph. Gen. Z. XIII. p. 99. — Strickl. Ann. & Mag. Nat. Hist. 1842. p. 443. — Gray Gen. B. I. p. 79. 11. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 55. 13. — Bp. Consp. I. p 155. gen. 301. 24. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 125. 154. — *Entomothera smyrnensis* Rchb. Handb. I. p. 13. 32. — *Alcedo arabica* Hempr. & Ehrenb. in Mus. Berol. — Nach einem arabischen Exemplare des berliner Museum's grösser und weniger intensiv gefärbt als *E. fusca.* (Klein-Asien, Persien, Mesopotamien, Arabien u. s. w.) —

B. Brit. Mus. II. 1. p. 54. 11. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 7. 1. — *Entomothera pileata* Rchb. Handb. I. p. 15. 36. t. 401. 3080-81. — *Alcedo puella* „Kreling" Rchb. Journ. Orn. 1854. p. 149. 7. —

Borneo — ♂; Tenasserim — ♀ — 2 St.

Gen. PELARGOPSIS Glog. 1842. — Storchschnäbler.

Ramphalcyon Rchb. 1851.

443. 1. P. javana *) Nob.

Martin-pêcheur de Java Buff. Pl. enl. 757. — *Alcedo javana* Bodd. Tabl. pl. enl. 757. — *Alcedo leucocephala* Gm. S. N. p. 456. 35. — Lath. Ind. Orn. I. p. 248. 8. — Vieill. Enc. p. 288. 14. — Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 174. — Raffl. l. l. p. 293. — *Alcedo javanica* Shaw Gen. Z. VIII. p. 67. — Id. Nat. Misc. t. 793. — *Halcyon leucocephala* Steph. Gen. Z. XIII. p. 100. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 18. — *Halcyon javana* Gray Gen. B. I. p. 79. 15. — *Ramphalcyon javana* Rchb. Handb. I. p. 17. 41. t. 399. 3075 & t. 481. 3406. — *Halcyon javanica* Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 11. 23. — *Ramphalcyon leucocephala* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 10. gen. 123. 325. — *Ramphalcyon javanica* Id. l. l. p. 10. gen. 123. 326. —

Malacca — 2 ♂ ad.; Java — ♂ jun. — 3 St.

444. 2. P. gurial Nob.

Ispidina capitis bonae spei (!) Briss. **) Av. IV. p. 488. 8. t. 41. 1. — *Alcedo capensis* (!) Lin. S. N. p. 180. 9. — Vieill. Enc. p. 285. 6. — *Martin-pêcheur du cap de bonne espérance* (!) Buff. Pl. enl. 590. — *Halcyon capensis* (!) Sws. Class. B. II. p. 335. — Jerd. Madr. Journ. 1840. p. 231. — Gray Gen. B. I. p. 79. 14. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 9. — *Halcyon leucocephala* M'c Clelland (nec Gm.) P. Z. S. 1839. p. 156. — Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 55. 16. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind.

*) Die Vergleichung einer ganzen Reihe von Exemplaren dieser und der folgenden Art hat uns keine genügenden specifischen Unterschiede hinsichtlich der Färbung der Haube auffinden lassen. Dieselbe ist bei einigen dunkler, bei andern heller, fast weisslich gefärbt, und lassen mehrere Exemplare deutlich genug den Uebergang der einen Färbung in die andere erkennen. —

**) Leider haben Linné und Buffon durch Brisson irre geleitet zuerst irrthümlich das Cap der guten Hoffnung als Vaterland dieser Art angegeben, woraus die zum Theil sehr verwickelte Synonymie derselben zu erklären ist, da man anfänglich in dem ostindischen Vogel einen von der angeblich südafricanischen Linné's verschiedene Art zu erkennen glaubte. —

Comp. I. p. 123. 151. — *Halcyon gurial* Pears. Journ. A. S. B. 1841. p. 633. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 47. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 11. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 11. 24. — *Halcyon brunniceps* Jerd. Madr. Journ. 1844. p. 143. — *Ramphalcyon capensis* Rchb. Handb. I. p. 16. 39. t. 399. 3072-73. — *Ramphalcyon gurial* Id. l. l. p. 15. 40. t. 426. 3188. —
Ostindien — ♂ ad., ♂ jun., 2 ♀ — 4 St.

445. 3. P. amauroptera Nob.

Halcyon amauroptera Pears. Journ. A. S. B. 1841. p. 635. — Gray Gen. B. I. p. 79. 16. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 47. — Bp. Consp. I. p. 155. gen. 301. 12. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 12. 24. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 124. 152. — *Halcyon sp.* Burm. Verz. Mus. Hal. p. 50. 5. — *Ramphalcyon amauroptera* Rchb. Handb. I. p. 17. 42. t. 481. 3407. —
Himalaya — ♂ — 1 St.

Gen. CALLIALCYON Bp. 1850. — Pracht-Liest.

Calialcyon (!) Bp. 1850. *Callalcyon* (!) Id. 1854.

446. 1. C. Schlegeli Rchb.

Handb. I. p. 16. 38. t. 405. 3090-91. — *Halcyon coromanda maior* Temm. & Schleg. Faun. Japon. Av. p. 76. 1. t. 39. — *Halcyon Schlegeli* Bp. Consp. I. p. 156. gen. 301. 26. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 9. 12. —
Japan — ♂ jun. — 1 St.

447. 2. C. coromandeliana Nob.

Martin-pêcheur violet des Indes Sonn. Voy. Ind. II. p. 166. t. 118. — *Alcedo coromandeliana* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. p. 90. — *Alcedo coromanda* Lath. Ind. Orn. I. p. 252. — Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 174. — *Halcyon coromanda* Steph. Gen. Z. XIII. p. 100. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 9. 11. — *Dacelo coromanda* Less. Trait. p. 246. 10. — *Halcyon coromandelicus* Vig. App. Mem. Raffl. p. 654. — *Halcyon lilacina* Sws. Class. B. II. p. 335. — Bp. Consp. I. p. 156. gen. 301. 25. — *Halcyon coromanda minor* Temm. & Schleg. Faun. Japon. Av. p. 76. — *Alcedo calipyga* Hodgs. Gray's Z. Misc. t. 82. — *Halcyon coromandeliana* Gray Gen. B. I. p. 79. 20. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 55. 15. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. Eas'-Ind. Comp. I. p. 126. 156. — *Halcyon coromander* Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by

Hodgs. p. 56. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 47. — *Callialcyon coromanda* Rchb. Handb. I. p. 15. 37. t. 405. 3092. — *Callalcyon coromanda* ♀ *lilacina* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 115. 278-79. —
Java — ♂ — 1 St.

Gen. CYANALCYON *) „Verr.“ Bp. 1850. — Blau-Liest.

448. 1. C. Macleayi Bp.

Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 119. 310.— *Halcyon Macleayi* Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 110 (♂). — Gould B. Austr. II. t. 24. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 34. 43. — Gray Gen. B. I. p. 79. 34. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 58. 23. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 8. — *Halcyon incinctus* Gould P. S. Z. 1837. p. 142 (♀). — *Todirhamphus Macleayi* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 13. — Rchb. Handb. I. p. 29. 67. t. 416. 3124-25. —
Nord-Australien — ♂ — 1 St.

Gen. SAUROPATIS **) Nob. — Wald-Liest.

Todirhamphus (!) Bp. 1850 & 1854, Rchb. 1851 & Cassin 1852 (nec Less. 1831).

449. 1. S. sancta Nob.

Sacred kingsfisher Philipp (nec Lath.) Voy. New-South-

*) Gray scheint die Gattung *Cyanalcyon* Verr. ganz falsch aufgefasst zu haben, wenn er als Typus derselben in seinem „Catalogue of Genera and Subgenera of Birds“ die zufälliger Weise von Bonaparte vorangestellte *Halcyon pyrrhopygia* Gould angiebt; nach unserer Ansicht ist jene Art eine ganz typische *Sauropatis*, während die übrigen a. a. O. zu *Cyanalcyon* gestellten Arten gar wohl generisch abgesondert eine eigene Gruppe zu bilden verdienen, als deren wahren Typus wir lieber den als zweiten aufgeführten *Halcyon Macleayi* ansehen möchten. Auch würde dann der auf *H. pyrrhopygia* eigentlich kaum passende Name *Cyanalcyon* für jene so schön blau gefärbten Arten sehr bezeichnend zu nennen sein. — Die übrigen von Bonaparte hierher gestellten Arten sind:

2. *C. diops* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 119. 311. — *Alcedo diops* Temm. Pl. col. 272. — *Halcyon diops* Gray Gen. B. I. p. 79. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 7. — *Todirhamphus diops* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 14. — Rchb. Handb. I. p. 29. 68. t. 416. 3127 (Molukken);
3. *C. lazuli* Bp Consp. Vol. Anis p. 9. gen. 119. 312.— *Alcedo lazuli* Temm. Pl. col. 500. — *Halcyon lazuli* Gray Gen B. I. p. 79. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 8. 6. — *Todirhamphus lazuli* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 15. — Rchb. Handb. I. p. 30. 69. t. 416. 3126 (Amboina);
4. *? C. lazulinus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 119. 313. — *Halcyon lazulina* Schiff in Mus. Francof. —

*) Von σαῦρος (Eidechse) und πατέω (kosten, fressen). Die hierher gehörigen Arten zeigen noch nicht den flachen, stumpfen und kurzen Schnabel der eigent-

Wales p. 149. t. 29. — White Voy. p. 193. t. 17. — *Halcyon sanctus* Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. XV. p. 206.— Gould B. Austr. II. t. 21. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 33. 41. — Gray Gen. B. I. p. 79. 31. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 56. 20. — *Halcyon sacra* Steph. Gen. Z. XIII. p. 98. — Jard. & Selby Ill. Orn. II. t. 96-97 (ad. & juv.). — *Dacelo chlorocephala var. β* Less. Trait. p.

---

lichen *Todirhamphi* (!) Less., zu welchen sie Bonaparte, Reichenbach, Cassin u. A. ihres jenen ähnlichen Gefieders halber gestellt wissen wollen, wesshalb wir aus denselben hier eine eigene Gruppe gebildet haben, zu der ausser den oben aufgeführten auch noch folgende Arten gehören:

5. *S. albicilla.* — *Alcedo albicilla* „Cuv." Dumont Dict. Sc. Nat. XXIX. p. 273. — *Dacelo albicilla* Less. Trait. p. 247. 5. — *Halcyon saurophaga* Gould P. S. Z. 1843. p. 103. — Id. Voy. Sulph. Zool. p. 33. t. 19. — *Halcyon albicilla* Gray Gen. B. I. p. 79. 17. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 56. 17. — Scl. Proc. Linn. Soc. 1858. p. 156. 14. — *Todirhamphus saurophagus* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 18. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 13. 8. — *Todirhamphus albicilla* Rchb. Handb. I. p. 30. 72. t 418. 3134-35. — *Alcedo cyanoleuca* Temm. in Mus. Lugd. (Neu-Guinea);
6. *S. superciliosa.* — *Halcyon superciliosa* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 56. 19. — *Todirhamphus superciliaris* Rchb. Handb. I. p. IV. 81. — *Todirhamphus superciliosus* Id. l. l. p. 34 81. t. 418. 3134-35 (Freundschafts-Inseln: Tongataboo);
7. *S. sordida.* — *Halcyon sordida* Gould P. Z. S. 1842. p. 72. — Id. B. Austr. II. t. 23. — Rchb. Vög. Neuholl. III. p. 209. 510. — Gray Gen. B. I. p. 79. — *Todirhamphus sordidus* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 8. — Rchb. Handb. I. p. 32. 76. t. 419. 3136-37. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 14. 9 (Nord-Australien);
8. *S. Grayi.* — *Halcyon sordida* Gray (nec Gould) P. Z. S. 1858. p. 172. 14 (Aru-Inseln);
9. *S. vitiensis.* — *Dacelo vitiensis* Peale. Un. St. Explor. Exped. p. 156. t. 44 (Feejee-Inseln);
10. *S. vagans.* — *Alcedo vagans* Less. Voy. Coqu. Zool. I. p. 694. — *Dacelo chlorocephala var. γ* Id. Trait. p. 246. 4. — *Alcedo cyanea* Forst. Descript. Anim. p. 76. — *Halcyon vagans* Gray Voy. Ereb. & Terr. p. 3. t. 1. — Id. Gen. B. I. p. 79. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 57. 21. — *Dacelo vagans* Peale Un. St. Explor. Exped. p. 161. t. 43. — *Todirhamphus vagans* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 9. — Rchb. Handb. I. p. 31. 75. t. 419. 3138-39.— Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 13. 4 (Neu-Seeland);
11. *S. cinnamomina.* — *Halcyon cinnamomina* Sws. Z. Ill. II. t. 67. — Vig. & Horsf. Trans. Linn. Soc. XV. p. 206. — Gray Voy. Ereb. & Terr. p. 3. — Id. Gen. B. I. p. 79. — *?Alcedo ruficeps* „Cuv." Dumont Dict. Sc. Nat. XXIX. p. 273. — *?Dacelo ruficeps* Less. Trait. p. 247. — *Todirhamphus cinnamominus* Bp. Consp. I. 157. gen. 302. 10. — Rchb. Handb. I. p. 32. 77. t. 420. 3140 & t. 405b. 3490-91. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 14. 11 (Marianen, Ladronen, Marquesas-Inseln u. s. w.) —

Als eigentlich typische Formen der Gattung *Todirhamphus* (!) Less. betrachten wir nur die von ihm selbst als solche generisch abgesonderten, durch ihre kurzen, stumpfen und flachen Schnäbel ausgezeichneten *Alcedo sacra* Gm. und *Todirhamphus divinus* Less., zu welchen als dritte Art vielleicht noch *Todirhamphus recurvirostris* Lafr. hinzuzufügen wäre. Für den wie leider so viele andere lesson'sche total regelwidrig gebildeten, vorn lateinischen, hinten griechischen Namen *Todirhamphus* (!) tritt der gloger'sche *Coporhamphus* ein und würde die Synonymie jener drei Arten etwa folgendermaassen zu ordnen seien:

246. 4. — *Todirhamphus sanctus* Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 3.—Rchb. Handb. I. p. 33. 80. t. 418. 3131-33.— *Todirhamphus Australasiae* Cassin (nec Vieill.) Cat. Halc. Mus. Philad. p. 13. 5. —

Neu-Süd-Wales — ♂ ad., 2 ♂ jun.; Süd-Australien — ♀ ad., ♀ jun.; West-Australien — ♂ juv., ♀ ad. — 8 St.

450. 2. S. chloris Nob.

Martin-pêcheur à tête verte du cap de bonne espérance (!) Buff. Pl. enl. 783. 2 (juv.). — *Martin-pêcheur à collier blanc des Philippines* Sonn. Voy. Nouv. Guin. p. 67 t. 33 (ad.). — *Alcedo chloris* Bodd. Tabl. pl. enl. p. 49. t. 783. 2 (juv.). — *Alcedo collaris* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. p. 90. — Lath. Ind. Orn. I. p. 250. — Kittl. Kupf. Vög. I. t. 14. 1 (ad.). — *Alcedo sacra var. ε* Gm. S. N. p. 453. 30. — Vieill. Enc. p. 295. 29 (ad.). — *Alcedo chlorocephala* Gm. S. N. p. 454. 31 (juv.). — *Halcyon collaris* Sws. Z. Ill. I. t. 27. — Gray Gen. B. I. p. 79. 32. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. p. 56. 18. — Id. P. Z. S. 1858. p. 171. 13. — *Dacelo chlorocephala* Less. Trait. p. 246. 4. — *Halcyon chlorocephala* Sws. Class. B. II. p. 335. — *Halcyon chloris* Gray Gen. B. I. p. 79. 39. — *Todirhamphus collaris* Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 5. — Rchb. Handb. I. p. 30. 73. t. 417. 3129 (ad.). — *Todirhamphus chlorocepha-*

Gen. *Coporhamphus* Glog. 1842. — Ruderschnäbler.
Todirhamphus (!) Less. 1828.

1. *C. sacer.* — *Alcedo sacra* Gm. S. N. p. 453. 30. — Less. Voy. Coqu. Zool. I. p. 686. — *Todirhamphus sacer* Id. Mém. Soc. Hist. Nat. III. p. 421. t. 11.—Id. Trait. p. 250. — Rchb. Handb. I. p. 34. 82. t. 423. 3148-49. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 12. 2.— *Alcedo collaris* Forst. (nec Scop.) Descript. Anim p. 162. — *Halcyon sacra* Gray Gen. B. I. p. 79. — *Dacelo coronata* Peale (nec Müll.) Un. St. Explor. Exped. p. 160. t. 46. 1-2 *(mas ad. & fem. jun.)* — *Todirhamphus sacer pt.* Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 2 (Sandwichs-Inseln);
2. *C. veneratus.* — *Alcedo venerata* Gm. S. N. p. 453. 29. — Lath. Ind. Orn. I. p. 251. 16. — *Todirhamphus divinus* Less. Mém. Soc. Hist. Nat. III. p. 422. t. 12. — Id. Voy. Coqu. Zool. I. p. 318 & p. 687. — Id. Trait. p. 250. 2. — Rchb. Handb. I. p. 34. 83. t. 423. 3150-51. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 14. 10. — *Halcyon venerata* Gray Gen. B. I. p. 79. — Pelzeln Sitzungber. math.-naturw. Class. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 501. — *Halcyon tutu* Gray List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 58. 24. — *Dacelo nullitorques* Peale Un. St. Explor. Exped. p. 155. t. 42. 1. — *Todirhamphus sacer pt.* Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 2 (Borabora und Tahiti);
3. *C. recurvirostris.* — *Todirhamphus recurvirostris* Lafr. R. Z. (Mai) 1842. p. 135. — Rchb. Handb. I. p. 35. 84. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 13. 6. — *Halcyon platyrostris* (!) Gould P. Z. S. (Jun.) 1842. p. 72. — Gray Gen. B. I. p. 79. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 58. 25. — *Dacelo minima* Peale Un. St. Explor. Exped. p. 159. t. 45. — *Todirhamphus platyrostris* (!) Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 1 (Navigator-Inseln). —

lus Bp. Consp. I. p. 156. gen. 302. 6. — Rchb. Handb. I. p. 31. 74. t. 417. 3128 & t. 477. 3390 (juv.). — ? *Todirhamphus collaris var. armillaris* Rchb. Handb. I. p. 31. — *Todirhamphus chloris* Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 1211. — *Ceryle abyssinica* Hempr. & Ehrenb. in Mus. Berol. — Licht. Nomencl. Av. Mus. Berol. p. 67. — *Halcyon abyssinica* Pelzeln Sitzungsber. math.-naturw. Class. Acad. Wissensch. Apr. 1856. p. 500. — Hartl. Ibis 1859. p. 339. 17. —

Philippinen — ♂ jun. — 1 St.

451. 3. S. pyrrhopygia Nob.

Halcyon pyrrhopygia Gould P. Z. S. 1840. p. 113. — Id. B. Austr. II. t. 22. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 34. 42. — Gray Gen. B. I. p. 79. 35. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 57. 22. — *Todirhamphus pyrrhopygius* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 1. — Rchb. Handb. I. p. 33. 78. t. 420. 3141. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 13. 7. — *Cyanalcyon* (!) *pyrrhopygia* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 119. 309. —

Neu-Süd-Wales — ♂ — 1 St.

452. 4. S. Australasiae Nob.

Alcedo Australasiae Vieill. N. D. XIX. p. 419. — Id. Enc. p. 397. 46. — *Halcyon coronata* Müll. Verh. Nat. Gesch. Nederl. Ind. I. p. 75. — Gray Gen. B. I. p. 79. 30. — *Todirhamphus coronatus* Bp. Consp. I. p. 157. gen. 302. 12. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 14. 12. — *Paralcyon coronata* Rchb. Handb. I. p. 35. 87. t. 420. 3142. —

Lombok — ♂ — 1 St.

Gen. CARIDAGRUS *) Nob. — Stummel-Liest.

Paralcyon Bp. 1850 (nec Glog. 1827).

453. 1. C. concretus Nob.

Dacelo concreta Temm. Pl. col. 346. — Orb. Dict. Class. t. 4. — *Halcyon concreta* Gray Gen. B. I. p. 79. 22. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 52. 2. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 1. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p.

*) Von χαρίς (Krabbe) und ἀγρέω = αἱρέω (fangen). — Der starke, ziemlich breite Schnabel und der auffallend kurze Schwanz characterisiren diese Gattung wohl hinreichend. —

9. 13. — *Paralcyon concreta* Rchb. Handb. I. p. 36. 88. t. 421. 3145 & t. 422. 3145-46 (juv. & ad.). —
Borneo — ♂ — 1 St.

Gen. ASTACOPHILUS *) nov. gen. — Salsac.
Actenoides *) pt. Hartl. 1855.

454. 1. A. Lindsayi Nob.
Dacelo Lindsayi Vig. P. Z. S. 1831. p. 97. — Voy. Bonnite Ois. p. 98. t. 7 (ad.). — *Dacelo Lessoni* Id. P. Z. S 1831. p. 97 (jun.). — *Halcyon Lindsayi* Gray Gen. B. I. p. 79. 26. t. 27 (jun.). — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 52. 3. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 2 — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 9. 14. — *Paralcyon Lindsayi* Rchb. Handb. I. p. 36. 89. t. 421. 3143-44. —
Philippinen — ♂ ad., ♀ juv. — 2 St.

Gen. TANYSIPTERA Vig. 1823. — Nymphen-Liest.

455. 1. T. hydrocharis Gray
P. Z. S. 1858. p. 172. 16. —
Similis *T. nymphae* Grayi (ex Philippinis) sed minor: capite toto lazulino-cyaneo, rectricibus caeruleis, duabus mediis longissimis margine interiore usque ad ceterarum rectricum apices albis, omnibus subtus nigrescentibus, duarum mediarum apicibus supra subtusque cum rachide albis, ceterarum rachidibus nigris. — Long. tot. 11″ 9‴, al. 3″, rectric. duab. med. 7″ rectric. ceter. 2″ 8‴, rostr. calm. 11‴, tars. 7‴, dig. med. exc. ung. 7‴. —
Aru-Inseln — ♂ — 1 St.

Gen. CARIDONAX **) nov. gen. — Krabbentyrann.

456. 1. C. fulgidus Nob.
Halcyon fulgidus Gould P. Z. S. 1857. p. 65. —

*) Von ἄστακος (Krebs) und φιλέω (lieben). — Es unterscheidet sich diese Gattung auf den ersten Blick von der vorigen durch den weit schwächern Schnabel, den langen stufigen Schwanz und die bunte Fleckenzeichnung des weichern, schon an *Monachalcyon* erinnernden Gefieders. Eine generische Vereinigung derselben mit *Actenoides Hombroni* Bp., wie sie Hartlaub (Journ. Orn. 1855. p. 165.) vornehmen möchte, halten wir kaum für genügend gerechtfertigt. —

**) Von καρίς (Krabbe) und ἄναξ (Herrscher, Tyrann). — Diese schöne, erst jüngst durch den talentvollen, unermüdlichen Reisenden Wallace entdeckte Art

Supra nigrescens, cervicis et interscapulii plumis cyaneo-marginatis, alis nigrescentibus, tectricibus remigibusque secundariis latius nitente-cyaneo-limbatis, rectricibus supra cyaneis nigrescente-marginatis, subtus fuscis, uropygio argenteo-caeruleo; subtus flavescente-albidus, pectoris plumis tenuissime nigricante-apicatis; rostro pedibusque rubris. — Long. tot. 11″, al. 4″ 9‴, caud. 4″ 3‴, rostr. culm. 1″ 9‴, tars. 9‴, dig. med. exc. ung. 9‴. —
Lombok — ♂ — 1 St.

Gen. CARCINEUTES *) Nob. — Schmuck-Liest.

Lacedo (!!) Rchb. 1851.

457. 1. C. pulchellus Nob.

Dacelo pulchella Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 175. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 46. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. I. p. 122. 149. — *Dacelo mignon* Temm. Pl. col. 277 (♂). — *Dacelo buccoides* Id. l. l. p. 586 (♀). — *Halcyon pulchella* Eyton P. Z. S. 1839. p. 101. — Gray Gen. B. I. p. 79. 21. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 52. 1. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 4. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 9. 9.— *Lacedo pulchella* Rchb. Handb. I. p. 42. 100. t. 429. 3168-69. — Java — ♂ ad.; Sumatra — ♂ jun., ♀; Malacca — ♀ — 4 St.

Gen. SAUROMARPTIS ***) Nob. — Eckhsenräuber.

Choucalcyon (!) Bp. 1854 (nec Less. **) 1831).

---

bildet gleichsam ein Bindeglied zwischen den Gattungen *Tanysiptera* und *Carcineutes*, die ganze Färbung, sowie der lange Schwanz erinnern noch an erstere, während der Schnabelbau ganz dem der letztern entspricht. Die Entdeckung dieser seltsamen Form macht uns somit die Annahme der bereits von Cassin aufgestellten Subfamilie der *Tanysipterinae* überflüssig, da nun diese früher allerdings etwas isolirt dastehende, durch ihre eigenthümliche Schwanzbildung gewissermaassen an *Prionites* erinnernde Gruppe durch ein natürliches Zwischenglied mit *Paralcyon* verknüpft ist. —

*) Von *καρκινεύτης* (Krebsjäger). — Als zweite Art gehört noch hierher:

2. *C. melanops*. — *Dacelo melanops* Temm. in Mus. Lugd. — *Halcyon melanops* Bp. Consp. I. p. 154. gen. 301. 5. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 9. 10. — *Lacedo melanops* Rchb. Handb. I. p. 42. 101 (Borneo). —

**) Nach der von Lesson a. a. O. gegebenen Diagnose seiner Gattung *Choucalcyon* ist offenbar nicht der zufällig vorangestellte *A. Gaudichaudi* Quoy & Gaim., sondern *A. gigas* Bodd. als eigentlicher Typus derselben zu betrachten. —

***) Von *σαῦρος* (Eidechse) und *μάρπτις* (Räuber, der gewaltsam ergreift). — Die Formen dieser Gruppe zeigen schon völlig den Schnabel von *Paralcyon* und lassen sich daher unmöglich, wie Reichenbach versucht hat, mit *Dacelo monachus* Temm. zusammenstellen, dessen weiches bucco-artiges Gefieder, ähnlich dem von *Carcineutes pulchellus* Nob. (*Dacelo buccoides* Temm.) schon mehr auf eine nächt-

458. 1. S. Gaudichaudi *) Nob.

Handb. I. p. 37. 90. t. 425. 3156. — *Alcedo Gaudichaudi* Quoy & Gaim. Voy. Uran. Zool. p. 112. t. 25. — *Choucalcyon Gaudichaudi* Less. Trait. p. 248. 1. — Müll. Nat. Gesch. Nederl. Overz. Bez. p. 22. — Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 107. 264. — *Dacelo Gaudichaudi* Gray Gen. B. I. p. 78. 4. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 52. 4. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 300. 4. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 16. 4. — Scl. Proc. Linn. Soc. Febr. 1858. p. 155. 12. — Gray P. Z. S. 1858. p. 171. 11. —

Aru-Inseln — ♂ — 1 St.

Gen. PARALCYON Glog. 1827. — Riesen-Liest.

Dacelo Leach (!!) 1816. *Choucalcyon* (!) Less. 1831. *Nycticeyx* Glog. 1842.

459. 1. P. cervina Nob.

Dacelo cervina Gould B. Austr. II. t. 20. — Id. Introd. B. Austr. p. 29. 59. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 38. 46. — Gray Gen. B. I. p. 78. 2. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 51. 3. — Bp. Consp. I. p. 154. gen. 300. 2. — Rchb. Handb. I. p. 40. 97. t. 428. 3164 65. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 16. 2. — *Dacelo cervicalis* (!) Kaup Fam. Eisv. p. 8. — *Dacelo Salussii* Hombr. & Jacq. Voy. Pol. Sud t. 23. 1. —

Nord-Australien — ♂ — 1 St.

---

liche Lebensweise schliessen lässt. Uebrigens ist als Typus von Reichenbach's Gattung *Monachalcyon* nicht, wie Gray angiebt, *Dacelo Gaudichaudi* Quoy & Gaim., den derselbe gar nicht gekannt hat, sondern *D. monachus* Temm., von dem auch der Gattungsname entnommen ist, anzusehen. Die Synonymie des Letztern ist ungefähr folgende:

Gen. *Monachalcyon* Rchb. 1851. — Mönchs-Liest.

M. princeps Rchb. Handb. I. p. 38. 91. t. 425. 3157. — *Dacelo monachus* Temm. in Mus. Lugd. (juv.). — *Halcyon monachus* Gray Gen. B. I. p. 79. 23. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. I. p. 53. 4. — Bp. Consp. I p. 154. gen. 301. 3. — *Dacelo princeps* & *cyanocephala* Forsten in Mus. Lugd. (ad. & jun.). — *Halcyon monacha* & *princeps* Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 10. 15-16. — *Paralcyon monachus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 9. gen. 110. 269 (Celebes, Ceram, Ternate). —

Als zweite Art der Gattung *Sauromarptis* betrachten wir den neuerdings von Wallace entdeckten und von Gray beschriebenen:

2. *S. tyro.* — *Dacelo tyro* Gray P. Z. S. 1858. p. 171. 12. t. 123 (Aru-Inseln). —

*) Das uns vorliegende Männchen, so wie ein aus derselben Quelle bezogenes Weibchen des berliner Museum's stimmen völlig mit der oben erwähnten Abbildung und der reichenbachschen Beschreibung überein; nur fehlt beiden der deutlich abgebildete und beschriebene weisse Augenstreif, und die Stirn ist nicht gänzlich, sondern nur so weit, als der Oberschnabel weiss. — G. L. 10″ 3‴, Fl. 4″ 9‴, Schwz. 3″ 9‴, Schnabelf. 1″ 9‴. —

460. 2. P. gigas Gloger.

Grand martin-pêcheur de la nouvelle Guinée Sonn. Voy. Nouv. Guin. p. 171. t. 106. — Buff. Pl. enl. 663. — *Alcedo gigas* Bodd. Tabl. pl. enl. p. 40. t. 663. — *Alcedo undulata* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. p. 90. — *Alcedo fusca* Gm. S. N. p. 454. 33. — *Alcedo gigantea* Lath. Ind. Orn. I. p. 245. 1. — Vieill. Enc. p. 282. 1. — *Dacelo gigantea* Leach Z. Misc. II. p. 126. t. 106. — Gould B. Austr. II. t. 18. — Rchb. Vög. Neuholl. I. p. 36. 45. — Bp. Consp. I. p. 153. gen. 300. 1. — *Choucalcyon australe* Less. p. 248. 2. — *Dacelo gigas* Gray Gen. B. I. p. 78. 1. — Id. List Spec. B. Brit. Mus. II. 1. p. 51. 1. — Rchb. Handb. I. p. 40. 96. t. 427. 3161-63. — Cassin Cat. Halc. Mus. Philad. p. 16. 2. —

Neu-Süd-Wales — 2 ♂ ad., ♀ ad.; Süd-Australien — ♂ jun., ♀ jun. — 5 St.

Fam. BUCEROTIDÆ. Hornvögel.

Gen. RHYNCHACEROS *) Glog. 1842. — Glatthornvogel.

Tockus (!) Less. 1831. *Alophius* Hempr. & Ehrenb. 183? (nec Entom.). *Toccus* (!) Strickl. 1841.

461. 1. R. erythrorhynchus Nob.

Calao à bec rouge de Sénégal Buff. Pl. enl. 260. — *Buceros nasutus var. β* Gm. S. N. p. 361. 4. — Lath. Ind. Orn. I. p. 145. 10. — *Calao Toc* Levaill. Ois. Afr. V. p. 94. t. 238. — *Buceros nasutus* Cuv. (nec Lin.). — *Buceros erythrorhynchus* Temm. Tabl. méth. p. 8. — Wagl. Syst. Av. p. 201. 20. — Less. Trait. p. 252. 1. — Gray Gen. B. II. p. 400. 34. — Hartl. Orn. Westafr. p. 165. 494. — *Tockus erythrorhynchus* Rüpp. Syst. Übers. p. 79. 322. — Bp. Consp. I. p. 92. gen. 218. 10. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 193. 396. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 595. 876. — *Buceros (Alophius) erythrorhynchus var. leucopareus* Hempr. & Ehrenb. Symb. Phys. Av. Dec. Fol. *aa.* not. 1. — Sundev. Öfvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1850. p. 130. 16. — *Rhynchaceros melanoleucus* Cab. (nec Licht. Bechst.) Orn. Not. p. 344. —

Sennaar — 2 ♂ ad.; Abyssinien — ♂ juv.; Cordofan — ♀ jun. — 4 St.

462. 2. R. leucomelas **) Nob.

Buceros leucomelas Licht. Verz. Säugeth. & Vög. Kaffernl. 1842. p. 17. 160. — *Buceros rufirostris s. B. erythro-*

*) Typus der Gattung *Rhynchaceros* Glog. ist nicht, wie in den ornith. Notizen irrthümlich angegeben wurde, *B. melanoleucus* Licht. in Cat. Hamb., sondern der ganz glattschnäblige *B. erythrorhynchus* Temm., welcher mit *B. melanoleucus* Licht. in Mus. Berol. identisch ist. —

**) Die Hauptunterschiede dieser Art von der vorhergehenden haben bereits Lichtenstein und Sundevall a. a. O. auseinandergesetzt; Beide scheinen indessen nur jüngere Vögel der südlichen Form vor sich gehabt zu haben, wesshalb wir hier die Resultate einer zwischen den uns vorliegenden alten Männchen beider Arten angestellten Vergleichung ausführlich anführen:

R. leucomelas ist in allen Dimensionen bedeutend grösser als *R. erythrorhynchus;* der Schnabel ist zwar kürzer, aber fast doppelt so hoch, und be-

rhynchus var. caffer Sundev. Öfvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1850. p. 108. 50. — Hartl. Orn. Westafr. p. 165. 494 Anm. —
Kaffernland — ♂ — 1 St.

Gen. LOPHOCEROS*) Hempr. & Ehrenb. 183 ?. — Nashornvogel.
Grammicus Rchb. 1850. *Rhynchoceros* Bp. 1854 (nec Glog. 1842).

463. 1. L. Forskali Hempr. & Ehrenb.
Buceros (Lophoceros) Forskalii Hempr. & Ehrenb. Symb. Phys. Av. Dec. fol. z. not. 8 (♂). — *Buceros (Lophoceros) Hemprichii* Iid. l. l. fol. *aa.* not. 3 (♀). — *Tockus nasutus* Rüpp. (nec Lin.) Syst. Übers. p. 79. 321. — Heugl. Übers. p. 45. 459. — Hor f. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 596. 878. —
Sennaar — ♂; Abyssinien — ♀ — 2 St.

---

schränkt sich das Schwarz auf demselben auf die Ränder und die äusserste Spitze. Das ganze Gefieder ist bei *R. leucomelas* vorherrschend schwärzlich, bei *R. erythrorhynchus* mehr weiss gefärbt: der Oberkopf ist bei *R. leucomelas* bis auf einen Streif über den Augen und die seitliche Halsgegend grau, bei *R. erythrorhynchus* weiss mit Ausnahme der grauen Scheitelmitte; der Rücken ist bei ersterm viel dunkler schwärzlich, und der weisse Streif auf der Mitte desselben äusserst schmal; während bei *R. erythrorhynchus* fast sämmtliche Handschwingen grosse weisse Flecken auf der Mitte beider Fahnen zeigen, hat *R. leucomelas* nur auf der Aussenfahne der 3ten bis 6ten ein kleines Fleckchen, und während bei jenem die 6te und 7te Armschwinge ganz, und die 8te ebenfalls noch fast gänzlich weiss sind, finden wir bei diesem nur die 6te und 7te weiss mit breiter schwarzer Querbinde. Auch die Flügeldeckfedern zeigen bei letzterm mehr Schwarz, die ersterm mehr Weiss. Bei beiden sind die 4 mittlern Steuerfedern ganz, die dann beiderseits folgende zur Hälfte schwarz, indessen zeigt die bei *R. erythrorhynchus* noch ebenfalls zur Hälfte schwarze 2te, bei *R. leucomelas* innen nur noch eine schmale schwärzliche Binde, und die bei jenem bis auf einen kleinen Längsfleck auf der Aussenfahne reinweisse 1te mehr als die halbe Aussenfahne, die Wurzel und eine Binde der Innenfahne schwarz. Unten ist *R. erythrorhynchus* rein weiss, *R. leucomelas* mehr graulich, besonders auf Oberbrust und Kehle. — *R. leucomelas:* G. L. 1' 9" 6"', Fl. 8" 6"', Schwz. 9" 6"', Schnabelf. 3", Schnabelhöhe 1" 4"', Lauf 1" 9"', Mittelz. o. Kr. 1" 3"'. *R. erythrorhynchus*: 1" 7", Fl. 7" Schwz. 8", Schnabelf. 4", Schnabelhöhe 11"', Lauf 1" 6"', Mittelz. o. Kr. 1". —

*) Zu dieser Gattung werden u. a. noch folgende Arten zu stellen sein:

3. *L. epirhinus.* — *Buceros epirhinus s. B. nasutus var. caffer* Sundev. Öfvers. Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 1850. p. 108. 49. — Strickl. Contrib. Orn 1852. p. 155 (Kaffernland);

4. *L. nasutus.* — *Buceros nasutus* Lin. S. N. p. 154. 4. — Lath. Ind. Orn. I. p. 145. 10. — Vieill. Enc. p. 305. — Wagl. Syst. Av. p. 201. 19. — Gray Gen. B. II. p. 400. 32. — Hartl. Orn. Westafr. p. 164. 492. — *Calao à bec noir du Sénégal* Buff. Pl. enl. 890. — *Calao nasique* Levaill. Ois. Afr. V. p. 92. t. 236-37. — *Buceros nasica & hastatus* Cuv. — *Buceros hastatus* Less. Trait. p. 252. 2. — *Tockus nasutus* Bp. Consp. I. p. 91. gen. 218. 8. —

464. 2. L. melanoleucus Nob.

Buceros melanoleucus Licht. Cat. Hamb. p. 8. 90. — Meyer Zool. Ann. I. p. 141. — Bechst. Lath.'s Übers. II. 1. p. 362. 17. — Licht. Doubl. p. 21. 205. — Gray Gen. B. II. p. 400. 29. — Hartl. Orn. Westafr. p. 164. 491. — *Calao couronné* Levaill. Ois. Afr. V. p. 89. t. 234-35. — *Buceros coronatus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 35. — Vieill. N. D. IV. p. 593. — Id. Enc. p. 401. 23. t. 240. 4. — Wagl. Syst. Av. p. 200. 17. — Less. Trait. p. 253. — Sws. Z. Ill. t. 178. — Id. B. W.-Afr. II. p. 257. — *Tockus melanoleucus* Bp. Consp. I. p. 91. gen. 218. 7. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 128. 393. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 597. 880. — *Rhynchoceros melanoleucus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 16. 41. —

Süd-Africa — ♂ ad., ♀ jun. — 2 St.

Gen. PENELOPIDES Rchb. 1850. — Calao.

Tockus (!) Bp. 1849 (nec Less. 1831). *Calao* (!) Id. 1854 (nec 1850). *Meniceros* Id. 1854 (nec Glog. 1842).

465. 1. P. Panini Nob.

Calao à bec ciselé de l'isle de Panay Sonn. Voy. Nouv. Guin. I. p. 122. t. 82-83 (♀ & ♂). — *Calao de l'isle de Panay* Buff. Pl. enl. 780-81 (♀ & ♂). — *Calao de Manille* Id. l. l. 981 (juv.). — *Buceros Panini* Bodd. Tabl. pl. enl. 980-81 (ad.). — Gray Gen. B. II. p. 400. 23. — *Buceros manilla* Bodd. Tabl. pl. enl. 981 (juv.). — *Buceros panayensis* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr.

Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 128. 394. — *? Tockus poecilorhynchus* Lafr. R. Z. 1839. p. 156. — Bp. Consp. I. p. 91. gen. 218. 9. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 193. 395 (juv.). — *? Buceros poecilorhynchus* Id. Orn. Westafr. p. 164. 493 (juv.). — *Grammicus nasutus & hastatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 15. 38-39 (West-Africa);

5. *L. hemileucus* Hempr. & Ehrenb. Symb. Phys. Av. Dec. fol. *aa.* not. 2 (Abyssinien); —

6. *L. limbatus.* — *Buceros limbatus* Rüpp. Faun. Abyss. p. 5. t. 2. 2. — Gray Gen. B. II. p. 400. 35. — *Tockus limbatus* Rüpp. Syst. Übers. p. 79. 325. — Bp. Consp. I. p. 92 gen. 218. 11. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 596. 879. — *Grammicus limbatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 15. 40. (Abyssinien);

7. *L. fasciatus.* — *Calao longibande* Levaill. Ois. Afr. V. p. 87. t. 233. — *Buceros fasciatus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 34. — Gray Gen. B. II. p. 400. 28. — Hartl. Orn. Westafr. p. 163. 489. — *Buceros melanoleucus* Vieill. Enc. p. 401. — Wagl. Syst. Av. p. 200. 16. — *Tockus fasciatus* Bp. Consp. I. p. 91. gen. 218. 6. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 127. 392. — *Grammicus fasciatus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 15. 37 (West-Africa);

8. *L. semifasciatus.* — *Buceros semifasciatus* Temm. in Mus. Lugd. — Hartl. Journ. Orn. 1855. p. 356. — Id. Orn. Westafr. p. 163. 495 (West-Africa). —

(ad.). — Gm. S. N. p. 360. 9. — Lath. Ind. Orn. I. p. 144. 8. — Vieill. Enc. p. 305. 9. — *Buceros manillensis* Gm. S. N. p. 361. 10 (juv.). — Lath. Ind. Orn. I. p. 145. 9. — Vieill. Enc. p. 305. 9. — *Calao à bec ciselé* Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 36. t. 16 - 18. — *Buceros insculptus* Dumont. — *Buceros sulcirostris* Wagl. Syst. Av. p. 199. 13. — *Tockus sulcirostris* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 91. gen. 218. 5. — *Penelopides sulcirostris* ♀ *panayensis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 12. 32-33.—
Philippinen — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

466. 2. P. ginginianus Nob. —

Calao de Gingi Sonn. Voy. Nouv. Guin. II. p. 214. t. 121. — Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 32. t. 15. — *Buceros bicornis* (!) Scop. (nec Lin.) Del. Flor. & Faun. Insubr. — *Buceros ginginianus* Lath. Ind. Orn. I. p. 146. 13. — Shaw Gen. Z. VIII. p. 36. — Vieill. Enc. p. 306. 13. — Less. Trait. p. 253. 5. — Gray Gen. B. II. p. 400. 27. — Id. Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 112. — *Buceros oxyurus* Wagl. Syst. Av. p. 199. 14. — *Buceros cineraceus* Hodgs. Gray's Z. Misc. p. 85. — *Buceros birostris* Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 995. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 44. — *Buceros bengalensis* „Gray" Bp. — *Tockus ginginianus* Bp. Consp. I. p. 91. gen. 218. 2. — *Meniceros ginginianus* Id. Consp. Vol Anis. p. 3. gen. 13. 34. — *Tockus bicornis* Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 597. 881. —
Ostindien — ♂ — 1 St.

Gen. ANORRHINUS Rchb. 1850. — Hauben-Calao.

Anthracoceros Bp. 1854 (nec Rchb. 1850).

467. 1. A. galeritus Horsf. & Moore

Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 594. 874. — *Buceros galeritus* Temm. Pl. col. 520. — Gray Gen. B. II. p. 399. 12. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 44. — *Buceros carinatus* Id. Journ. A. S. B. 1845. p. 187. — *Hydrocissa galerita* Bp. Consp. I. p. 91. gen. 215. 3. — *Anthracoceros galeritus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 9. 22. —
Malacca — ♂ — 1 St.

Gen. HYDROCISSA Bp. 1849. — Elstern-Calao.

Anthracoceros Rchb. 1850. *Anorrhinus* Bp. 1854 (nec Rchb. 1850. *Gen. nov.* Horsf. & Moore 1857.

468. 1. H. malayana Bp.

Consp. I. p. 90. gen. 215. 5. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 592. 872 (♂). — *Buceros malayanus* Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 292 (♂). — Gray Gen. B. II. p. 399. 8. — Hay Madr. Journ. 1844. XIII. 2. p. 151 (♀). — Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 995 (♂). — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 43. — Wallace Ann. Nat. Hist. Febr. 1855. — *Buceros anthracinus* Temm. Pl. col. 529 (♂). — *Buceros bicolor* Eyton P. Z. S. 1839. p. 104. — Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 995 (♂). — *Buceros Ellioti* Hay Madr. Journ. 1844. XIII. 2. p. 152 (♂). — *Buceros nigrirostris* Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 995. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 44 (♀). — *Anorrhinus malayanus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 9. 24 (♂). — *Hydrocissa nigrirostris* Horsf & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 593. 873 (♀). —

Java — ♀ — 1 St.

469. 2. H. convexa Horsf. & Moore

Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 591. 871. — *Buceros albirostris* Horsf. (nec Shaw) Trans. Linn. Soc. XIII. p. 175. — *Buceros malabaricus* Raffl. (nec Gm.) l. l. p. 291. — Vig. App. Mem. Raffl. p. 666. — *Buceros convexus* Temm. Pl. col. 530 (♀). — *Buceros violaceus* Hay (nec Shaw) Madr. Journ. 1844. XIII. 2. p. 148. — *Buceros intermedius* Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 994. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 43. —

Java — ♂, ♀ — 2 St.

470. 3. H. coronata Horsf. & Moore

Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 588. 869. — *Calao des Philippines* Buff. Pl. enl. 873 (juv.). — *Calao de Malabar* Sonn. Voy. Nouv. Guin. t. 121. — *Buceros coronatus* Bodd. Tabl. pl. enl. t. 873. — Gray Gen. B. II. p. 399. — *Buceros pica* Scop. Del. Flor. & Faun. Insubr. — Blyth Journ. A. S. B. 1847. p. 993. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 43. — *Buceros malabaricus var. β* Lath. Ind. Orn. I. p. 143. — *Calao unicorne* Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 20. t. 9-12. — ? *Calao violet* Id. l. l. p. 39. t. 19 (var.). — *Buceros monoceros* Shaw Gen. Z. VIII. p. 8. — Wagl. Syst. Av. p. 194. 2. — ? *Buceros violaceus* Shaw. Gen. Z. VIII. p. 19. — Vieill. N. D. IV. p. 599. — Wa l. Syst. Av. p. 197. 9. (var.). — *Buceros malabaricus* Tickell (nec Gm.). Journ. A. S. B. 1833. p. 579. — Jerd. Madr. Journ. 1840. p. 38. — Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 993. — Layard Ann. Nat. Hist. XIII. p. 260. — *Hydrocissa*

monoceros Bp. Consp. I. p. 90. gen. 215. I. — ?*Hydrocissa violacea* Id. l. l. p. 90. gen. 215. 4 (var.). — *Anorrhinus violaceus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 9. 23 (var.). —

Ceylon — ♀ — 1 St.

471. 4. H. albirostris Horsf. & Moore

Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 589. 870. — *Beaks of curious birds* Edw. Glean. t. 281. D. — *Buceros malabaricus* (!) Gm. S. N. p. 359. 7. — Lath. Ind. Orn. I. p. 143. 6. — Vieill. Enc. p. 303. 6. — M'c Clelland P. Z. S. 1839. p. 164. — *Calao à bec blanc* Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 29. t. 14. — *Buceros albirostris* Shaw Gen. Z. VIII. p. 13. — Vieill. Enc. p. 399. 18. — Wagl. Syst. Av. 198. 11. — Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 995. — Id. Cat. Mus. A. S. B. p. 43. — Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 112. — *Buceros leucogaster* Blyth Journ. A. S. B. 1841. p. 922. — Id. l. l. 1843. p. 177 (juv.). — *Buceros nigralbus* Hodgs. Gray's Z. Misc. p. 85. — *Buceros pica* Gray (nec Scop.). Gen. B. II. p. 399. 5. — *Hydrocissa pica* Bp. (nec Scop.). Consp. I. p. 90. gen. 215. 2. —

Tenasserim — ♂ — 1 St.

Gen. SPHAGOLOBUS *) Nob. — Lappenhals-Calao.

Tmetoceros Bp. 1854 (nec Cab. 1847).

472. 1. S. atratus Nob.

Buceros atratus Temm. Pl. col. 558 (♂). — Gray Gen. B. II. p. 399. 11. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 127. 387. — Id. Orn. Westafr. p. 162. 485. — *Bucorvus atratus* Bp. Consp. I. p. 89. gen. 212. 3. — *Buceros pœnsis* Fras. Ann. & Mag. N. H. 1855. p. 136 (♀). — *Tmetoceros atratus* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 3. 4. — *Buceros ruficristatus* Temm. in Mus. Lugd. (♀). —

Goldküste — ♂. ♀ — 2 St.

Gen. BYCANISTES **) nov. gen. — Trompeter-Calao.

473. 1. B. buccinator Nob.

Buceros buccinator Temm. Pl. col. 284. — Wagl. Syst. Av. p. 199. 12. — Less. Man. II. p. 106. — Id. Trait. p.

*) Von *σφαγή* (Kehle, Hals) und *λοβός* (Lappen). —

**) Von *βυκανίστης* (Trompeter) = *buccinator*. — Zu dieser gleichsam die asiatischen *Hydrocissae* in Africa repräsentirenden Gattung stellen wir noch u. a.:

253. 7. — Gray Gen. B. II. p. 399. 4. — *Bucorvus buccinator* Bp. Consp. I. p. 89. gen. 212 5. — *Tmetoceros buccinator* Id. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 3. 7. —
Cap — ♂ — 1 St.

Gen. RHYTIDOCEROS Rchb. 1850. — Falten-Hornvogel.
Calao (!) Bp. 1849. *Rhyticeros* (!) Rchb. 1850.

474. 1. R. obscurus Nob.

Buceros obscurus Gm. S. N. p. 362. 12 (♂). — *Buceros plicatus* Lath. Ind. Orn. I. p. 146. 12. — Vieill. Enc. p. 306. 12. — Wagl. Syst. Av. p. 197. 8. — Gray Gen. B. II. p. 399. 18. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 319. — *Calao javan* Levaill. Ois. Afr. V. p. 96. t. 239 (♂). — *Calao à casque festonnée* Id. Ois. nouv. & rar. Amér. & Ind. p. 41. t. 20-21 (♀). — *Calao javan jeune* Id. l. l. p. 45. t. 22 (♂ juv.). — *Buceros undulatus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 26 (♀). — Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 175. — Vig. App. Mem. Raffl. p. 666. — Less. Trait. p. 255. 12. — *Buceros javanicus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 28 (♂ jun.). — *Buceros niger* Vieill. N. D. IV. p. 592. — Id. Enc. p. 400. 21 (♀). — *Buceros javanus* Id. N. D. IV. p. 595. — Id. Enc. p. 401. 24 (♂ jun.). — *Buceros annulatus* Drapiez. — *Buceros pusaran* Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 293. — Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 990. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 45. — *Buceros ruficollis* Id. (nec Vieill.) Journ. A. S. B. 1843. p. 176. — *Calao plicatus* Bp. Consp. I. p. 90. gen. 216. 3. — *Rhyticeros plicatus* Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 10. 29. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 598. 882. —
Sumatra — ♂; Malacca — ♂ — 2 St.

475. 2. R. subruficollis Horsf. & Moore

Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 600. 883. — *Buceros subruficollis* Blyth Journ. A. S. B. 1843. p. 177. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. App. p. 320. — *Buceros plicatus* Id.

---

2. *B. cylindricus.* — *Buceros cylindricus* Temm. Pl. col. 521. — Gray Gen. B. II. p. 399. 14. — Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 127. 388. — Id. Orn. Westafr. p. 162. 486. — *Bucorvus cylindricus* Bp. Consp. I. p. 89. gen. 212. 6. — *Tmetoceros cylindricus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 3. 6 (Ashantee);

3. *B. cristatus.* — *Buceros cristatus* Rüpp. Faun. Abyss. t. 1. — Id. Syst. Übers. p. 79. — Gray Gen. B. II. p. 399. 10. — *Bucorvus cristatus* Bp. Consp. I. p. 89. gen. 212. 4. — *Tmetoceros cristatus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 3. 5 (Abyssinien). —

(nec Lath.) Journ. A. S. B. 1843. p. 990. — Id. l. l. 1847. p. 998. — Id. Cat. B. Mus. A. S. B. p. 45. —
Tenasserim — ♀ — 1 St.

Gen. CRANORRHINUS *) Nob. — Helm-Hornvogel.
Cassidix Bp. 1849 (nec Less. 1831).

476. 1. C. cassidix Nob.

Buceros cassidix Temm. Pl. col. 210 (♂). — Wagl. Syst. Av. p. 195. 3. — Less. Man. Orn. II. p. 105. — Id. Trait. p. 253. 6. — Müll. & Schleg. Verh. Nat. Gesch. Ned. Ind. t. 4b (♀). — Gray Gen. B. II. p. 399. 12. — *Calao cassidix* Bp. Consp. I. p. 90. gen. 216. 1. — *Cassidix cassidix s. C. typicus* Id. Consp. Vol. Anis. p. 3. gen. 10. 27. —
Celebes — ♂ — 1 St.

Gen. DICHOCEROS Glog. 1842. — Doppelhornvogel.
Homraius (!) Bp. 1854.

477. 1. D. bicornis Nob.

Buceros bicornis Lin. S. N. p. 153. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 142. 3. — Vieill. Enc. p. 301. 3. — Wagl. Syst. Av. p. 195. 5. — Gray Gen. B. II. p. 399. 2. — Bp. Consp. I. p. 89. gen. 214. 2. — *Calao à casque concave* Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 10. t. 3-5 (juv.). — *Calao bicorne* Id. l. l. p. 16. t. 7-8 (ad.). — *Buceros cavatus* Shaw Gen. Z. VIII. p. 18. — Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 291. — Vig. App. Mem. Raffl. p. 666. — Gould Cent. Himal. B. t..... — Jerd. Madr. Journ. 1840. p. 37. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 42. — *Buceros cristatus* Vieill. N. D. IV. p. 591. — Id. Enc. p. 399. 19. — *Buceros Homrai* Hodgs. Journ. A. S. B. 1832. p. 251. — Id. Asiat. Res. XVIII. 2. p. 169. t.... — Id. Gray's Z. Misc. p. 85. — Gray Cat. Mamm. & B. Nep. & Thib. pres. by Hodgs. p. 111. — Gray Gen. B. II. p. 399. 3. — *Dichoceros cavatus* Glog. Hand- & Hilfsb. Nat. Gesch. p. 335. — *Homraius bicornis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 7. 17. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 583. 868. —
Ostindien — ♂ ad., ♂ jun. — 2 St.

*) Von κράνος (Helm) und ῥίς (Nase). —

Gen. PLATYCEROS *) Nob. — Platthornvogel.

Hydrocorax **) Bp. 1854 (nec Briss. 1760).

478. 1. P. hydrocorax Nob.

Hydrocorax Briss. Av. IV. p. 566. t. 45. — *Buceros hydrocorax* Lin. S. N. p. 153. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p 144. 7. — Vieill. Enc. p. 304. 7. — Temm. Pl. col. 283. — Wagl. Syst. Av. p. 196. 7 — Less. Trait. p. 254. 10. — Gray Gen. B. II. p. 399. 15. — Bp. Consp. I. p. 89. gen. 214. 1. — *Calao des Moluques* Buff. Pl. enl. 283 (jun.). — *Buceros bicornis var. β* Gm. S. N. p. 358. 1. — Lath. Ind. Orn. I. p. 142. 3. — *Calao roux ou C. à casque concave jeune âge* Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 13. t. 6. — Id. Ois. Afr. V. p. 96. t. 240 (juv). — *Buceros planicornis* Merrem. — *Buceros platyrhynchus* Pears. — *Hydrocorax planicornis* Bp. Consp. Vol. Anis. p. 2. gen. 8. 18. — Philippinen — ♂ — 1 St.

Gen. BUCEROS Lin. 1748. — Mondhornvogel.

Tragopan (!) Mochr. 1752. *Hydrocorax* Briss. 1760. *Meniceros* Glog. 1842.

479. 1. B. rhinoceros Lin.

S. N. p. 153. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 141. 1. — Vieill. Enc. p. 300. 1. — Raffl. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 291. — Wagl. Syst. Av. p. 194. 1. — Less. Trait. p. 255. 13. t. 31. — Gray Gen. B. II. p. 399. 1. — Blyth Cat. B. Mus. A. S. B. p. 42. — Bp. Consp. I. p. 89. gen. 214. 3. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 582. 867 pt. — *Calao rhinoceros* Buff. Pl. enl. 934. — Levaill. Ois. rar. & nouv. Amér. & Ind. p. 6. t. 1-2. — *Calao à casque en croissant* Id. I. l. p. 26. t. 13. — *Buceros africanus* (!) Gm. S. N. p. 359. 6. — Lath. Ind. Orn. I. p. 143. 5. — Vieill. Enc p. 303. 5 — *Buceros niger* Shaw Gen. Z. VIII. p. 7. — *Buceros sylvestris* Vieill. N. D. IV.

*) Von πλατύς (platt) und κέρας (Horn). —

**) Bonaparte und Gray wollen *B. hydrocorax* Lin. als Typus der Gattung *Hydrocorax* Briss. betrachtet wissen, wir halten jedoch die Gattungen *Hydrocorax* Briss. und *Buceros* Lin., welche genau dieselben Arten umfassen, für vollkommen identisch und glauben nicht, dass, weil Linné zufällig *B. rhinoceros*, Brisson aber *B. hydrocorax* voranstellte, der Letztere bereits denselben von den übrigen Arten der Gattung generisch zu trennen beabsichtigte. —

p. 592. — Id. Enc. p. 400. 20. — *Buceros diadematus* Dumont. — *Buceros rhinoceros var. sumatrana* Müll. & Schleg. Marsd. Hist. Sumatr. p.... t. 21. —

Sumatra — ♂ — 1 St.

480. 2. B. lunatus Temm.

Pl. col. 546. — Bp. Consp. I. p. 90. gen. 214. 6. — *Buceros rhinoceros* Horsf. (nec Lin.) Trans. Linn. Soc. XIII. p. 175. — *Buceros rhinoceros var. javana* Müll. & Schleg. Marsd. Hist. Sumatr. p..... —

Java — ♂ — 1 St.

Gen. TMETOCEROS Cab. 1847. — Abbagamba.

Bucorvus (!) Less. 1831. *Tragopan* Gray 1841 (nec Moehr. 1752). *Bucorax* Sundev. 1850.

481. 1. T. abyssinicus Cab.

Orn. Not. p. 345. — *Grand Calao d'Abyssinie* Buff. Pl. enl. 779. — *Buceros abyssinicus* Gm. S. N. p. 358. 3. — Lath. Ind. Orn. I. p. 143. 4. — Vieill. Enc. p. 302. 4. — Less. Trait. p. 356. 16. — *Calao caronculé* Levaill. Ois. Afr. V. p. 82. t. 230-31. — *Buceros brac* Dumont. — *Buceros carunculatus* Wagl. Syst. Av. p. 196. 6. — *Buceros Leadbeateri* Vig. (jun.). — *Tragopon abyssinicus* Gray List Gen. B. p. 65. — Rüpp. Syst. Übers. p. 79. 320. — Id. Neue Wirbelth. Vög. t. 4. — Heugl. Übers. p. 45. 456. — *Bucorvus abyssinicus* Gray Gen. B. II. p. 400. — Bp. Consp. I. p. 89. gen. 212. 1. — Horsf. & Moore Cat. B. Mus. East-Ind. Comp. II. p. 591. 865. — *Buceros caffer* Verr. (juv.). — *Bucorax abyssinicus* Hartl. Orn. West-afr. p. 165. 495. —

Abyssinien — ♂, ♀ — 2 St.

Druckfehler und Berichtigungen.

Seite

4, Zeile 9 v. oben lies: 2 St. statt 1 St.

4, No. 7 „*C. Vigorsi*“ ist gänzlich zu streichen und dafür zu setzen:
C. concinna Nob.
Pitta concinna Gould P. Z. S. 1857. p. 6. 5. — *Coloburis Vigorsi* Cab. & Heine (nec Gould) Mus. Hein. II. p. 4. 7. —

5, Zeile 6 v. unten ist der zweite Accent in φοίνιος zu streichen.

8, „ 19 v. oben lies 2 ♂, ♀ — 3 St. statt 3 ♂, ♀ — 4 St.

8, „ 25 v. oben lies 4 St. statt 3 St.

8, „ 9 v. oben lies ♂, ♀ — 2 St. statt ♂ — 1 St.

9, „ 10 v. oben lies nov. gen. statt Nob.

10, „ 12 v. oben lies ♀ statt ♂.

12, „ 3 v. unten lies *Myrmotherula* statt *Mormotherula*.

13, „ 4, 3 und 2 v. unten lies *guttatus, ornatus, haematonotus* statt *guttata, ornata, haematonata*.

13, „ 2 v. unten lies 2 Mal *haematonota* statt *haematonata*.

16, „ 11, 13 und 17 v. oben lies *cirratus* statt *cirrhatus*.

16, „ 5 v. unten lies von *cirratus* verschieden statt von *cristatus* versch.

27, No.102 „*Synallaxis albescens* Temm“ ist gänzlich zu streichen und dafür zu setzen:
S. Spixi Scl.
P. Z. S. 1856. p. 97. 2. — *Parulus ruficeps* Spix (nec Licht.) Av. Bras. I. p. 85. 1. t. 86. 1. — *Synallaxis ruficapilla* Rchb. (nec Vieill.) Handb. I. p. 158. t 347. t. 518. 3593. — *Synallaxis albescens mas* Burm. (nec Temm.) Th. Bras. III. p. 40. —

31, Zeile 7 v. unten lies Bolivien statt Brasilien.

36, „ 17 v. oben lies 1′ 6″ statt 1″ 6′ ′.

36, „ 19 v. oben lies ♂ — 2 St. statt 2 ♂, ♀ — 3 St.

41, „ 3 v. oben lies „Cab.“ Burm. Journ. Orn. 1853. p. 165. 7 statt Nob.

54, „ 8 v. oben lies „Rchb.“ Zuchold Journ. Orn. 1854. p. 55 statt Nob.

72, „ 1 ist zu streichen und statt dessen zu lesen:
C. borealis Scl.
P. Z. S. 1858. p. 301. 49. — Id. l. l. 1859. p. 43. — Id. Ibis 1859. p. 122. 150. — *Tyrannus borealis* Sws. & Rich. Faun. Bor. Amer. II. p. 141. t. 35. — *Contopus pertinax* Cab. & Heine Mus. Hein. II. p. 72. 238. —

72, „ 14 v. oben lies Nutt. statt Natt.

- „ 15 v. oben streiche *Tyrannus*.

- „ 16 v. oben streiche gänzlich.

- „ 19 v. oben streiche *Contopus borealis*.

- „ 20 v. oben streiche gänzlich.

- „ 21 v. oben streiche Ibis 1859. p. 122. 150.

- „ 22 v. oben füge noch als Synonym hinzu:
Contopus mesoleucus Scl. P. Z. S. 1859. p. 43. — Id. Ibis 1859. p. 122. 151 —

87, „ 10 v. unten lies platt statt glatt.

101, „ 22 v. unten lies *Aulia* Scl. statt *Aulea*.

136, „ 12 v. unten 67 statt 57.

136, „ 7 nnd 6 v. unten lies *Lamarck* und *Lamarckii* statt *Lamark* und *Lamarkii*.

150, „ 18 v. oben lies Rchb. Nob. t. 409. 3101-2. statt 419. 2101-2.

151, „ 4 v. unten C statt G.

160, „ 5 v. oben 2 ♂ ad. statt ♂ ad.

Schnellpressendruck bei J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.

Maschinendruck von J. Hörling's Wittwe in Halberstadt.


3 2044 106 206 196